


COSTA LIMA

INSETOS DO BRASIL

2.º TOMO

HEMÍPTEROS



ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA
SÉRIE DIDÁTICA N.º 3 - 1940

INSETOS DO BRASIL

2.º TOMO

HEMÍPTEROS

A. DA COSTA LIMA

Professor Catedrático de Entomologia Agrícola da Escola Nacional de Agronomia
Ex-Chefe de Laboratório do Instituto Oswaldo Cruz

INSETOS DO BRASIL

2.º TOMO

CAPÍTULO XXII

HEMÍPTEROS



ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA
SÉRIE DIDÁTICA N.º 3 - 1940

CONTEUDO

CAPÍTULO XXII

	PÁGINA
Ordem HEMÍPTERA	3
Superfamília SCUTELLEROIDEA	42
Superfamília COREOIDEA	79
Superfamília LYGAEOIDEA	97
Superfamília THAUMASTOTHERIOIDEA	124
Superfamília ARADOIDEA	125
Superfamília TINGITOIDEA	132
Superfamília REDUVIOIDEA	142
Superfamília POLYCTENOIDEA	239
Superfamília CIMICOIDEA	242
Superfamília CRYPTOSTEMMATOIDEA	293
Superfamília HYDROMETROIDEA	294
Superfamília GERROIDEA	297
Superfamília LEPTOPODOIDEA	308
Superfamília OCHTEROIDEA	310
Superfamília NEPOIDEA	314
Superfamília NOTONECTOIDEA	327
Superfamília PLEOIDEA	330
Superfamília CORIXOIDEA	331
Índice	337

CAPÍTULO XXII

Ordem HEMIPTERA¹

236. **Caracteres** - Os insetos das ordens Hemiptera e Homoptera caracterizam-se essencialmente pela conformação do aparelho bucal, que é representado por um rostro (*haustellum*), constituído por um lábio segmentado, no qual se alojam as demais peças bucais.

Os antigos autores reuniam tais insetos numa só ordem - **Hemiptera** ou **Rhynchota** - dividindo-a em duas subordens: **Heteroptera** e **Homoptera**.

Pertencem à ordem Hemiptera todos os insetos vulgarmente chamados *perceijos*, da antiga subordem **Heteroptera**, portadores de um rostrum reclinado sobre o sternum, mais ou menos alongado, retilíneo ou curvilíneo, porem sempre articulado com a cabeça anteriormente aos olhos (**Frontiros-tria**), apresentando, portanto uma gula.

Constituem a ordem Homoptera os Rincotos da antiga subordem do mesmo nome, cujo rostro, curto ou muito curto, se articula com a cabeça inferior e posteriormente aos olhos, parecendo em muitos deles emergir da região esternal; não ha região gular nestes insetos.

- Alem da conformação do rostrum, os Hemipteros se caracterizam pelo aspecto das antenas, que apresentam, quasi sempre, um número reduzido de segmentos (3 a 5), pela segmentação dos tarsos (geralmente trimeros) e, sobretudo, pela configuração e estrutura características das asas anteriores, conhecidas pelo nome *hemelitros*.

¹ Gr. *hemi*, meia; *pteron*, asa.

Em geral os Hemipteros são insetos de pequenas dimensões; ha, porem, alguns bem grandes, como as baratas d'água (*Lethocerus* spp.), que têm mais de 100 mm.




Fig. 219 - *Pachycoris torridus* (Scopoli, 1772), fêmea (Scutelleridae), face ventral; das pernas foram representadas apenas as ancas (quadris). 1, buccula; 2, gula; 3, propleura; 4, Dropleura; 5, mesosternum; 6, mesoepisternum; 7, mesoepimeron; 8, orifício (ostíolo) e canal da glândula odorífera; 9, metaepisternum; 10, luetaepimeron; 11, estigmas respiratórios dos urosternitos 2-6; 12, áreas estridulatórias; 13 e 14, segmentos da genitália; 15, 7º urosternito; 16, 6º urosternito; 17, 2º urosternito; 18, 4º segmento do labium; 19, 3º segmento do labium; 20, 2º segmento do labium; 21, metasternum; 22, prothorax; 23, 1º segmento do labium; 24, labrum; 25, tylus (clipeo).

Alem das espécies terrestres, que constituem a maioria, ha as aquáticas e semi-aquáticas.

Desenvolvem-se por paurometabolia.

237. **Anatomia externa.** - *Cabeça.*- Em geral pequena, livre, porem pouco movel, de aspecto variavel nos diversos gêneros, apresentando-se quasi sempre dividida em regiões bem distintas, algumas sob a forma de lobos, limitadas por sulcos longitudinais ou pregas mais ou menos aparentes, que podem ser apreciadas nas figuras que aquí apresento.

Vê-se, assim, a região frontal, compreendendo toda a parte superior da cabeça (anterior em Corixidae e Notonectidae), apresentando adiante 2 sulcos longitudinais divergentes (ramos anteriores da sutura epicraneana), limitando entre si uma região considerada como o epistoma ou clypeus, sob a forma de lobo estreito e alongado, tambem chamado *tilus* ou lobo central da fronte, mais ou menos distintamente separado dos lobos laterais (processos frontais) ou *jugae* (impropriamente, *genae* de alguns autores). Em relação com estas partes, adiante ou inferiormente e de cada lado do segmento basal do rostro, por vezes mesmo ocultando-o lateralmente, ha expansões mais ou menos salientes (*bucculae*), cujo aspecto e extensão têm certa importância na classificação de alguns grupos de Hemipteros.

Geralmente a região post-ocular da cabeça é relativamente curta, ficando encaixada na escavação protorácica anterior. Ha, porem, Hemipteros que a apresentam prolongada, formando um *colo* mais ou menos alongado, como se vê em alguns Ligeideos e Reduviideos, ou consideravelmente dilatada como nos Enicocefalideos.

Olhos, em geral, bem desenvolvidos, inteiros e sesséis. Em algumas espécies, porem, muito salientes ou mesmo pedunculados. Ausentes em Termitaphididae e Polyctenidae.

Ocelos (2) presentes na maioria das espécies e situados entre os olhos ou para trás.

Antenas de 3 a 5 segmentos, em geral filiformes ou subfiliformes, inseridas aos lados da cabeça em *tubérculos*




Fig. 220 - *Diactor bilineatus* (Fabr., 1803) (Coreidae). Tipo de rostro de Hemiptero sugador de seiva: 1, buccula; 2, labrum; 3, estiletes bucais fora do labium, que é dividido em 4 segmentos; 4, tylus; 5, gena; 6, tubérculo antenífero.

anténiferos mais ou menos salientes, situados acima ou abaixo de uma linha imaginária tirada do centro do olho

ao ápice do clypeus. Nos Hemipteros terrestres e em muitos aquáticos as antenas são perfeitamente visíveis por serem mais longas que a cabeça (subordem Gymnocerata); na maioria dos Hemipteros aquáticos ficam escondidas em fossetas situadas sob a cabeça (subordem Cryptocerata).

Aparelho bucal picador e sugador, representado por um *rostrum* ou *haustellum*, de labium segmentado, mais ou menos alongado nas espécies fitófagas, porem, curto, atingindo apenas as ancas ou quadris anteriores, nas espécies predadoras ou hematófagas.




Fig. 221 - *Zelus leucogrammus* (Perty, 1834) (Reduviidae). Tipo de rostro de Hemiptero predador. Em linhas pontilhadas vêm-se os estiletos bucais e adiante do olho a bomba salivar (seringa).

Nos Hemipteros predadores o rostro não raro se apresenta curvado em forma de gancho, formando-se entre a gula e ele, em repouso, um ângulo curvilíneo de abertura relativamente larga (fig. 221).

Nos Hemipteros fitófagos e nas espécies hematófagas o rostró é reto e, em repouso, fica mais ou menos paralelo ou encostado à região gular (figs. 220 e 222).

O rostró é constituído pelo *labium* dividido em 3 a 4 segmentos, transversalmente enrolados em forma de goteira ou bainha, e com os bordos laterais superiormente aproxi-




Fig. 222 - *Triatoma sordida* (Stal, 1809) (Reduviidae, Triatominae). Tipo de rostró de Hemiptero hematófago

mados, exceto no segmento basal, onde cada vez mais se afastam para a articulação com a cabeça, deixando um espaço triangular que é ocupado pelo *labrum*. Este, no extremo basal, como em todos os insetos, está em relação com o clypeus, que, nos Hemipteros, é, chamado *tylus*. A ponta do labrum geralmente não excede ou pouco excede o primeiro segmento do labium; às vezes, porem (Corixidae), estende-se até a ponta deste. Na bainha, formada pelo lábio, alojam-se as outras peças do aparelho bucal (*trophi*), que são estiliformes, duas externas, as mandíbulas, serradas no ápice e duas internas, as maxilas, reduzidas à peça intermaxilar ou lacínia, de ponta simples.

As maxilas apresentam duas escavações ou sulcos longitudinais nas faces que se tocam, resultando, do seu encaixamento, a formação de dois canais paralelos, um superior

(ou anterior) por onde passa o alimento líquido aspirado pela faringe e outro inferior (ou posterior), por onde se escoo a saliva. Em quasi todos os Hemipteros não ha palpos, nem maxilares, nem labiais.

Dentro da cabeça, como em Thysanoptera, os estiletos bucais divergem e se alargam para as respectivas bases, as quais se acham em relação com músculos protratores e retratores, cujas contrações rápidas e sucessivas determinam, respectivamente, a penetração e a retirada dos estiletos.

No ato de picar e de sugar o labium não penetra nos tecidos perfurados pelos estiletos mandibulares e maxilares. De início fica verticalmente disposto, porem, à proporção que os estiletos vão entrando, dobra-se ao nível das articulações inter-segmentares, formando uma linha quebrada. Em geral tais lancetas são pouco mais longas que o rostrum, de modo que não podem ir muito além da ponta do mesmo; nos Hemipteros micetófagos, porem, elas se apresentam consideravelmente alongadas, podendo, mesmo ter 5 a 6 vezes o comprimento do corpo. Neste caso, a parte proximal do feixe de estiletos, que excede a que se acha no rostrum, ou fica alojada na cabeça como uma mola de relógio (Aradidae), ou se dispõe num grande diverticulo membranoso na base do segundo segmento labial (*Bozius* e *Coplosomoides*) (Plataspidae), ou num longo saco (*crumena*), que se estende, internamente, da cabeça até a base do abdomen (*Tropidotylus*) (Plataspidae) (CHINA, 1931).

Em *Prolobodes* (Cydnidae), segundo verifiquei (figura 276), observa-se também aquela disposição dos estiletos.

Relativamente aos tipos de aparelho bucal e de tubo digestivo nos Hemipteros, conforme o regime alimentar que apresentam, ha toda a conveniência em se ler o interessante estudo de ELSON (1937).

Quando tratar da ordem Homoptera, apresentarei a explicação dada por WEBER (1928, 1930, 1933), para o me-

canismo da penetração e retração do feixe de estiletos quando estes são extremamente alongados.

Torax. - Visto de cima e com as asas em repouso, é quasi que exclusivamente representado pelo pronotum, geralmente trapezoidal, subtrapezoidal ou hexagonal, em relação imediata com um mesoscutellum triangular, às vezes extraordinariamente desenvolvido (Scutelleroidea).

O pronotum pode ser simples ou provido de expansões laterais ou de espinhos. Em algumas espécies de pronotum hexagonal os ângulos laterais são consideravelmente desenvolvidos, apresentando-se prolongados em espinho ou corno. Também os ângulos anteriores e os posteriores podem ser mais ou menos salientes, em tubérculo ou espinho. No disco do pronotum, como no scutellum, pode haver também espinhos mais ou menos alongados.

Esternitos bem desenvolvidos, em geral reunidos com os respectivos pleuritos; estes com o episternum e o epimeron distintos ou fundidos.

Pernas, em geral, de tipo ambulatório ou gressório, às vezes, porém, as anteriores ou as posteriores modificadas em tipos especiais de adaptação (pernas anteriores fossórias ou raptórias, posteriores saltatórias ou natatórias). Em algumas espécies as tíbias do par posterior apresentam conspícuas expansões foliáceas, como por exemplo no Coreídeo *Diactor bilineatus* (Fabr., 1803), do maracujá.

Tarsos geralmente de tres artículos, com o pretarso provido de duas garras curtas e recurvadas; entre elas pode haver ou não um pulvilo ou arólio. Ha Hemípteros dímeros e alguns monomeros, isto é; com um artículo tarsal apenas, em forma de garra simples.

Asas (4), como as pernas, de aspecto variavel.

As posteriores são membranosas com poucas nervuras. As anteriores (*hemielitros* ou *hemelitros*), na maioria das espécies, apresentam aspecto peculiar. Nelas se vêem duas partes bem distintas: uma coriácea, basal, chamada *corium*, e outra membranosa, apical, a *membrana*. O corium apresenta, ou não, nervuras mais ou menos salientes e uma peça

do lado interno, separada do resto ou campo principal do corium, por uma sutura ou sulco (*sutura clavi*), do ângulo humeral ao ângulo basilar interno da membrana (*angulus internus*). A esta espécie de apêndice do corium dá-se o nome de *clavus* (figs. 223-225).

Em muitas espécies a parte externa do corium, em sua maior extensão, pode ser nitidamente separada do resto, por uma sutura longitudinal. A tal parte assim diferenciada dá-se o nome de *embolium* (fig. 225).

Finalmente chama-se *cuneus* a uma porção triangular, inferior, nitidamente separada do resto do *corium*, que,




Fig. 223 - Hemelítero de um Mirídeo (X 15) (Desenho de Toledo, oferecido por Cesar Pinto).

como uma cunha, penetra no ângulo basilar externo da membrana.

A membrana ou não tem nervuras ou estas são mais ou menos numerosas, formando ou não células. A forma e as dimensões dos hemelíteros, a disposição, das nervuras e células na membrana, têm grande importância na sistemática dos Hemípteros.

As asas inferiores, em geral, não oferecem bons caracteres taxionômicos.

Em repouso os hemelíteros se entrecruzam, com as membranas superpostas e o bordo, interno do clavo formando um ângulo de abertura anterior, na qual se vê o escutelo.

Em muitas espécies, conforme o desenvolvimento das asas, pode haver tipos diferentes de adultos: macroptero,




Fig. 224 - Hemelítro de *Pachylis pharaonis* (Herbst, 1784) (Coreidae) (X4). 1, clavus; 2, cubitus; 3, sutura clavi (prega anal); 4, nerv. mediana; 5, angulus clavi; 6, angulus internus; 7, nerv. r-m; 8, membrana; 9, sutura membranae; 10, corium; 11 e 12, ramos de radius; 13, embolium; 14, costa. (Desenho oferecido por Cesar Pinto).

intermediário ou braquíptero e áptero. Quando tal sucede é quasi sempre a fêmea que apresenta esse polimorfismo.

Abdomen. - De 9 segmentos no macho e 10 na fêmea (1º segmento muito reduzido), geralmente plano ou côncavo na face tergal, mais ou menos convexo na face esternal. Os Hemipteros não possuem cercas e quasi sempre são desprovidos de outros apêndices abdominais; apenas algumas espécies aquáticas apresentam apêndices respiratórios caudais.




Fig. 225 - Hemelitra de um Antocorídeo (X 25) 1, clavus; 2, membrana; 3, embolium (Desenho de Toledo, oferecido por Cesar Pinto).

Apesar dos órgãos genitais externos, em ambos os sexos, não serem tão conspícuos como em outros insetos, é facil distinguir o macho da fêmea pela configuração dos segmentos terminais do abdomen.

Vários Hemipteros apresentam um ovipositor bem desenvolvido, constituído por tres pares de gonapofises.

Em muitos Hemipteros as margens laterais do abdomen apresentam-se achatadas e mais ou menos salientes. A essa parte do abdomen dá-se o nome de *connexivum*.

238. **Anatomia interna.** - *Tubo digestivo.* - O canal sugador do rostrum, na parte proximal, continua-se com o canal faringeo e este com o esôfago, em geral, curto. Na região dorsal do faringe sugador, sempre bem desenvolvido, inserem-se os músculos dilatadores, que se fixam à parede do epicrâneo. Proventrículo ausente. Mesentério (enteron) dividido em tres a quatro regiões distintas, as vezes nitidamente separadas por um estrangulamento.




Fig. 226 - *Anasa tristis* (De Geer, 1773) (Coreidae). Corte longitudinal mediano da cabeça. *Br*, cérebro; *CMcl*, músculos circulares da faringe; *DICb*, dilatadores do cibarium (bomba sugadora) *Hphy*, ipofaringe; *Oes*, esôfago; *Phy*, faringe; *Pmp*, bomba sugadora (ou cibarium); *SID*, canal salivar; *SoeGng*, ganglio infraesofágico; *Syr*, seringa salivar; *Tnt*, tentorium (De Breakey, 1936).

As espécies fitófagas geralmente apresentam, na metade posterior da região posterior do mesentério, cegos gástricos, ora sob a forma de tubos mais ou menos alongados, em número variavel segundo as espécies ou mesmo peculiar a cada sexo, ora em grande número, com o aspecto de curtas criptas. Dentro dos cegos gástricos ha sempre grande quantidade de bactérias simbióticas, que passam de uma para outra geração, como demonstrou GLASGOW (1914), a quem

se deve um estudo notavel destes divertículos gástricos nos Hemipteros.

Proctodaeum (intestino posterior) relativamente curto, representado por uma pequena vesícula anterior, que recebe quatro tubos de Malpighi (às vezes dois), e por uma grande câmara rectal posterior.

Em alguns Hemipteros cada tubo de Malpighi é diferenciado em duas ou tres partes. WIGGLESWORTH (1931), estudando os tubos de Malpighi de *Rhodnius prolixus*, verificou que cada um é constituído por uma ampola basal, em relação com o intestino, e pela parte tabulosa, cuja estrutura bruscamente se modifica entre o terço proximal e os dois terços distais. Alem desta diferença histológica ha tambem diferenças notáveis no conteudo do lumen em cada uma dessas porções. Tambem é interessante consignar, ainda segundo aquele autor, que as células da parede de cada ampola se prolongam em finos processos, que se projetam dentro da cavidade do proctodaeum.

Glândulas salivares ordinariamente bem desenvolvidas, constituídas, de cada lado, pela glândula principal, geralmente acinosa e lobulada e por uma glândula acessória tubulosa, muito alongada nas espécies fitófagas, mais curta e espaçosa nas predadoras e hematófagas, cujo canal excretor, geralmente longo e sinuoso, se reune ao da glândula principal num canal excretor único. Da reunião dos dois canais excretores, da glândula direita e da esquerda, resulta o canal excretor comum, que se abre na chamada *bomba salivar* ou *seringa* (v. fig. 221) situada no hipofaringe. A cavidade deste órgão está em comunicação com o canal salivar das maxilas mediante um tubo de escoamento (*canal da bomba* ou *meato salivar*) que se abre no ápice do hipofaringe. A parte da seringa, em relação com o canal excretor das glândulas salivares, é fortemente invaginada (*diafragma*) e suporta um curto apodema (*pistilo*), no qual se inserem dois músculos retratores, que se fixam nas partes laterais do hipofaringe. Pela contração destes músculos e consequente retração do pistilo a cavidade da seringa torna-se mais

ampla; inversamente, pelo seu relaxamento, a parede da seringa se invagina, determinando a penetração do pistilo e estreitamento da cavidade da seringa. No primeiro tempo a saliva é aspirada do canal excretor das glândulas salivares e, no segundo, é expelida, através do canal da bomba, para o canal salivar das maxilas. Em alguns Hemipteros, segundo WEBER (1930), os orifícios de entrada e de saída da bomba apresentam dispositivos valvulares que impedem o refluxo da saliva.

A saliva, nas espécies fitófagas, hidroliza os hidratos de carbono, sendo capaz de dissolver a celulose e de plasmolizar as células vegetais, facilitando a penetração dos estiletos do rostrum. Nas espécies hematófagas, além da ação irritante ou tóxica, apresenta uma anticoagulina, estudada por CORNWALL & PATTOX (1914).

Aparelho respiratório ordinariamente em relação com 10 pares de estígmata: dois torácicos e oito abdominais (do 1º ao 8º urômero). A posição dos estígmata ou espiráculos abdominais, em relação com os bordos de cada segmento, interessa particularmente na determinação dos vários grupos de Hemipteros.

Nos Hemipteros aquáticos observam-se modificações notáveis para o lado desses órgãos respiratórios, que se apresentam fechados, atrofiados ou mesmo modificados em estruturas especiais (*falsos espiráculos*), considerados ora como órgãos respiratórios especiais (BUENO, 1916), ora como órgãos sensoriais de função estática, sensíveis à variação de pressão (BAUNACKE, 1912). Todavia, nos insetos que os apresentam, há também estígmata funcionais e abertos. Assim, em Nepidae, cujas espécies têm falsos espiráculos no 3º, 4º e 5º urômeros, o 7º urosternito apresenta-se prolongado em dois longos processos, que, reunidos, formam um tubo alongado em relação na base com o último par de estígmata.

O *sistema circulatório* dos Hemípteros tem sido pouco investigado pelos autores. No velho trabalho de LOGY (1884) sobre anatomia e fisiologia dos Nepídeos, encontram-se in-

dicações sobre o vaso dorsal em *Lethocerus* (barata d'água da família Belostomatidae).

BROGHER (1909) fez um estudo interessante sobre os órgãos ou membranas musculares pulsáteis nas pernas de alguns hemipteros aquáticos, situados na base do 1º articulo tarsal das pernas anteriores e na base das tíbias das demais pernas.

Glândulas odoríferas. Os Hemipteros, em sua maioria, apresentam glândulas odoríferas cuja secreção geralmente tem cheiro repugnante, aliás característico de um grande grupo de espécies ("cheiro de percevejo"). Entretanto ha Hemipteros (*Pachycoris*) cuja secreção tem odor peculiar, sinão, agradável, pelo menos suportavel.

Nas formas jovens as glândulas odoríferas estão situadas no abdomen e os respectivos canais excretores terminam em saliências ou tubérculos situados nos urotergitos (bordo, anterior) 4-6, 4-5, 5-6 ou somente no urotergito 4. Nos adultos ha uma glândula metatorácica, geralmente volumosa, com dois canais excretores, cada um terminando na superfície do tegumento, numa fenda (canal ostiolar) ou orifício (ostiolo) bem visível adiante ou ao lado da anca posterior (v. fig. 219). O aspecto destas fendas é aproveitado na classificação, de vários grupos de Hemipteros.

Contrastando com o aspecto do resto do tegumento, em geral mais ou menos polido, a superfície da metapleura, em relação com o orifício secretor, apresenta-se fosca, rugosa ou granulada, de modo a facilitar a evaporação rápida do líquido secretado.

Sistema nervoso muito concentrado. Não raro os gânglios meso e metatorácicos e abdominais se reúnem num só gânglio; em casos extremos, porem, observa-se maior concentração, dela resultando um só gânglio formado pela coalescência de todos os gânglios ventrais. (Sobre o sistema nervoso não só dos Hemipteros, como dos Homopteros, convem ler o trabalho de BRANDT).

Testículos constituídos por um feixe de folículos, cujo número é variável segundo as espécies, em relação com vasos deferentes, dilatados em vesículas seminais na parte proximal. Glândulas anexas sempre bem desenvolvidas, em relação com o canal ejaculador.

Ovários compostos por alguns ovariolos (4 a 7) de tipo acrotrófico (telotrófico), isto é, providos de células nutridoras situadas na câmara terminal do ápice do ovariolo, que se mantêm ligadas aos oocytos em desenvolvimento, mediante conexões protoplásmicas.

Anexas à vagina, que se abre no 8º urosternito, ha uma spermateca e duas ou tres glândulas coletéricas.

239. Reprodução. - Os Hemipteros, em geral, reproduzem-se por anfigonia e são ovíparos. Ha, entretanto, espécies vivíparas (Polyctenidae).

Os ovos podem diferir no aspecto e no tipo de estrutura do chorion. Pode dizer-se, entretanto, e de um modo geral, que possuem um chorion resistente, provido ou não de canalículos ou de saliências de arejamento, e que são ou não distintamente operculados.

Ora são postos separadamente, ora colados, um ao lado do outro, formando grupos, tendo um número de ovos mais ou menos constante.

As espécies fitófagas fazem as posturas sobre as folhas. Muitas, porem, providas de ovipositor, fendem os tecidos das plantas, depositando os ovos no fundo das incisões (posturas endofíticas).

240. Desenvolvimento post-embrionário. - Os Hemipteros são paurometabólicos. Observam-se, geralmente, cinco ecdises, até o inseto atingir a fase adulta, que é assim precedida de cinco estádios de formas jovens, sendo as duas primeiras apteras e as tres seguintes providas de tecas alares. Estas, por alguns autores, são designadas *ninfas* e aquelas *larvas*. Excepcionalmente pode observar-se um número, maior de ecdises.

É após a quinta ou última muda, quando o inseto fica adulto, que os tarsos, até então de dois artículos, passam a ter tres; é lambem nessa ocasião que desaparecem as glândulas odoríferas abdominais, sendo substituidas pela glândula metatoráxica.

241. Hábitos e importância econômica. - Os Hemipteros, em sua maioria, são insetos terrestres. Ha, porem, muitas espécies aquáticas ou semiaquáticas. Estas são predadoras, como lambem o são algumas famílias de Hemipteros terrestres e mesmo várias espécies pertencentes a famílias de Hemipteros filófagos.

Dentre os Hemipteros fitófagos encontram-se algumas que causam grandes danos às plantas cultivadas. Tais danos resultam: das picadas feitas com as mandíbulas e maxilas, que permitem a penetração de microorganismos saprogênicos ou patogênicos; da sucção da seiva ou de cloroleucitos; da ação irritante, tóxica ou infectante da saliva quando contenha toxinas ou esteja contaminada por agentes patogênicos (v. CARTER (1939) e STOREY (1930)).

Os Hemipteros predadores, em sua maioria, atacam outros insetos para sugar o hemolinfa. Conhecem-se tambem espécies fitófagas das familias Pentatomidae (subfam. Asopinae), Coreidae, Lygaeidae, Pyrrhocoridae e Miridae, que podem representar papel saliente no combate a insetos inimigos das plantas.

Vários percevejos da subfam. Triatominae (Reduviidae) e todos os da família Cimicidae, são hematófagos, alimentando-se do sangue de mamíferos ou de aves. Daí a importância médica de alguns destes Hemipteros, que podem ser os exclusivos transmissores de germes patogênicos, como, por exemplo, os barbeiros (*Triatoma* spp.), que transmitem o Trypanosoma da doença de CHAGAS.

242. Meios de combate. - No combate aos Hemipteros, evidentemente, devem ser empregados os seguintes processos: aplicação de insecticidas que atinjam o corpo dos in-

setos jovens (insecticidas externos), meios mecânicos, isto é, colheita e destruição dos ovos, jovens e adultos, em certos casos precedidos de processo destinado a reunir os insetos (armadilhas), meios físicos, ou o emprego do fogo, meios culturais e meios biológicos pelo aproveitamento de predadores e de parasitos.

Os principais parasitos dos Hemipteros são, microimneopteros das superfamílias Chalcidoidea e sobretudo Serphoidea (Proctotrypoidea).

De Chalcidoidea ha várias espécies parasitas de ovos da família Mymaridae. De Serphoidea ha muitas espécies da família Scelionidae que infestam ovos de vários Hemipteros, algumas de grande importância econômica.

Citarei também moscas da família Gymnosomatidae que parasitam principalmente Hemipteros das famílias Pentatomidae, Scutelleridae e Pyrrhocoridae.

243. **Classificação.** - Na ordem Hemiptera ha cerca de 22.000 espécies descritas, que habitam principalmente as regiões tropicais, distribuidas em duas subordens: Gymnocerata e Cryptocerata, que se distinguem, como já vimos, pelo aspecto das antenas.

Em Gymnocerata, com a maioria das espécies (cerca de 21.000), as antenas são perfeitamente visíveis, por serem mais longas que a cabeça. Quasi todos os Hemipteros desta subordem são terrestres e, quando aquáticos, vivem sobre a água ou em local encharcado.

Em Cryptocerata as antenas raramente são expostas, por ficarem escondidas sob a cabeça ou alojadas em uma escavação perto dos olhos. Todos estes Hemipteros são aquáticos.

Cada uma destas subordens compreende várias famílias, que se distinguem pelos caracteres mencionados nas chaves seguintes.

Suordem GYMNO CERATA (*Geocorizae*)²

- 1 Cabeça mais curta que o torax em toda a sua extensão. 2
 1' Cabeça tão ou mais comprida que o torax em toda a sua
 extensão; corpo linear; pernas finas e muito longas;
 espécies semi-aquáticas
 **Hydrometridae** (*Limnobatidae*)
- 2(1) Unhas, pelo menos as dos tarsos do par anterior, distinta-
 mente preapicais; ápice do último artículo tarsal mais
 ou menos dendido; espécies semi-aquáticas 3
- 2' Todas as unhas apicais; último artículo tarsal inteiro. 4
- 3(2) Pernas médias e posteriores muito compridas, aproxi-
 madas entre si, porem mui distantes das anteriores;
 ocelos presentes, às vezes quasi invisíveis; rostro de
 4 segmentos, sendo o 1º muito curto
 **Gerridae** (*Hydrobatidae*;
 Pernas médias e posteriores não muito compridas; equi-
 distantes entre si (exceto em *Rhagovelia*); ocelos obso-
 letos ou ausentes; rostro de 3 segmentos **Veliidae**
- 4(2') Olhos ausentes; scutellum invisível 5
 Olhos presentes; scutellum sempre visível 6
- Cabeça provida de etenídeos; rostro de 3 segmentos.
 hemelitos esquamiformes, sem membrana; tarso do
 3 artículos, embora aparentemente quadriarticulados;
 ectoparasitos de morcegos **Polyctenidae**
- 5' Cabeça sem etenídeos. rostro de 4 segmentos; totalmente
 apteros; tarsos de 2 artículos; espécies termitófilas
 **Termitaphididae** (*Termitocoridae*)
- 6(4') Hemipteros muito pequenos, os dois primeiros segmentos
 antenais muito curtos, os 2 últimos longos, finos e
 pilosos, o 3º dilatado na base; rostrum de 3 segmentos;
 nervuras dos hemielitos formando células; arólios
 (pulvilios; ausentes
 **Cryptostemmatidae** (*Ceratocombidae*; *Dipsocoridae*)
- 6' Hemipteros apresentando outra combinação de caracte-
 res 7

² Gr. *gimnos*, nú; *ceras*, corno.
 Gr. *gea*, terra; *coris*, percevejo.

7(6)	Rostro do 4 segmentos, às vezes o basal muito curto; neste caso, ver também 7'	8
7'	Rostro de 3 segmentos	32
8(7)	Hemelitros reticulados ou areclados	9
8'	Hemelitros não reticulados ou areolados	10
9(8)	Pronoto prolongado atrás em um processo que cobre o escutelo	Tingitidae (<i>Tingidae</i> ; <i>Tingididae</i>)
9'	Pronoto não prolongado atrás; escutelo livre.	Piesmidae
10(8)	Ocelos ausentes	11
10	Ocelos presentes	17
11 (10)	Arólios ausentes	12
11	Arólios presentes	15
12(11)	Hemelitros com cuneus	13
12'	Hemelitros sem cuneus	14
13(12)	Embolium distinto	Termtophylidae
13'	Embolium indistinto	Miridae (<i>Capsidae</i>)
14(12')	Corpo chato; tarsos geralmente de 2 artículos	Aradidae incl. Isodermidae e Disodiidae
14,	Corpo não deprimido; tarsos de 3 artículos	Nabidae
	Membrana apresentando algumas nervuras longitudinais	Lygaeidae (algumas espécies)
15'	Membrana com as nervuras conspicuas formando células basais	16
16(15')	Membrana apresentando 2 ou 3 grandes células basais, das quais se originam várias nervuras que, em geral, se anastomosam perto das células	Pyrrhocoridae
16'	Membrana, na base, com 1 ou 2 células fechadas, sem nervuras longitudinais, ou raramente, emitindo algumas nervuras que não se anastomosam	Miridae (<i>Capsidae</i>)
17(10)	Arólios ausentes	18
17'	Arólios presentes	20
18(17)	Cabeça vertical; hemelitros com cuneus; membrana com 1 ou 2 células ou uma nervura apenas	Isometopidae
18'	Cabeça horizontal; hemelitros sem cuneus; membrana com várias nervuras	19
19(18')	Tarsos de 3 artículos	Nabidae
19'	Tarsos de 2 artículos	Joppeicidae

20(17)	Articulação das antenas com a cabeça invisível, quando se examina o inseto pelo lado dorsal; esutelo sempre grande, às vezes cobrindo todo o abdomen; no mínimo de comprimento igual à metade do comprimento do abdomen	21
20'	Articulação das antenas com a cabeça perfeitamente visível quando se examina o inseto pelo lado dorsal; esutelo geralmente pequeno ou mesmo invisível	26
21(20)	Tíbias providas de fileiras de espinhos, mais ou menos robustos; pernas anteriores fossórias	22
21'	Tíbias desprovidas de espinhos robustos, embora às vezes se apresentem densamente pilosas	23
22(21)	Scutellum convexo cobrindo quasi todo o abdomen e os hemelitos Thyreocoridae (<i>Coriraelaenidae</i>)	
22'	Seutelum plano, deixando bem visíveis os hemelitos e, sob estes, o abdomen	Cydnidae
23(21')	Escutelo plano, deixando bem visíveis o abdomen e os hemelitos	Pentatomidae
23'	Eseutelo convexo, cobrindo quasi todo o abdomen e os hemelitos	24
24 (23')	Tarsos de 2 artículos	
	Plataspidae (<i>Coptosomidae</i> ; <i>Coplosomatidae</i> ; <i>Plataspidae</i>)	
24'	Tarsos de 3 artículos	25
25 (24')	Lobos do protorax com um dente ou lobo saliente adiante dos ângulos humerais e anteriores; olhos protuberantes; asas posteriores sem hamus	
	Podopidae (<i>Graphosomatidae</i>)	
25'	Lobos de prolorax sem dente ou lobo saliente adiante dos ângulos humerais e anteriores; asas posteriores com hamus	Scutelleridae
26(20')	Corpo muito estreito cabeça apresentando uma incisão transversal adiante dos ocelos; primeiro segmento das antenas e fêmures dilatados na extremidade distal; membrana com 4 ou 5 nervuras longitudinais simples	Neididae (<i>Berytidae</i>)
26'	Insetos que não apresentam a combinação de caracteres acima mencionada	27
27 (26')	Tarsos de 2 artículos; espécies pequenas, semi-aquáticas.	Hebridae
27'	Tarsos de 3 artículos	28

- 28(27') Membrana com muitas nervuras salientes, em geral quasi paralelas bifurcadas e originando-se do uma nervura transversa basal 29
- 28' Membrana com poucas nervuras, dispostas de modo diferente ao assinalado em 28, ou sem nervuras 31
- 4° urotergito estrangulado no meio; aberturas das glândulas metatorácicas obsoleta; quando visíveis, situadas atrás das cavidades coxais posteriores e emitindo 2 sulcos divergentes **Corizidae**
- 29' A margem basal do 4 ° e do 5° urotergitos sinuada; aberturas das glândulas metatorácicas sempre visíveis. 30
- 30(29') Cabeça muito mais estreita e mais curta que o protorax; buculae extendendo-se para trás da inserção das antenas **Coreidae**
- 30' Cabeça quasi tão larga e tão comprida quanto o protorax; buculas pequenas, situadas adiante da inserção das antenas **Coryscidae** (*Alydidae*;
- 31 (28') Membrana sem nervuras **Colobathristidae**
- 31' Membrana com 4 ou 5 nervuras longitudinais simples, partindo da base; às vezes as 2 internas formam uma célula perto da base **Lygaeidae** (*Geocoridae*; *Myodochidae*)
- 31' Membrana apresentando 3 grandes células basais das quais se originam várias nervuras que se anastomosam (da região Australiana) **Hyocophalidae**
- 32(7') Cabeça globosa atrás dos olhos; pronoto dividido em 3 lóbulos; hemelitos totalmente membranosos, com nervuras longitudinais e poucas nervuras transversais; tarsos anteriores de um artículo, posteriores de 3 **Enicocephalidae** (*Henicocephalidae*)
- 32' Hemipteros que não apresentam a combinação de caracteres assinalada em 32 33
- 33(32') Pernas do par anterior curtas, robustas, raptatórias, de conformação peculiar, anca muito alongada, femur curto, consideravelmente dilatado e inferiormente canaliculado, para alojar a tibia tarso reduzido ou ausente **Phymatidae** (*Macrocephalidae*)
- 33' Pernas do par anterior não do tipo descrito em 33 34

	Corpo mais ou menos oval e achatado; ocelos ausentes.	35
34'	Corpo de forma diferente; ocelos geralmente presentes (em algumas espécies de Saldidae ha um ocelo apenas e nas formas apteras de Mesoveliidae os ocelos são obsolescentes)	36
35 (34)	Hemelitros de aspecto normal, embora deixando o abdomen descoberto aos lados e atrás; tarsos raramente com mais de 2 artículos.	Aradoidea
35'	Hemelitros representados por 2 escamas muito curtas, sem membrana, deixando (3 abdomen todo descoberto; tarsos de 3 artículos (percevejos do homem, dos morcegos e das aves)	Gimicidae (<i>Acanthiidae</i> auel.; <i>Clinocoridae</i>)
36(34)	Hemelitros com cuneus	37
36	Hemelitros sem cuneus	39
37, 36	Embolium distinto	38
37'	Embolium indistinto	Velocipedidae
38(37)	Tarsos de 3 artículos	Anthocoridae
38'	Tarsos de 2 artículos	Microphysidae
	Tarsos de 3 artículos	40
	Tarsos, de todas as pernas, de 2 artículos	45
40 (39)	Hemelitros muito curtos; asas ausentes; ocelos ausentes.	Aepophilidae
	Outros caracteces	41
41(40')	Membrana com 4 ou 5 células basais alongadas, uma ao lado da outra (espécies com menos de 10 mm. de comprimento). Saldidae (<i>Acanthiidae</i> de alguns autores)	
41'	Membrana de tipo diferente, ou insetos apteros	42
42(41)	Hemelitros ausentes ou membrana sem nervuras; espécies semi-aquáticas	Mesoveliidae
42'	Hemelitros presentes e membrana com nervuras distintas	43
43 (42')	Prosternum sem sulco estridulatório; rostrum de 4 segmentos	Nabidae
43'	Prosternum em quasi todas as espécies com sulco estridulatório; rostrum de 3 segmentos	44

- 44 (43') Pernas anteriores com ancas ou quadris muito mais longos que a cabeça, lembrando o aspecto das pernas raptórias dos louva-deus; as demais muito finas e alongadas; corpo linear, mais ou menos alongado; ocelos ausentes. **Ploiariidae** (*Emesidae*)
- 44' Pernas anteriores com as ancas não mais longos que a cabeça, apenas com os fêmures um pouco mais dilata- dos que nas outras pernas, que em geral são mais ou menos robustas; corpo não linear; ocelos geralmente presentes **Reduviidae**
- 45 (39') Prosternum com sulco estridulatório **Reduviidae** (*gen. Aradomorpha*)
- 45' Prosgernum sem sulco estridulatório 46
- 46(45') Arólios ausentes; antenas de 4 segmentos.. **Joppeicidao**
- 46' Arólios presentes 47
- 47(46') Antenas de 4 segmentos **Thaumastotheriidae** (*Thaumastoeoridae*)
- 47' Antenas de 5 segmentos **Hebriidae** (*Nacogeidae*)
- Subordem CRYPTOCERATA (*Hydrocorizae*)³
- 1 Ocelos presentes 2
- 1' Ocelos ausentes 3
- 2(1) Antenas expostas, olhos proeminentes; pernas anteriores e médias semelhantes **Ochteridae** (*Pelagonidae*)
- 2' Antenas escondidas, olhos mui protuberantes; pernas an- teriores raptórias **Nerthridae** (*Galgulidae; Gelastocoridae; Mononychidae*)
- 3(1') Pernas anteriores normais ou, quando de tipo diferente das médias, com o tarso constituído por um grande artícu- lo achatado, provido de cerdas robustas e sem unhas 4
- 3' Pernas anteriores distintamente raptórias 7

³ Gr. *cryptos*, escondido; *ceras*, corno.
Gr. *hidor*, água; *coris*, percevejo.

- 4(3) Cabeça, vista de cima, excedendo o prothorax; rostro muito curto aparentemente não segmentado; tarsos do par anterior representados por um artículo achatado provido de cerdas robustas e sem unhas (tarsos palaeformes) **Corixidae**
- 4' Cabeça inserida no prothorax; rostro livre, de 3 a 4 segmentos; tarsos anteriores normais, providos de 2 unhas 5
- 5(4') Tíbias e tarsos posteriores fortemente ciliados; cabeça bem destacada do pronotum; espécies geralmente com mais de 5 mm. de comprimento **Notonectidae**
- 5 Tíbias e tarsos posteriores com 2 fileiras de cerdas cabeça e prothorax mais ou menos fundidos; espécies de corpo fortemente convexo, com menos de 5 mm. de comprimento 6
- 6(5') Antenas de 3 segmentos; scutellum curto e largo; fêmea com ovipositor distinto **Pleidae**
- 6' Antenas de 2 ou 1 segmentos; scutellum longo; fêmea sem ovipositor **Helotrephidae**
- 7(3') Extremidade posterior do abdomen apresentando um longo sifão respiratório, constituído por 2 apêndices filiformes, não retracteis; antenas de 3 segmentos; pernas posteriores não achatadas e sem franja de longos pelos, não adaptadas, portanto para a natação. **Nepidae**
- 7 Extremidade posterior sem sifão respiratório; antenas de 4 segmentos 8
- 8(7) Extremidade posterior do abdomen apresentando um par de apêndices curtos, chatos e retracteis; tíbias posteriores achatadas e com franja de longos pelos; membrana dos hemelítrios reticulada **Belostomatidae**
- 8' Extremidade posterior do abdomen sem os apêndices acima referidos; tíbias posteriores com franja de pelos, porém não achatadas; membrana sem nervuras **Naucoridae** e **Aphelochiridae** (esta sem representantes na região neotropical).

244. **Bibliografia.**

G E R A L

AWATI, P. R.

- 1914 - The mechanism of suction in the potato capsid bug, *Lygus pabulinus* Linn.
Proc. Zool. Soc. Lond.: 685-733, 29 figs.

BAUNAGK E. W.

- 1912 - Statische Sinnessorgane bei den Nepiden.
Zool. Jarb. Anat. 31:179-346, 12 figs., ests. 10-13

BEQTAERT. J.

- 1935 - Presocial behaviour among the Hemiptera.
Bull. Brooklyn Ent. Soc. 30:177-191.

BRANDT, E.

- 1878 - Vergleichend-anatomische Untersuchungen über das Nervensystem der Hemipteren.
Hor. Soc. Eng. Ross. 14:496-505, est. 4.

BREAKEY. E. P.

- 1936 - Histological studies of the digestive system of the squash bug, *Anasa tristis* De G. (Hemiptera, Geridae).
Ann. Ent. Soc. Amer. 29:561-577, 4 ests.

BRENDLEY, M. D. H.

- 1934 - The metasternum and pleuron of Heteroptera.
Trans. Ent. Soc. Lond. 82:43-50, 2 ests.
1938 - The metathoracic postcoxal bridge of Heteroptera.
Proc. Roy. Ent. Soc. Lond. (A) 13 :103-106, 1 fig.

BROCHER, F.

- 1909 - Recherches sur la respiration des insectes aquatiques adultes. La Notonecte. Etude biologique d'un insecte aquatique avec un appendice sur la respiration des Naucorés et des Corises.
Ann. Biol. Lacust. 4:9-32.
1909a - Sur l'organe pulsatile observé dans les pattes des Hémiptères aquatiques.
Ibid.: 33-41.

BUCHNER, P.

- 1922 - Rassem-und Bacteropidenbildung bei Hemipteren-Symbionten.
Biol. Centralbl. 12:38-46.

BUGNION, E. & POPOFF, N.

- 1908-1910 - L'appareil salivaire des Hemipteres.
Arch. Anat. Micr. 10(2); 11(4):435-456, ests 16-18.
1911 - Les pieces buccales des Hemipteres. I.
Arch. Zool. Exp.(5) 7:643-674, ests. 25-27.

CARTER, W.

- 1939 - Injuries to plants caused by insect toxins.
Bot. Rev. 5:273-326.

CHINA W. E.

- 1931 - Morphological parallelism in the structure of the labium in the hemipterous genera *Coptosomoides* and *Bozius* in connection with mycetophagous habits.
Ann. Mag. Nat Hist. (10) 7:281-286.

CORNWALL, J. W.

- 1922-1923 - On the structure of the salivary pump in certain blood-sucking and other insects.
Ind. Jour. Med. Res. 10:996-1007, ests. 75-80,
15 figs.

CRAMPTON, G. C.

- 1922 - The genitalia of the males of certain Hemiptera (Heteroptera) and Homoptera.
Bull. Brookl. Ent. Soc. 17:46-55, 2 ests.

DUFOUR L.

- 1833 - Recherches anatomiques et physiologiques sur les Hemipteres. accompagnées de considerations relatives à l'histoire naturelle et à la classification de ces Insectes.
Mém. Savants Étrang Acad. Sci. Paris, 4:129-462,
ests. 1-19.

EKBLÖM, T.

- 1926 - Morphological and biological studies of Hemiptera-Heteroptera. Part. I.
Zool. Bidrag fran Uppsala. 10:31-180.

ELSON, J. A.

- 1937 - A comparative study of Hemiptera.
Ann. Ent. Soc. Amer. 30:579-597, 4 ests.

FAURÉ-FREMIET, E.

- 1910 - Contribution à l'étude des glandes labiales des Hydrocorises.
Ann. Sci. Nat. (Zool) (9) 12:217-240, est. 11.

GABLER, H.

- 1932 - Regenerationsvorgänge an Heteropteren-Fühlern.
Zool. Anz. 98:275-280, 7 figs.
1934 - Versuche zur Regenerationsfähigkeit der Heteropteren-Fühlern
Zool. Anz. 106:285-298, 7 figs.

GEISE, O.

- 1883 - Die Mundtheile der Rhynchoten.
Arch. Naturg. 49:315-373, est. 10.

GALLIARD, H.

- 1934 - Rôle de la mue embryonnaire des Réduvidés hématophages dans les processus d'éclosion.
Ann. Parasit. Hum. Comp. 12:345-349, 2 figs.

GLASGOW, H.

- 1914 - The gastric caeca and caecal bacteria of the Heteroptera.
Biol. Bull. 26:101-170, 8 ests.

GODGLUECK, U.

- 1935 - Die kataleptischen Erscheinungen bei den Hemipteren.
Zeit. wiss. Zool. 146:678-721, 19 figs.

HAMNER, A. L.

- 1936 - The gross anatomy of the alimentary canal of *Solubea pugnax* (Fab.) (Heteroptera, Pentatomidae).
Ohio Jour. Sci. 36:157-160, 1 fig.

HANDLIRSGH, A.

- 1900 - Zur Kenntnis der Stridulationsorgane bei den Rhynchoten.
Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, 15:127-141.
1900 - Neue Beiträge zur Kenntnis der Stridulationsorgane bei den Rhynchoten.
Ver. zool.-bot. Ges. Wien, 50:555-560.

HEIDEMANN, O.

- 1911 - Some remarks on the eggs of North American species of Hemiptera-Heteroptera.
Proc. Ent. Soc. Wash., 13:128-140, ests. 9-12.

HEYMONS, R.

- 1899 - Beiträge zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Ephyphoriden.
Abh. Kaiser Leop.-Carol. Deuts. Akad. Naturf. 71(5):355-456, 3 ests.

HOKE, S.

- 1926 - Preliminary paper on the wing venation of the Hemiptera (Heteroptera).
Ann. Ent. Soc. Amer. 19:13-28, 5 ests.

HOOD, C. H.

- 1933 - The anatomy of the digestive system of *Oncopeltus fasciatus* Dall. (Heteroptera: Lygaeidae).
Ohio Jour. Sci. 37:151-160, 3 ests.

HORVATH.

- 1911 - Nomenclature des familles des Hémiptères.
Ann. Mus. Nat. Hung., 9:1-3.I.

HUNGERFORD, H. B.

- 1919 - The biology and ecology of aquatic and semiaquatic Hemiptera.
Bull. Univ. Kansas 21(17) (Sci. Bull. 11):3-328, 30 ests.

JACZEWSKI, T.

- 1937 - Allgemeine Züge der geographischen Verbreitung der Wasserhemipteren.
Arch. Hydrobiol. 31:565-591.

KIRKALDY, G. W.

- 1908 - Some remarks on the phylogeny of the Hemiptera-Heteroptera.
Canad. Ent. 40:357-364.

KNIGHT, H. H.

- 1924 - On the nature of the color patterns in Heteroptera with data on the effects produced by temperature and humidity.
Ann. Ent. Soc. Amer. 17:238-272. 1 est.

KUSKOP, A.

- 1921 - Baeteriensymbiosen bei Wanzen.
Arch. Protistenkunde, 47.

LAMEERE, A.

- 1910 - Évolution des Hémiptères.
VI Congr. Intern. Entom. 17-22.

LOGY, W. A.

- 1884 - Anatomy and physiology of the family Nepidae.
Amer. Natur 18:250-255, 353-367: ests. 9-12.

MALOUF, N. S. R.

- 1933 - Studies on the internal anatomy of the stink bug.
Nezara viridula.
Bull. Soc. Roy. Ent. Egypte (1933): 161-203.
ests. 4-7 1 fig.

MAMMEN, H.

- 1912 - Ueber die Morphologie der Heteropteren und Homopteren-Stigmen.
Zool. Jahrb. Anat. 34:121-178, ests. 7-9 22 figs.

MARSHALL, W. S. & SEVERIN H.

- 1904 - Some points in the anatomy of *Ranatra fusca* P.
Beauv.
Trans. Wiscon. Acad. Sci. 14:187-508, ests

MAULIK, S.

- 1916 - The respiratory system of *Nepa cinerea* Linn.
Jour. Zool. Res. 1:41-58.

MEEK, W. J.

- 1903 - On the mouth parts of Hemiptera.
Bull. Univ. Kansas, 3:257-277.

MIGHALK, O.

- 1935 - Zur Morphologie and Ablage der Eier bei den Heteropteren sowie ueber ein System der Eiablagetypen.
Deuts. Ent. Zeits.: 148-175, 27 figs., 1 est.

MOODY, D. L.

- 1930 - The morphology of the repugnatory glands of *Anasa tristis* De Geer.
Ann. Ent. Soc. Amer. 23:81-104, 5 ests.

MUIR, F.

- 1926 - Some remarks on Dr. Hem Singh-Pruthi's paper on the morphology of the male genitalia in Rhynchota.
Proc. Haw. Ent. Soc. 6:323-334, 1 est.

MUIR, F. & KERSHAW, J. C.

- 1911 - On the homologies and mechanism of the mouth parts of Hemiptera.
Psyche, 18:1-12,5 ests.

MYERS, J. G.

- 1929 - Facultative blood-sucking in phylophagous Hemiptera.
Parasitology, 21:472-480.

OEVERMANN, H.

- 1936 - Das statische Verhalten einiger Wasserwanzenarten.
Zeit. wiss. Zool. 147:595-628, 4 figs.

OSBORN, H.

- 1898 - The Phylogeny of the Hemiptera.
Proc. Ent. Soc. Wash., 3:185-190.

PFLUGFELDER, O.

- 1937 - Vergleichend-anatomische, experimentelle und embryologische Untersuchungen über das Nervensystem und die Sinnesorgane der Rhynchoten.
Zoologica, 34(93) 102 p., 21 figs. 25 ests.

POISSON, R.

- 1921 - Contribution à l'étude des Hémiptères aquatiques.
Bull. Biol. Fr. Belg. 58:49-305, 13 ests., 35 figs.
1933 - Quelques observations sur la structure de l'oeuf des insectes Hémiptères-Hétéroptères.
Bull. Soc. Sci. Bretagne, 10:10-77. 31 figs.

PRUTHI, H. S.

- (V. Singh-Pruthi).

PURI, I.

- 1924 - Studies on the anatomy of Cimex lectularius L. I. II.
Parasitology, 16:84-97 e 269-278, 1 est., 18 figs.

ROUSSEAU - Vid. parte de Hemipteros aquáticos na obra deste autor, citada na secção n. 52 do 1º tomo.

SEIDEL, F.

- 1924 - Die Geschlechtsorgane in der embryonalen Entwicklung von *Pyrrhocoris apterus*.
Zeits. Morph. Oekol. Tiere, 1:429-506.

SHARP.

- 1892 - On some eggs of Hemiptera.
Trans. Ent. Soc. Lond. 191-198, ests. 8-9.

SINGH-PRUTHI, H.

- 1925-1926 - The morphology of the male genitalia in Rhynchota.
Trans. Ent. Soc. Lond. 122-254. 27 ests., 3 figs.

SMITH, K. M.

- 1926 - A comparative study of the feeding methods of certain Hemiptera and the resulting effects upon the plant tissue, with special reference to the potato plant.
Ann. Appl. Biol. 13:109-203. 4 ests. e 10 figs.

SPOONER, C. S.

- 1938 - The phylogeny of the Hemiptera based on a study of the head capsule.
Univ. Illin. Bull. 35(70), 102 p., 398 figs.
(Illinois Biological Monographs, 16(3)1-102, 24 ests. 2 figs.).

STOREY, H. H.

- 1939 - Transmission of plant viruses by insects.
Bot. Rev. 5:240-270.

TANAKA, T.

- 1926 - Homologies of the wing veins of the Hemiptera.
Annot. Zool. Jap. 2:33-53, 2 ests.

TAYLOR, L. H.

- 1918 - the thoracic sclerites of Hemiptera and Heteroptera, with notes on the relationships indicated.
Ann. Ent. Soc. Amer. 11:225-254, ests. 20-23.

THEODORO, G.

- 1924 - Sulla struttura delle elitre negli emetteri eterotteri.
Redia, 15:79-86, 3 figs.
1924 - Sopra un particolare organo esistente nelle elitre degli eterotteri.
Id., 15:87-95, 9 figs.

- 1921 - Ulteriori ricerche sull'apparato di uncinamento fra elitre ed ali negli eterotteri.
Boll. Soc. Ent. Ital. 56:34-38.
- 1924 - Sull apparato di uncinamento fra elitre ed all negli eterotteri (5^a contribuziene).
Id. 56 : 124-126.
- TORRE-BUENO, J. R. de la
- 1906 - Aquatic Hemiptera. A study in the relation of structure to environment.
Ann. Ent. Soc. Amer. 9:353-365.
- 1925 - Methods of collecting, mounting and preserving Hemiptera.
Canad. Ent. 57:6-10; 27-32; 53-57.
- TOWER, D. G.
- 1913 - The external anatomy of the squash bug, *Anasa tristis* De Geer.
Ann. Ent. Soc. Amer. 6:427-437, ests. 15-18.
- 1914 - The mechanism of the mouth parts of the squash bug, *Anasa tristis* De Geer.
Psyche, 29:99-108, ests. 1-2.
- TULLGREN, A.
- 1918 - Zur Morphologie und Systematik der Hemipteren. I. Über das Vorkommen von s.g. Trichobothrien bei Hemiptera Heteroptera und ihre mutmassliche Bedeutung für. das Heteropterensystem.
Ent. Tidsk. 39:112-133, 11 figs.
- USLNGE R. L.
- 1934 - Bood sucking among phytophagous Hemiptera.
Canad. Ent. 66:97-100.
- WEBER, H.
- 1930 - Biologie der Hemipteren. Eine Naturgeschichte der Schnabelkerfe.
Berlin. J. Springer, VII+543 p., 329 figs.
- WEDDE, H.
- 1885 - Beiträge zur Kenntniss des Rhynchotenrüssels.
Arch. Naturg. 51(1):113-143, ests. 6-7.

WIGGLESWORTH, V. B.

- 1931 - The physiology of excretion in a blood-sucking insect, *Rhodnius prolixus*. (Hemiptera Reduviidae). I-III
 Jour. Exp. Biol., 8:411-451, 12 figs.
- 1933 - The physiology of the cuticle and of ecdysis in *Rhodnius prolixus* (Triatomidae, Hemiptera); with special reference to the function of the oenocytes and of the dermal glands.
 Quart. Jour. Micr. Sci. 76:269-318, 15 figs.
- 1931 - The physiology of ecdysis in *Rhodnius prolixus* (Hemiptera) II. Factors controlling moulting and metamorphoses.
 Quart. Jour. Micr. Sci. 77: 191-222, 1 est., 15 figs.

WIGGLESWORTH, V. B. & GILLETT, J. D.

- 1934 - The function of the antennae in *Rhodnius prolixus* (Hemiptera) and the mechanism of orientation to the host.
 Jour. Exp. Biol. 11:120-139, 5 figs. e 408-410.

WOTZEL, F.

- 1933 - Zur Kenntnis der Tympanalorgane des *Hydrocores*.
 Zeits. Wiss. Zool. 143:241-126, 18 figs.

SISTEMÁTICA

AMYOT, G. J. B. & SERVILLE, J. G. AUDINET.

- 1843 - Hemipteres. Suites a Buffon. Histoire Naturelle des Insectes.
 Paris, LXXVI, + 675 p., 12 ests.

BEIER, M.

- 1938 - Elfte Uerordnung der Pterygonea: Hemiptera oder Rhynchota.
 In: Kükenthal, Haudb. Zool. 4:2141-2456, 433 figs.

BERG, C.

- 1877-1880 - Hemiptera Argentina. Ensayo de una monografia de los Hemipteros-Heterópteros y Homópteros de la Republica Argentina.
 Anal. de la Soc. Cient. Argent. 5 (1877) :231-260, 297-314; 6 (1878):23-36, 82-89, 129-141, 179-192,

223-233, 261-284; 7 (1879): 11-47, 86-92, 225-236, 262-278; 8 (1879): 19-33, 71-80, 135-144, 178-192, 209-226, 241-272; 9 (1880): 5-125, 158-175.

Este trabalho foi editado em 1879 por P. Coni, em volume separado, com 316 págs.

1880-1884 - Addenda et emendanda ad Hemiptera Argentina.

Idem, 15 (1883): 193-217, 241-269; 16 (1883): 5-32, 73-87, 105-125, 180-191, 231-241, 285-294; 17 (1884): 20-41, 97-118, 166-176.

Este trabalho foi editado em 1884 por P. Coni, em volume separado com 213 págs.

1891-1892 - Nova Hemiptera faunarum Argentinae et Uruguayensis. Buenos Aires, P. coni edit., 112 p.

BLATCHLEY, W. S.

1926 - Heteroptera or true bugs of Eastern North America with special reference to the faunas of Indiana and Florida.

Indianapolis, The Nature Publishing Co., 1116 p., 12 ests., 215 figs.

BÖRNER, G.

1934 - Ueber System und Stammesgeschichte der Schnabelkerfe.

Ent. Beih. Berlin-Dahlem, 1:138-144.

BOSQ, J. M.

1937 - Lista preliminar de los Hemipteros (Heteropteros) especialmente relacionados com la agricultura nacional.

Rev. Soc. Ent., Argent., 9:111-134.

BRITTON, W. E., ABBOTT, T. F., BAKER, A. C., BARBER, H. G., DAVIS, W. T., DELONG, D. M., FUNKHOUSER, W. D., KNIGHT, H. H., MAXSON, A. C., OSBORN, H., PARSHLEY, H. M., PATCH, E. M., STEARNS, L. A., TORRE BUENO, J. R. de la, VAN DUZEE, E. P., WILSON, H. F.

1823 - The Hemiptera or sucking insects of Connecticut.

State Geol. Nat. Hist. Surv., Bull. 34, 807 ps., 169 figs., 20 ests.

CHINA, W. E. & MYERS, J. G.

- 1929 - A reconsideration of the classification of the Cimicoid families (Heteroptera) with the description of two new spider-web bugs.
Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 3:97-125, 5 figs.
- 1933 - A new family of Hemiptera-Heteroptera, with notes on the phylogeny of the suborder.
Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 12:180-196, 4 figs.

DALTAS, W. S.

- 1851-1852 - List of the specimens of Hemipterous insects in the collection of the British Museum.
London, 2 partes.

DISTANT, W. L.

- 1881-1901 - Rhynchola-Heteroptera. In *Biologia Centrali Americana*.
2 vols. London.
- 1902-1918 - The Fauna of British India. including Ceylon and Burma.
Rhynchota, 1 (1902); Heteroptera, 2 (1904); Heteroptera, 3 (1906); Heteroptera - Homoptera, 4 (1908); Homoptera e Appendix-Pentatom., 5 (1910); Heteroptera, Appendix, 6 (1916); Homoptera. Appendix, 7 (1918), Homoptera, Appendix e Heteroptera Addenda.

DUZEE, F. P. van

- 1917 - Catalogue of the Hemiptera of America north of Mexico, excepting the Aphididae, Coccidae. and Aleurodidae.
Univ. Calif. Publ. Div. Ent., Tech. Bull. College of Agriculture, Agricultural Experiment Station, Entomology, vol. II. Berkeley XIV + 902 ps.

EKBLOM, T.

- 1929 - New contributions to the systematic classification of Hemiptera-Heteroptera.
Ent. Tidsk. 50:169-180.

FABRICIUS, J. C.

- 1803 - *Systema Rhyngotorum secundum ordines, genera, species, adjectis synonymis, locis, observationibus, discriptionibus*, 8^{vo} Brunsvigae X + 314 ps.

FLEBER, F. X.

- 1861 - Die europäischen Hemiptera. Halbflügler. (Rynchota Heteroptera) nach der analytischen Methodo bearbeitet.
8vo, Wien, 1860-1861, 1-112 (1860); 113-444 (1861). 2 ests.

HAHN, G. W.

- 1826 - leones ad monographiam Cimicum.
1831 - Die wanzenartigen Insecten.
Nürnberg, vol. I.
1834 - Idem, vol. 2.
1835 - Idem, vol. 3, até a pág. 32.
Para se saber as datas exatas de publicação desta obra ver Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 13 (1914):365.

HERRICH-SCHAEFFER, G. A. W.

- 1836 - Die wanzenartigen Insecten; vol. 3, Nurnberg.
1839 - Idem, vols. 4 e 5.
1842 - Idem, vol. 6.
1844 - Idem, vol. 7.
1848 - ldeim, vol. 8.
1853 - Idem, vol. 9.
1853 - Verzeichniss.

KIRKALDY, G. W.

- 1906 - List of the genera of the pagiopodus Hemiptera-Heteroptera with their type species, from 1758 to 1904 and also of Lhe aquatic anal semi-aquatic Trochalopoda.
Trans. Amer. Ent. Soc. 32(2):117-156.

LAPORTE, F. L. de

- 1832 - Essai d'une classification systematique de l'ordre des H émiptères (Hémiptères-Hétéroptères Latr.).
In Guerin, Magasin Zool. ns. 52-55.

LETHIERRY, L. & SEVERIN, G.

- 1893-1896 - Catalogue général des Hémiptères.
Muséé Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, 3 vols. 1: Pentatomidae; 2: Coreidae. Berytidae, Lygaeidae, Pyrrhocoridae; 3: Tingidae, Phymatidae, Aradidae, Hebridae, Hydrometridae, Henicocephalidae, Reduviidae, Saldidae, Aepophilidae, Ceratocombidae, Cimicidae e Anthocoridae.

MAYR, G. L.

- 1868 - Hemiptera, in Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde.
Zool. Theil. 2(1), 204 ps., 5 ests.

PARSHLEY, H. M.

- 1925 - A bibliography of North American Hemiptera-Heteroptera.
Smith College, 50 th. Anniversary Publications,
Southworth Press, Portland (Maine), IX + 252 ps.

PENNINGTON, M. S.

- 1920-1921 - Lista de los Hemipteros de la Republica Argentina,
47 ps.
Buenos Aires; Impr. Brasil.

REUTER, O. M.

- 1910 - Neue Beiträge zur Phylogenie und Systematik der
Miriden nebst einleitenden Bemerkungen über die
Phylogenie der Heteropteren-Familien.
Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3): IV + 167 ps.
1912 - Bemerkungen über mein neues Heteropteren-system.
Oef. Finsk. Vetens. Soc. Förh., 54 (6) : 1-62.

SEABRA, A. F. de

- 1924-1931 - Sinópsse dos Hamípteros Heterópteros da Portugal.
Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra, (1)1,
1-13, 457 p., 522 figs.

SPINOLA, M.

- 1837 - Essai sur les genres d'insectes appartenants à l'ordre
des Hémiptères, Linn. ou Rhyngotes, Fabr. et à la
section des Hétéroptères, Dufour. 8 vo./II, Gènes,
383 ps., 3 ests.

STAL, C.

- 1808-1860 - Bidrag til il Rio da Janeiro-Traktens Hemipter-Fauna.
Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar.
Parta 1, 2(7):1-84; parte 2, (6):1-75.
1859 - Hemiptera, in Kongliga Svenska Fregatten Eugénies
Resa, etc.
Zool. 1. Insecta: 219-298.
1855 - Nya Hemiptera.
Ofv. Sven. Vet.-Akad. Förh. 12: 181-192.

- 1864-1866 - Hemiptera Africana.
Kongl. Sven. Vet.-Akad. Handl. Parte 1, 7(2):
1-148; parte 2, 8(1) :1-130.
- 1867 - Bidrag till Hemipterernas Systematik.
Ofv. Sven. Vet.-Akad. Förh. 24 (7):491-560.
- 1868-1869 - Hemiptera Fabriciana. Fabricianska Hemipterarter,
efter de i Köpenhamn och Kiel förvarade typerexem-
plaren granskade och beskrifne.
Parte 1, Kongl. Sven. Vet. Akad. Handl. N. S. 7
(11) (1868); parte 2, *op. cit.*, 8 (1) (1869).
- 1870-1876 - Enumeratio Hemipterorum. Bidrag till en För-
teckning öfver alla hittills kända Hemiptera (Index
specierum omnium hucusque cognitarum cum obser-
vationibus systematicis).
Kongl. Sven. Vet.-Akad. Handl. 5 partes, Sto-
ekholm. Parte 1, 9 (1) (1870); parte 2, 10 (4)
(1872); parte 3, 11 (2) (1873); parte 4, 12 (1)
(1874); parte 5, 14 (4) (1876).

STOLL, C.

- 1780 - (1788) -1790 - Représentation exactement colorée d'après
nature des eigales et des punaises que se trouvent
dans les quatres parties du monde, l'Europe, l'Asie,
l'Afrique et l'Amérique.
Amsterdam, 2 vols. 296 ps., 70 ests.

TORRE-BUENO, J. R. de la

- 1939 - A synopsis of the Hemiptera-Heteroptera of America
North of Mexico. Part I. Families Scutelleridae,
Cydnidae, Pentatomidae, Aradidae, Dysodiidae and
Termitaphididae.
Ent. Amer. 19:141-294, 4 ests.

WALKER, F.

- 1867-1873 - Catalogue of the specimens of Hemiptera Hetero-
ptera in the collection of the British Museum.
8 partes, London. Parte 1 (1867); parte 2 (1867);
parte 3 (1868); parte 4 (1871); parte 5 (1872);
partes 6, 7 e 8 (1873).

WOLFF, J. F.

- 1800-1811 - Icones Cimicum descriptionibus illustratae.
Erlangen. Parte 1, 1800; parte 2, 1801; parte 3,
1802; parte 4, 1804; parte 5, 1811.

Subordem **GYMNOCERATA**

Caracteres. - Os Hemipteros desta subordem apresentam antenas mais ou menos alongadas e sempre visíveis quando se os examina pela face dorsal. São insetos geralmente terrestres.

Superfamília **SCUTELLEROIDEA**⁴

(*Pentatomoidea*)

245. **Caracteres e classificação.** - Constituem esta grande superfamília os "percevejos do mato" e espécies afins, geralmente com antenas de cinco segmentos, inseridas em proeminências (*tubérculos anteníferos*) sob as margens laterais da cabeça e um escutelo grande ou muito grande, pelo menos atingindo a base da membrana.

Estão incluídas nesta superfamília as seguintes famílias: **Pentatomidae**, **Cydnidae**, **Thyreocoridae** (*Corimelaenidae*), **Scutelleridae**, **Podopidae** (*Graphosomatidae*) e **Plataspidae** (*Phataspidae*, *Coplosomalidae*). As duas últimas não têm representantes na América meridional.

Em Pentatomidae e Cydnidae os hemelitos são sempre mais ou menos visíveis; em Scutelleridae e Thyreocoridae o escutelo é extraordinariamente desenvolvido, cobrindo completamente os hemelitos.

A superfamília Scutelleroidea é, na ordem Hemiptera, a que tem o maior número de espécies. Calcula-se haver perto de 7.000 espécies descritas.

Família **PENTATOMIDAE**⁵

246. **Caracteres e classificação.** - Os Pentatomideos distinguem-se dos demais Hemipteros da superfamília Scutelleroidea pela seguinte combinação de caracteres: scutellum geralmente plano e estendendo-se até a base da membrana,

⁴ Lat. *scutella*. escudela.,

⁵ Gr. *pente*, cinco; *tomos*, segmento.

porem, quando mais desenvolvido, não cobrindo todo ou quasi todo o, abdomen, como em Scutelleridae e em Thyrocoridae; tíbias raramente espinhosas; quando espinhosas, o corpo não é completamente negro como em Cydnidae,




Fig. 277 - *Euschistus triangulator* (Herrich-Schäffer, 1842), (fêmea) (Fam. Pentatomidae), face dorsal: 1, 1° segmento antenal; 2, olho; 3, ângulo anterior do pronotum; 4, margem lateral (antero-lateral); 5, ângulo lateral (antero-lateral); 6, margem postero-lateral; 7, ângulo postero-lateral; 8, clavus; 9, sutura; 10, corium; 11, ponto terminal do frenum; 12, sutura, membranae; 13, membrana; 14, tylus; 15, jugum; 16, vertex; 17, ocelo; 18, ápice do pronotum; 19, disco do pronotum; 20, base do pronotum; 21, scutellum; 22-26, uromeros 2-6; 27, segmento genital

Da superfamília Scutelleroidea é esta a família que possui o maior número de espécies, espalhadas por todo o mundo porem mais abundantes nas regiões oriental, etiópica e neotrópica.

As espécies da região neotrópica acham-se incluídas nas subfamílias referidas na chave que apresento linhas adiante.

Das subfamílias Tessarotominae e Acanthosomatinae ha poucos representantes na citada região.

A subfamília Phyllocephalinae não tem espécies americanas.

1	Tarsos dímeros	2
1'	Tarsos trímeros	3
2(1)	Scutellum bastante desenvolvido, sem, todavia, cobrir os hemelítrios completamente, apresentando, na parte dorsal, uma conspícua saliência cônica, mais ou menos alongada	Cyrtocorinae
2'	Scutellum normal, plano	Acanthosomatinae
3(1')	Corpo achatado; cabeça, torax e abdomen prolongados em lóbulos foliáceos e denticulados; antenas de 3 segmentos, cobertas pelos prolongamentos foliáceos da cabeça.	Phloeinae
3'	Aspecto diferente do corpo; antenas de 5 ou 4 segmentos. bem visíveis quando se examina o inseto pela face dorsal	4
4 (3')	Búculas pequenas, convergindo posteriormente sob a base do rostrum; este inserido no ápice do tylus e apresentando o segmento basal curto, robusto e livre. Asopinae Búculas longas, paralelas ou subparalelas; rostrum inserido um pouco para trás do ápice do tylus; segmento basal geralmente delgado e em grande parte encaixado entre as bucculae	5
5 (4')	Espiráculos do urosternito basal expostos, não escondidos pelo metasternum	Tessarotominae
5'	Espiráculos do urosternito basal estendidos pela margem posterior do metasternum	6
6(5')	Scutellum relativamente curto, nunca prolongado além do meio do abdomen e com ápice largamente arredondado; membrana dos hemelítrios muito maior que o corium	Dinidorinae
6'	Scutellum geralmente prolongado além do meio do abdomen e com ápice geralmente pontegudo ou estreitamente arredondado; membrana dos hemelítrios não muito maior que o corium	Pentatominae

Subfamília CYRTOCORINAE⁶

247. Principais representantes. - As espécies que constituem esta subfamília são interessantes pelo aspecto curioso do scutellum. De fato, qualquer Cirtocorineo, visto de cima, dá-nos a impressão de uma minúscula máscara, cujo nariz é representado por um apêndice que se eleva sobre o scutellum.

Representam-na os gêneros *Cyphothyrea* Horváth, 1916, *Cyrtocoris* White, 1842 e *Ceratozygum* Horváth, 1916, com a espécie única *C. horridum* (Germar, 1839) (fig. 228).




Fig. 228 - *Ceratozygum horridum* (Germar, 1839), (fêmea) (Cyrtoacorinae).

Esta espécie apresenta notável dimorfismo sexual, pois, nos machos, os jugos são prolongados em dois longos processos, quasi tão alongados quanto o pronoto, tendo, cada um, um conspícuo dente no bordo externo.

No Rio de Janeiro o Engenheiro Agrônomo ARISTOTELES SILVA (1936) encontrou o *Cyrtocoris gibbus* (Fabr., 1803), vivendo sobre galhos de bracatinga (*Mimosa scabrella*).

Alguns autores elevaram esta subfamília à categoria de família (Cyrtoacoridae).

⁶ Gr. *cyrto*, curvo; *coris*, percevejo.

Subfamília PHLOEINAE 7

248. **Espécies que a constituem.** - Esta subfamília, também elevada por alguns autores à categoria de família (Phloeidae), compreende os gêneros *Phloea* Le Peletier & Serville, 1825, *Phloeophana* Kiraldy, 1908 e *Serbana* Distant, 1906.

Excetuando este último gênero, com uma espécie de Borneo, as demais espécies de *Phloea*: *Phloea corticata* (Drury, 1773) (fig. 230) (*P. subquadrata* Spinola, 1837), como a espécie única de *Phloeophana* (*P. paradoxa* (Burmeister, 1835) (*nec* Hahn., 1834) (fig. 229), habitam o Brasil.



Figs. 229 e 239 (respectivamente) *Phloeophana paradoxa* (Burmeister, 1835) (fêmea) e *Phloea corticata* (Drury, 1773) (fêmea) (Phloeinae).

Estes insetos foram estudados por PEREZ (1904), MAGALHÃES (1909), R. VON IHERING (1909) e BRIEN (1930).

Vivem sobre o tronco ou galhos das plantas, em perfeita homocromia com os líquens que as revestem.

BRIEN, após considerações sobre a morfologia e etologia destes percevejos, em parte já estudadas por PEREZ e MAGA-

7 Gr. *phloios*, casca.

LHÃES, comunicou algumas observações interessantes respeito à biologia de *P. paradoxa* (= *Phloea longirostris* Spinola, 1837), por ele observada no Rio de Janeiro sobre a amendoeira (*Terminalia catapa*).

Tratando da proteção das formas jovens pela *Phloea* mãe, escreve o seguinte trecho:

"La femelle de *Phloea paradoxa* pond huit à douze œufs, cylindriques parfaitement blancs, alignés sur Fécoree comme de petites perles qui seraient frés visibles. Mais la mère reste appliquée contre ses œufs, sans que sa présence soit cependant nécessaire à leur éclosion. J'ignore to temps de cette pseudo-incubation. Mais sitôt écloses, les larves s'acerochent aux sternites de la mère qui cache et porte sous le ventre sa pelite famille. Ces larves (Figs. I, II, III el IV) dissimulées sous la mère sont blanches, pareilles, du moins à un certain stade de développement, à de petites outres gonflées (Fig. III). Elles ne quitteront la mère qu'à un stade avancé (Fig. IV), stade ou elles ont acquis les caractères mimétiques. Thomochromie, Taplatissement. les lobos foliacés que nous avons signalé chez Tadulte.

Il semble done bien que la Phlée maternelle protège ses petits. De plus il est bien probable qu'elle contribue à leur nutrition. En effet jusqu'au stade roprésenté par la Fig. V. le rostre des larves est trop faible pour perforcer Técoree du *Terminalia catapa*. D'autre part, détachées de la mère, les larves meurent d'inanition, Les larves se nourriront-elles d'une exerétion maternelle, ou bien récolteraient-elles le peu de séve qui suinte du rostre de la mère pendant la succion. Je n'ai pu faire aucune observation à ce sujet."

O meu auxiliar Charles Hathaway leve o ensejo de verificar a exatidão das observações de MAGALHÃES e de BRIEN, com uma fêmea de *P. paradoxa*, que vivia agarrada ao tronco de um cambuí.

Subfamília ASOPINAE ⁸*(Cimicinae)*

249. **Espécies mais interessantes.** - Os Pentatomídeos desta subfamília podem ser considerados como insetos fiteis à agricultura, pois, em geral, são, predadores, de ovos, larvas e adultos de insetos pragas. As espécies mais conhecidas ou atacam lagartas (larvas de Lepidópteros), ou ovos, larvas e bezouros adultos da superfamília Chrysomeloidea (v. aspecto do rostrum na fig. 231).




Fig. 231 - Cabeça de Asopinae: 1, búcula; 2, 1º segmento do rostrum.

Fig. 232 - *Alcaeorrhynchus grandis* (Dallas, 1851) (Asopinae).

As primeiras formas jovens de algumas espécies sugam selva das plantas, enquanto que as ninfas e os adultos, ou são exclusivamente predadores, ou têm um regime alimentar mixto, isto é, são predadores e sugadores de seiva.

Aliás na subfamília Pentatominae, principalmente representada por espécies sugadoras de selva, ha algumas que podem, facultativamente, comportar-se como fitófagas ou como predadoras. É o caso do *Euschistus variolarius* (Pa-

⁸ Etimologia desconhecida.

lisot de Bauvois, 1805), percevejo que, nas Estados Unidos, tem sido também observado sugando lagartas e a cochonilha *Pulvinaria inumerabilis*.

Nos Asopineos, como nos Hemípteros essencialmente predadores, o mesenteron não apresenta as criptas pigmentadas onde se alojam bactérias simbióticas, presentes na maioria das espécies fitófagas.



Fig. 233 - *Apateticus* (*Eupodisus*)
mellipes (Bergroth, 1891) (Asopinae).

Os nossos Asopineos mais interessantes, sob o ponto de vista econômico, foram estudados num trabalho de ARISTOTELES SILVA (1933), que trata das seguintes espécies:

Oplomus (Catostyrax) catena (Drury, 1782) (fig. 234), encontrado na natureza sugando lagartas de *Actinote pelle-nea* (fam. Acraeidae), que vive em "erva de lagarta" (*Eupatorium* sp.). Até a primeira ecdise as formas jovens deste percevejo sugam a selva da erva de lagarta.

Apatetieus (Eupodisus) mellipes (Bergroth, 1891) (figura 233). As formas jovens do primeiro estágio sugam folhas de maracujá; as dos estádios seguintes são predadoras de lagartas da borboleta do maracujá, *Dione juno* fam. Heliconiidae).

Alcaeorhynchus grandis (Dallas, 1851) (fig. 232), encontrado na natureza depredando lagartas da borboleta do maracujá, *Dione juno*.

Na República Argentina este mesmo inseto é predador de lagartas de *Papilio thoanthoides*, *Megalopyge urens* e *Automeris coresus*.

Lembro-me ter visto, ha tempos, uma espécie de *Oplo. nus* sugando, lagartas de *Alabama argillacea* (curuquerê, mariposa do algodoeiro).




Fig. 234 - *Oplonus (Catostyrax) catena* (Drury, 1.872) (Asopinae).

Fig. 235 - *Coryzorhaphis leucocephala* Spinola, 1837 (Asopinae).

Fig. 236 - *Stiretrus (Stiretrus) smaragdalis* (Lepeletier & Serville, 1328) (Asopinae).

Fig. 237 - *Stiretrus (Stictonotion) decastigma* (Herrich-Schäffer, 1838) (Asopinae).

Nas figuras 235, 236 e 237 estão representadas mais três espécies, aliás das mais belas desta subfamília, a saber: *Sliretrus (Stiretrus) smaragdalis* (Lepeletier et Serville, 1828) (= *chalybaeus* Herrich-Schaeffer, 1836; *chrysoprasinus* Herrich-Schaeffer, 1838) (fig. 236), de cor verde ou

azul violácea brilhante; *Stiretrus* (*Stictonotus*) *decastigma* (Herrich-Schäffer, 1838) (= *septemguttatus* Germar, 1839) (fig. 237), de cor azul muito escura, com 10 máculas alaranjadas, tres no pronotum, tres no escutelo e duas em cada hemelito e *Coryzorhaphis leucocephala* (Spinola, 1837) (fig. 235), de cor geral vermelha, coral; a ponta do escutelo, os largos aneis nos fêmures e nas tíbias e grande parte da cabeça, em cima e em baixo, são de cor amarela-creme, as partes restantes da cabeça e das pernas são de cor negra.




Fig. 238 - Cabeça de Pentatominae:
1, buccula; 2, 1º segmento do rostrum

Subfamília DINIDORINAE⁹

250. **Espécies que a constituem.** - Desta subfamília ha na região neotrópica apenas o gênero *Dinidor* Latreille, 1829, aliás com poucas espécies.

No Brasil encontra-se mais frequentemente *Dinidor mactabilis* (Perty, 1833) (fig. 254).

Subfamília PENTATOMIDAE

251. **Caracteres, etc.** - É esta a subfamília de percevejos do mato que abrange a maioria das espécies de Pentatomidae.

⁹ Etimologia desconhecida.

Vivem os Pentatomíneos sobre as plantas, alimentando-se, quasi todos, de seiva. Alguns, entretanto, são eventualmente predadores, sugando a hemolinfa de outros insetos.

Os ovos são colados a folhas em duas ou mais séries ou carreiras paralelas, cada uma com um número variável de ovos. De forma variável nas diferentes espécies, ora são esféricos, ora cilíndricos, ou com a conformação de um barril, apresentando o polo livre distintamente operculado.



Fig. 239-241 - Postura de *Mecistorhinus* (*Antiteuehus*) *mixtus* sobre caule de *Grevillea robusta*: em cima, à esquerda, vista de face e consideravelmente aumentada; à direita a mesma postura vista de lado; em baixo, os mesmos ovos das figuras anteriores, vendo-se, por transparência, a cabeça da forma jovem prestes a sair (Foto Federman, ofer. Cezar Pinto).

Quando as formas jovens estão prestes a sair do ovo, vê-se, através da casca (*corion*) e sobre a cabeça do embrião, uma peça em forma de *T*, usada para romper o ovo (*ruptor ovi*). Tal peça, após a saída da forma joven, fica aderente à casca vasia (v. figs. 241 e 242).

252. **Espécies mais interessantes.** - Das várias tribus em que se divide a subfamília Pentatominae, incontestavelmente é Pentatomini a de maior importância, não somente pelo número de espécies que a constituem, como também pelo interesse agrícola de várias. Também algumas espécies das tribus **Edessini** e **Discocephalini** podem, às vezes, causar danos notáveis às plantas cultivadas.




Fig. 242 - Polo livre de um dos ovos da figura anterior, fortemente aumentado, vendo-se, através do corio, a cabeça da forma jovem prestes a sair e o *raptor ovi* (Toledo del., Cezar Pinto ofer.)

Assim, **Edessa meditabunda** (Fabricius, 1794) (= *E. glaucescens*, Fabricius, 1796), em São Paulo, ataca o tabaco. No Rio de Janeiro, FERREIRA LIMA observou-a sugando laranjeiras e JALMIREZ GOMES (1936), atacando *Dhalia variabilis*.

Em Minas Gerais MONTE (1932) encontrou **Edessa rufomarginata** (De Geer, 1773), espécie extremamente variável, atacando o tabaco e outras Solanáceas. Na República Argentina BLANCHARD (*apud* BOSQ, 1932) observou-a causando sérios danos na batatinha (*Solanum tuberosum*).

Da tribu Discocephalini os percevejos mais conhecidos em nosso território pertencem aos gêneros *Mecistorhinus* Dallas, 1851, *Neodine* Kirkaldy, 1909 e *Dinocoris* Burmeis-

ter, 1835¹⁰. Deste último as espécies mais comuns são: **Dinocoris histrio** (Linne, 1758) (= *peregrinator* Linne, 1758), **D. variolosus** (Linne, 1758) e **D. maculatus** Laporte, 1832; geralmente polífagas.

Tambem as espécies de *Discocephala* e *Platycarenum*, às vezes, causam danos apreciáveis; C. Reiniger teve o en-




Fig. 243 - *Mecistorhinus (Antiteuchus) mixtus* (Fabr., 1787), (fêmea) (Discocephalini).

sejo de observar, no Rio de Janeiro, forte infestação de *Bougainvillea* por **Piatycarenum vicinus** (Signoret, 1851).

Na Baía, segundo BONDAR (1925), **Neodine macraspis** (Perty, 1833) e **Mecistorhinus amplus** (Walker, 1876), danificam folhas e frutos de cacaueteiro, atacando também o primeiro o colateiro. No Rio de Janeiro e São Paulo vêem-se fre-

¹⁰ No catálogo de Kirkaldy *Dinocoris* é citado na sinonimia de *Empicoris* Hahn, 1834. Este nome, porém, não pode ser usado, por ser homônimo de *Empicoris* Wolff, 1811, empregado para espécies da família *Ploiariidae* (Reduviidae).

quentemente **Mecistorhinus (Antiteuchus) mixtus** (Fabricius, 1787)¹¹ (figs. 243 e 244) e **Mecistorhinus (Antiteuchus) melanoleucus** (Westwood, 1837) (figs. 257 e 258), sugando várias plantas.

Como espécies mais importantes de Pentatomini devo citar, além das pertencentes ao gênero *Mormidea* Amyot



J.F. Fabricius del.


Fig. 244 - *Mecistorhinus (Antiteuchus) mixtus* (Fabr., 1787): 1ª forma joven.

de Serville, 1843, mencionadas linhas adiante, as seguintes: **Arvelius albopunctatus** (De Geer, 1773) (fig. 264), visto em quasi toda a região neotrópica, atacando Solanáceas, preferencialmente o tomateiro.

Nezara (Nezara) viridula (Linne, 1758.) (fig. 250), percevejo praga, hoje cosmopolita, encontrado sobre várias

¹¹ Enviado um exemplar deste inseto ao British Museum, foi identificado com *Mecistorhinus variolosus* (Westwood, 1837). A meu ver, a espécie de Westwood parece ser uma variedade de *mixtus* (Fabr.).

plantas, principalmente Leguminosas dos gêneros *Crotalaria* e *Phaseolus* (v. trabalhos de JONES (1918), DRAKE (1920), TURNER (1923), BOSELLI (1932), MALOUF (1933) e VAN HEERDEN (1933)).



- Fig. 240 - *Edessa dallasi* Distant, 1881 (fêmea) (Edessini).
 Fig. 246 - *Arocera (Arocera) acroleuca* (Perty, 1833). (fêmea) (Pentatomini).
 Fig. 247 - *Evoplilus humeralis* (Westwood, 1837), (fêmea) (Pentatomini)
 Fig. 248 - *Chlorocoris tau* Spinola, 1837. (fêmea) (Pentatomini).

Ogmocoris reinigeri Costa Lima, 1935. No Rio Grande do Sul ataca o arroz nas espigas, causando danos equivalentes aos produzidos pelas espécies de *Mormidea*.

Piezodorus guildini (Westwood, 1837) (fig. 260). Em Porto Rico WOLCOTT (Insectae Borinquensis, 1936) encon-

trou-o, sobre feijões e outras plantas. Em Minas Gerais ataca *Crotalaria*, segundo observação de MONTE (1937).

Runibia perspicua (Fabricius, 1796) (fig. 266). Esta espécie, cujo *habitat* se estende da América Central ao Brasil, ataca a pereira, em Nova Friburgo.

Placocoris viridis Mayr, 1864 (fig. 267), Pentatomídeo bastante curioso, não somente pelo excessivo achatamento do corpo, como pela configuração geral, que lembra a de



Fig. 249 - *Peromatus notatus*
(Burmeister, 1835), (fêmea) (Edessini).

um Cidnideo; todavia, se neste percevejo os fêmures são denteados em baixo, as tíbias são absolutamente desprovidas de espinhos.

253. **Espécies de Mormidea.** - Como mais frequentemente encontradas no Brasil, causando danos principalmente às Gramíneas cultivadas, citarei as seguintes:

M. ypsilon (Linne, 1758), **M. v-luteum** (Lichtenstein, 1796), **M. notulifera** Stal, 1860 e **M. exigua** Berg, 1891 (figuras 268-272).

Ha, todavia, uma que merece citação especial, parece ser a causadora dos maiores estragos nos nossos arrozais; quero, referir-me à **Solubea poecila** Dallas, 1851.

espécie provavelmente existente em todo o Brasil pois tem sido assinalada das Guianas ao Rio Grande do Sul.

No Norte chamam-na "pulgão", "pulga d'anta" e "chupão". Em Mato Grosso apelidaram-na "chupador". No Rio Grande do Sul, onde é a maior praga do arroz, é conhecida




Fig. 250 - *Nezara (Nezara) viridula* (L., 1758), fêmea (Pentatomini)
 Fig. 251 - *Nezara (Acrosternum) marginata* (Palisot, 1805), (fêmea) (Pentatomini).
 Fig. 252 - *Euschistus latus* Dallas, 1852, (fêmea) (Pentatomini).


pelo nome "frade". Em São Paulo e em Minas Gerais dão-lhe o nome "tamanjuá".

Dentre as mais recentes publicações que tratam desta praga citarei as de SQUIRE (1934), de REINIGER e FERREIRA LIMA (1935). Na bibliografia cito também o interessante tra-

balho de DAMPF (1927) sobre *Mormidea angustata* (Stal, 1862), que, no México, se comporta semelhantemente à *M. poecila* em nosso país.

São do trabalho de REINIGER e LIMA (1935) os trechos seguintes:

"*Biologia* - A *Mormidea* sp. como a *poecila*, faz suas posturas sobre as folhas, colmos e, algumas vezes, sobre os próprios grãos nas panículas. Estes ovos são de forma cilíndrica, de cor branco-amarelada e, à proporções que o em-



- Fig. 253 - *Dinocoris gibbus* (Dallas, 1852), (fêmea) (Discocephalini).
 Fig. 254 - *Dinidor mactabilis* Perty, 1833,) (fêmea) (Dinidorinae).
 Fig. 255 - *Proxys punctulatus* (Palisot, 1805), (fêmea) (Pentatomini).
 Fig. 256 - *Euschistus* sp., (fêmea) (Pentatomini).

brão vai se desenvolvendo, vão tornando-se escuros. Medem, mais ou menos, sete décimos de milímetro de altura, por cinco décimos de milímetro de diâmetro. São postos em grupos, unidos uns aos outros, formando filas e, comumente, em camadas superpostas, cobrindo, muita vez, toda

a extensão de uma folha em ambos os lados. Nos colmos as posturas são feitas ao redor dos mesmos, contornando-os completamente e a certa altura do solo.

Dos ovos saem as formas jovens, pequeníssimas e escuras, que se transportam de pé para pé em procura de alimento. À proporção que sugam os grãos nas panículas, vão aumentando de tamanho, lembrando sua forma a de um pequeno percevejo de cama. São então apteras, aparecendo o abdomen de cor laranja-vermelhado ou castanho-claro, com manchas pretas em sua linha mediana. O torax nesse estado é de cor preta. Até chegar a adulto, sofre o inseto cinco mudas de pele.




Fig. 257 e 258 - *Mecistorhinus (Mecistorhinus) melanoleucus* (Westwood, 1837), (fêmea e macho) (Discocephalini).

Fig. 259 - *Mecistorhinus sepulcrales* (Fabr., 1831), (fêmea) (Discocephalini).

Fig. 260 - *Piezodorus guildini* (Westwood, 1827), (fêmea) (Pentatomíni).

Fig. 261 - *Beroaldus* sp. (fêmea) (Discocephalini).

Essas formas jovens são voracíssimas, encontrando-se-as cobrindo sempre quase totalmente as panículas, sugando-lhes os grãos.

Provocam com essa sucção o emurchimento das sementes, tornando-as "chochas". ou deixando unicamente a casca vazia, quando o amido ainda se apresenta em estado leitoso. Ha ocasiões em que não conseguem sugar o grão, provocando então uma mancha característica de cor marron escura, que muito o deprecia comercialmente. Em certos

casos, notamos que, pelo orifício de penetração do rostrum (tromba), começava a germinação do grão ainda no pé, devido à entrada de umidade.

Nos dias nublados os insetos se apresentam em maior atividade, pois o calor forte do sol, seguindo observações de von Parseval, os aborrece, obrigando-os a protegerem-se nas partes inferiores das plantas, junto ao solo. Os adultos, em




Fig. 262 - *Loxa flaricollis* (Drury, 3773), (macho) (Pentatomini).
 Fig. 263 - *Arocera (Euopta) spectabilis* (Drury, 1782, (macho) (Pentatomini).
 Fig. 264 - *Arrelius albopunctatus* (De Geer, 1773), (fêmea) (Pentatomini).
 Fig. 265 - *Edessa* sp.

geral, têm por hábito, nos dias muito frios, abrigarem-se nos montes de palha que por acaso haja nas taipas, em medas velhas, nas frestas e nas cobertas dos depósitos e choupanas do sapê, em restolhos e palhas dos antigos pontos de trilhagem. No inverno, conforme observou o administrador da Granja Santa Rita Ltda., é nesses lugares que se

agasalham contra as inclemências das baixas temperaturas e geadas, como que em estado de hibernação.



Fig. 266 - *Runibia perspicua*
(Fabricius, 1796), (fêmea)
(Pentatomini).



Fig. 267 - *Placocoris viridis* Mayr,
1864, (fêmea) (Pentatomini).

Como as formas jovens, os adultos sugam as sementes e voando, percorrem grandes áreas dos arrozais, sempre reunidos em verdadeiras nuvens. Seu vôo contínuo pode alcançar, aproximadamente, de 20 a 50 metros.





Fig. 268 - *Mormidea poecila* Dallas, 1851 (Pentatomini).
Fig. 269 - *Mormidea exigua* Berg, 1891 (Pentatomini).
Fig. 270 - *Mormidea ypsilon* (Linne, 1758) (Pentatomini).
Fig. 271 - *Mormidea v-luteum* (Lichtenstein, 1796) (Pentatomini).
Fig. 272 - *Mormidea notulifera* Stal, 1860 (Pentatomini).

Verificámos que esses insetos são políffagos, pois, além do arroz, alimentavam-se também de joá (*Solanum sysimbrifolium*), pimenteira brava (*Solanum* sp), milhã (*Panicum sanguinalis*) e capim arroz (*Panicum crusgalli*).

No arroz, notámos que eles sugavam tanto as sementes verdes como as maduras, talvez porque na ocasião se apresentassem as últimas amolecidas pelo tempo tímido que ia fazendo, não dando preferência a esta ou àquela variedade.



Oebalus

Fig. 272 - *Solubea poecila*
Dallas, 1851 (Pentatomini) (Lacerda del.).

Em um grande número de tableiros de "Japonês", em que a vegetação estava acamada por efeito de ventos fortes anteriores, os danos causados se apresentaram em maior vulto, ficando mesmo a maioria deles totalmente perdida. Em outros, também da mesma variedade, em que, por terem sido plantados em terras pobres, a cultura se apresentava menos densa, notava-se que a percentagem de infestação era bem menor.

O "Blue Rose" foi bastante prejudicado, se não mais do que o "Japonês", daí nossa afirmativa de não haver prefe-



Fig. 274 - *Scaptocoris* sp. (Cydnidae).

rência do inseto para uma dessas duas variedades. Seria de grande proveito que isso se desse, pois poder-se-ia resolver assim, usando a variedade resistente, o sério problema de prevenção e combate a essa terrível praga.



Fig. 275 - *Prolobodes giganteus* (Burmeister, 1835)
(Cydnidae)

Medidas de combate - Apesar dos técnicos, em sua maioria, indicarem as capinas aos vegetais hospedeiros, a

apanha de posturas nas folhas, colmos e panículas, a caça direta por meio de rede "caça-borboletas". armadilhas luminosas, julgamos, por ora, tais medidas complementares. Fazem-se necessárias experiências detalhadas a respeito, afim de se poder dizer da sua eficiência. Achamos que somente uma erradicação no começo, quando ainda existem os focos iniciais, dará resultados satisfatórias. Esta deve ser feita ou com aplicação de "vassouras de fogo", ou contornando os focos com palha seca e ateando-lhes fogo e, no caso dos focos se acharem nos tableiros. depois de se ter esvasiado a água dos mesmos. É preciso não esquecer, no entretanto, que somente com fiscalização direta e enérgica, se conseguirá fazer alguma coisa, pois, no geral, o agricultor recebe mal os conselhos técnicos, por achar que devem ser aplicados meios de combate enérgicos que dizemem a praga de um dia para o outro, o que é impossível, dada a extensão formidável das culturas do arroz.

Como combate auxiliar, podemos indicar a apanha das posturas nas folhas, colmos e panículas, bem como a incineração, nos meses de julho e agosto, dos pontos de hibernação de que falámos anteriormente.

Família **CYDNIDAE**¹²

254. **Caracteres e espécies mais interessantes.** - Constituída por cerca de 500 espécies, das quais, as maiores, não atingem a dois centímetros; em geral são de cor negra ou parda, providas de um escutelo com a forma típica, triangular, dos Pentatomídeos; em Cydnidae, porem, as tíbias são distintamente espinhosas e as do par anterior, não raro fossoriais, armadas de espinhos agudos ou obtusos na borda externa.

Estes Hemípteros são terrícolas, vivendo frequentemente enterrados no solo ou escondidos sobre pedras.

Ao sugarem raizes, podem, eventualmente, tornar-se daninhos.

De importância agrícola no Brasil ha apenas a referir as espécies de *Scaptocoris* Perty, 1830 (fig. 274), especialmente **Scaptocoris castaneus** Perty, 1830, de cor parda e

¹² Gr. *cydnos*, famoso.

pernas dos pares anterior e posterior de conformação peculiar; observado em Minas Gerais e São Paulo, sugando raízes de arroz, algodoeiro e feijão.

Em Mendoza (República Argentina), *Scaptocoris terginius* Schioedte, 1849, segundo BOSQ (1934), causa danos nas plantações de tomateiro (*Solanum lycopersicum*) e de pimenteira (*Capsicum* sp.).



Fig. 276 - *Prolobodes giganteus* (Burmeister, 1835). Vêm-se, por transparência, as peças bucais estiliformes enroladas dentro do 2º segmento sacciforme (X 16) (Cydnidae).

Na figura 275 está representado *Prolobodes giganteus* (Burm., 1835), um dos maiores Cidnideos que se conhece, que apresenta, como as demais espécies de *Prolobodes* Amyot & Serville, 1843 (= *Lobostoma* Amyot & Serville, 1843), um divertículo sacciforme no segundo segmento do rostrum, lembrando, a bolsa apensa à maxila inferior dos pelicanos. Dentro desse divertículo, como se pode verificar na figura 276, ficam enrolados os estiletos bucais.

Observa-se, pois, nestes insetos uma disposição semelhante à que foi assinalada por CHINA (1931) para *Bozius* (fam. *Plataspidae*). Conforme sugeriu aquele autor, o extremo alongamento dos estiletos bucais parece indicar tratar-se de uma adaptação para a sua penetração ao longo do micélio dos fungos de que estes insetos se alimentam.

(Ler também a respeito o interessante estudo de ELSON (1937).

Família **THYREOCORIDAE**¹³*(Corimelaenidae)*¹⁴

255. **Caracteres e espécies mais interessantes.** - As espécies que constituem esta pequena família (cerca de 200), de alguns milímetros de comprimento e quasi sempre de cor negra brilhante ou fosca, têm o escutelo grande, fortemente convexo, cobrindo, todo ou quasi todo o abdomen. As tíbias, como em Cydnidae, são tambem espinhosas (exceto em Megaridinae e Canopinae).

No meu 3º Catálogo (1936), citei apenas a *Corimelaena basalis* (Germar, 1830), encontrada por BARBIELLINI em São Paulo, sobre figueiras. Enviado o inseto a Mc ATEE, um dos autores da mais recente revisão deste grupo, ele verificou tratar-se de *Galgupha (Acrotmetus) schulzii* (Fabricius, 1781) e não daquela espécie, atualmente designada *Galgupha (Euryscytus) basalis* (Germar, 1830).

As pequeninas espécies, genuinamente neotrópicas, das subfamílias Megaridinae, com o gênero único *Megarid* Stal, 1862, e Canopinae, exclusivamente constituída pelo gênero *Canopus* Fabricius, 1803 (= *Claenocoris* Burmeister, 1835), são bem curiosos pela forma hemisférica do corpo, que lembra a de uma "joaninha".

Família **SCUTELLERIDAE**¹⁵

256. **Caracteres e espécies mais interessantes.** - Pelo extraordinário desenvolvimento do escutelo estes percevejos podem ser confundidos com os da família precedente. Nos Thyreocorideos, porem, sempre de pequeno porte e de cor negra, as tíbias são providas de espinhos mais ou menos robustos.

13 Gr. *thyreus*, escudo; *coris*, percevejo.

14 Gr. *coris*, percevejo; *melas*, negro.

15 Lak. *scutella*, escudela.

Os Pentatomídeos do gênero *stiretrus* Laporte, 1832 (subfamília Asopiníae) (v. figs. 236 e 237), apresentam também um grande escutelo, que quase atinge o ápice do abdômen; neles, porém, além do aspecto característico do rostrum e das búculas, ha um processo espiniforme na base do abdômen, que se prolonga até as ancas médias, não encontrado em Scutellerídae.

Em geral os Escutellerídeos, na fase adulta, apresentam cores mais ou menos vistosas.



Fig. 277 - *Augocoris illustris* (Fabricius, 1781)
(Scutellerídae, Scutellerínae).

Os jovens de *Pachycoris* Burmeister, 1835, no 1º instar, são de cor vermelha brilhante e de um verde bronzeado, com as partes laterais do pronoto de cor alaranjada, nos estádios seguintes.

A propósito da cor destes insetos devo lembrar a extrema variabilidade de algumas espécies, não só no colorido, como na forma dos desenhos torácicos.

Assim, por exemplo, ***Pachycoris torridus*** (Scopoli, 1772), percevejo do pinhão do mato (*Jatropha curcas*) (às vezes também encontrado sugando goiabeira), fartamente conhecido em toda a região neotropical pelas variações extremas com que se nos apresenta, já foi descrito umas oito vezes como nova espécie.

Como também se observa com outros Pentatomídeos, as fêmeas deste inseto, depois da postura, assestam-se sobre os ovos, como que os chocando, e, espontaneamente, so abandonam as formas jovens depois de terem realizado a 1ª ecdise. Todavia, quando se obriga uma fêmea a largar a ninhada que protege, ela não, mais voltará à posição primitiva, mesmo colocando-se-a sobre a respectiva ninhada.




Fig. 278 - Postura de *Pachycoris torridus* (Scopoli, 1778) (Scutelleridae, Tetyrinae) (muito aumentado). Os ovos mais escuros são parasitados.

Walter Cruz, criando este inseto em laboratório, verificou ser necessário dar-lhe como alimento, além de galhos e folhas, sementes de pinhão. Estas, aliás, parecem ser o alimento exclusivo procurado pelas primeiras formas jovens.

Também, como sucede com os demais percevejos desta grande superfamília, o *Pachycoris torridus*, quando excitado, emite secreção odorante. Todavia, o cheiro, *sui generis* e não de todo desagradável, difere consideravelmente do repugnante e bem conhecido "cheiro de percevejo do mato".

Muito se tem escrito sobre este curioso inseto; dentre os mais recentes artigos devo mencionar os de SMYTH (1919), HUSSAY (1934) e MONTE (1937).

Não conheço espécie alguma desta família que danifique as nossas plantas cultivadas.

257. Meios de combate aos percevejos do mato da super-família Scutelleroidea. - Contra os percevejos na fase adulta ou de ninfa é inútil o emprego de pulverizações de quaisquer líquidos insecticidas. Estes - de preferência uma emulsão sabonosa de querosene ou uma solução de nicotina - devem ser aplicados contra as primeiras formas jovens.



Fig. 279 - *Agonosoma flavolineatum* Laporte, 1832 (Scutelleridae, Tetyrinae).
 Fig. 280 - *Galeacius martini* Schouteden, 1901 (Scutelleridae, Tetyrinae).

Uma boa medida profilática, não só aconselhável no combate aos percevejos do mato como aos demais hemipteros sugadores de plantas, é manter o terreno, nas proximidades das plantas que se procura proteger, sempre limpo de qualquer vegetação que possa servir de abrigo aos insetos daninhos. Entretanto, em Flórida, onde a *Nezara viridula* danifica consideravelmente às laranjas, segundo WATSON (1926), a cultura de *Crotalaria*, como planta-armadilha ou protetora, permite que se evitem tais danos, pois os insetos, preferindo as favas dessa planta, podem ser mais facilmente destruídos mediante o corte da planta realizado antes de poderem passar para as laranjas.

258. **Inimigos naturais de Scutelleroidea** - Os Hemipteros da superfamília Scutelleroidea, como os demais insetos, são naturalmente controlados por vários predadores e parasitos. Assim, os ovos de *Pachycoris torridus* são frequentemente parasitados pelo microimenoptero *Pseudotelenomus pachycoris* Costa Lima, 1928 (fam. Scelionidae).

Dois outros Scelionideos, no Rio Grande do Sul, parasitam ovos de *Mormidea poecila*: *Telenomus mormideae* Costa Lima, 1935 e *Microphanurus mormideae* Costa Lima, 1935.




Fig. 281 - Postura de *Edessa* sp.; ovos parasitados por *Neorileya* sp. (cerca de X 4).

Os ovos de *Piezodorus guildini* são parasitados, em Belo Horizonte, por *Microphanurus scuticarinatus* Costa Lima, 1937.

O meu auxiliar CH. HATHAWAY teve o ensejo de observar que os ovos de uma espécie de *Edessa*, aparentemente indistinguível de *E. praecellens* (Stal, 1862), são parasitados por um microimenoptero, que me parece uma espécie de *Neorileya*, muito próxima de *N. flavipes* Ashmead, 1904, possivelmente nova. A fêmea deste inseto, depois de por um

ovo dentro, de cada ovo, numa postura de *Edessa*, cobre-a com uma espécie de teia ou teia, mais ou menos espessa, de fios de seda (?), provavelmente secretada pelas glândulas anexas à porção terminal da vagina (v. fig. 281).

O inseto, caminhando lentamente, como que riscando com o ápice do, abdomen a superfície em que pousa, vai expelindo um fluido hialino, que se transforma em fio sólido depois de seco.

Às vezes os ovos de *Edessa* ficam completamente escondidos pelo tecido, feito pela *Neorileya*.




Fig. 282 - *Nezara viridula* portadora de ovos da mosca. *Trichopodopsis pennipes* (Fabr., 1794), que a parasita.

No Rio de Janeiro criam-se no corpo do *Pachycoris torridus* o microimenoptero *Hexacladia smithii* Ashmead, 1891 (fam. Encyrtidae) e o Diptero *Trichopodopsis pennipes* (Fabr., 1794) (fam. Gymnosomatidae). Watson (1926) cita também esta mosca como parasita de *Nezara viridula* em Flórida (fig. 282).

No Rio Grande do Sul o Hemiptero *Apiomerus flavipennis* Herrich-Schäeffer, 1848 (fam. Reduviidae) é um eficiente predador de *Mormidea poecila* e as larvas da mosca




Fig. 283 - *Diactor bilineatus* (Fabr., 1803)
(Coreidae, Anisoscelini)

Beskia cornuta Brauer & Bergenstam, 1890, segundo observação de C. H. REINIGER, parasitam formas mais ou menos desenvolvidas da mesma *Mormidea* (v. COSTA LIMA, 1935).

259. **Bibliografia.**

BARBER, H. G. & BRUNNER, S. C.

- 1932 - The Cydnidae and Pentatomidae of Cuba.
 Jour. Dept. Agric. Porto Rico, 16:231-285, 10
 figs., 3 ests.

BERGROTH; E.

- 1908 - Ennumeratio Pentatomidarum post Catalogum Bru-
 xellense descrip.
 Mém. Soc. Entom. Belgique, 15.
 1914 - Pentatomides nouveaux de la Guyanne française.
 Ann. Soc. Ent.. 83:423-441, est. XI.

BRIEN, P.

- 1930 - Notes sur Phloea paradoxa Burm. (1835).
 In Mission Biologique Belge au Brésil (1922-1923)
 2:207-212, 6 figs.

CHINA, W. E.

- 1931 - Morphological parallerism, in the structure of the
 labium in the hemipterous genera Coptosomoides
 and Bozius in connectiou with mycetophagous
 habits.
 Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 7:281-286.

DAMPF, A.

- 1927 - La hinea del atroz en el Valle del Yaqui, Son.
 Bol. Mens. Ofic. Def. Agric., 1:271-283, 5 figs.

DRAKE, C. J.

- 1920 - The southern green stink-bug.
 Florida State Plant Board, Quart. Bull. 4:41-77.

ESTABLE, C.

- 1929 - Observaciones sobre algunos insectos del Uruguay.
 An. Univ. Nac. Montevideo, 2(3):57-92, 16 ests.

GOMES, J.

- 1936 - Novos hospedeiros e novas regiões de alguns insetos
 do Brasil.
 O Campo, 7(82):42-46.

HAMNER, A. L.

- 1936 - The gross anatomy of the alimentary canal of *Solubea pugnax* (Fab.) (Heteroptera. Pentatomidae).
Ohio Jour. Sci. 36:157-t60. 1 fig.

HERDEN, P. W. van

- 1933 - The green stink-bug (*Nezara viridula* Lin.).
Ann. Univ. Stellenbosch. Capetown. 11 A. 7. 24, p.,
11 figs.

HEYMONS, R.

- 1906 - Über einen Apparat zum öffnen der Eischale bei den Pentatomiden.
Zeits. wiss. Insektenbiol. 2:73-82, 2 figs.

HORVATH, G.

- 1916 - Revisio Lyrtocovinarum.
Ann. Mus. Hung. 14:219-224, 5 figs.
1919 - Analecta ad cognitionem Cydnidarum.
Subfam. Thyreocorinae
Ann. Mus. Nat. Hung., 17:205- 273.
1923 - Descriptions de trois espèces nouvelles du genre
Cyrtocoris A. White.
Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. 20:149-152, 8 figs.
1925 - De Pontatomidarum genere *Loxa* Am. Serv. et de
novo genere ei affini.
Ann. Mus. Nat. Hung.. 22:307-328. 2 ests., 5 figs.

HUSSEY, R. T.

- 1934 - Observations on *Pachycoris torridus* (Scop.) with
remarks on parental care in other Hemiptera.
Bull. Brookl. Ent. Soc. 29:133-t45.

IHERING, R. von

- 1909 - As espécies brasileiras do gênero *Phloea*.
Entomol. Brasil., 2 (5):129-133.

JONES, T. H.

- 1918 - The southern green plant bug.
Bull. U. S. Dept., Agric. Washington, 689, 27 pp.

KIRKALDY, G. W.

- 1909 - Catalogue of the Hemiptera (Heteroptera) with
biological and anatomical references, lists of food
plants and parasites, etc.

Prefaced by a discussion on nomenclature and an analytical table of families. Cimicidae. Vol. I, Berlin.

KUSKOP, M.

- 1924 - Bakteriensymbiosen bei Wanzen (Hemiptera-Heteroptera).
Arch. Protis. 47:350-385, ests. 14-16 e 7 figs.
no texto.

LIMA, A. da COSTA

- 1935 - Um novo "frade" praga do arroz no Rio Grande do Sul (Hemiptera - Pentatomidae).
O Campo, 6(10):16, 1 fig.
- 1928 - Nota sobre o *Pseudotelenomus pachycoris* (n. g., n. sp.) parasitando ovos de *Pachycoris torridus* (Scop.).
Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 4(4):51-53, 2 ests.
- 1935 - Sobre dois microhimenopteros parasitos de *Mormidea poecila*.
O Campo, 6(2):10, 5 figs.
- 1935 - Um novo parasito endófago do *Mormidea poecila*.
O Campo, 6(6):22-23.
- 1937 - Um novo microhimenoptero parasito de ovos de *Pentatomideo*.
O Campo, 8(85):49, 3 figs.

LIMA. A. D. FERREIRA & REINIGER. C. H.

- 1935 - Os "frades" do arroz do Rio Grande do Sul.
O Campo. 6 (1) :61-63.

MAGALHÃES, P. S. de

- 1909 - Contribution à l'histoire naturelle des Phléés.
Mem. Soc. Zool. Fr. 22:234-260.
Publicado também no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 11 de dezembro, p. 3.

MALOUF, N. S. R.

- 1933 - Studies on the internal anatomy of the stinkbug. *Nezara viridula*.
Bull. Soc. Roy. Egypte: 161-203, ests. 1-7, 1 fig. texto.

MC. ATEE, W. L. & MALLOCH, J. R.

- 1928 - Synopsis of Pentatomidae bugs of the subfamilies Megaridinae and Canopinae.
Proc. U. S. Nat. Mus. 72(25), n. 2.721, 21 pgs.,
2 ests.
- 1928 - Thyreocorinae from the State of Paraná, Brasil (Hemiptera - Pentatomidae).
Ann. Zool. Mus. Pol. 7:32-43.
- 1933 - Revision of the subfamily Thyreocorinae of the Pentatomidae (Hemiptera - Heteroptera).
Ann. Carneg. Mus. 21:191-412, 17 ests.

MONTE, O.

- 1932 - Sobre percevejos pentatomídeos que atacam solanáceas cultivadas.
Bol. Agric. Zoot. Veter. Minas Gerais, 5 (11): 313-314,
2 figs.
- 1936 - Uma invasão de *Mormidea poecila* Dallas nos arrozeiros do Sul de Minas.
Bol. Est. Exper. Agric. Belo Horizonte, 1(1):11-13,
1 est.
- 1937 - Algumas variações nos desenhos e cores de *Pachycoris torridus* (Scopoli).
O Campo, 8(85):71.
- 1937 - Notas hemipterológicas.
O Campo, 8(89):70-72.

PARISH, H. E.

- 1934 - Biology of *Euschistus variolarius* P. de B. (Family Pentatomidae: order Hemiptera).
Ann. Ent. Soc. Amer. 27:50-54.

PARSEVAL, M.

- 1935 - A praga das mormídeas ou "frades" do arroz.
Diário de Notícias, Porto Alegre, 12 de março.

PENNINGTON, M. S.

- 1919 - Notas sobre las especies argentinas del genero *Nezara* A. et S.
Physis., 4:527-536.

PÉREZ, C.

- 1904 - Sur les Phloea, Hémiptères mimétiques de lichens.
C. R. Soc. Biol. 56(1):429-430.

PORTER, C. E.

- 1933 - Acerca de los Thyreocorinae chilenos.
Rev. Chil. Hist. Nat. 37:198-200.

SGHOUTEDEN, H.

- 1904 - Fam. Pentatomidae, subfam. Scutellerinae.
Gen. Insect. 24, 100 pp., 5 ests. color.
1907 - Faro. Pentatomidae, sufam. Asopinae.
Gen. Insect. 52, 82 pp. 5 ests. color.
1908 - Fam. Pentatovmidae, subfam. Dinidorinae.
Gen. Insect. 153, 19 pp., 2 ests. color.

SCHUMAISHER, F.

- 1910 - Beitrage zur Kenntnis der Biologie der Asopiden.
Zeits. wiss. Insektenbiol., 6:263-266; 376-383;
430-437.
1911 - Idem, *ibid*, 7:40-47.
1917 - Eisprenger bei Wanzen aus der Gruppe der Penta-
tomiden.
S. B. Ges. naturf. Fr. Berlin: 138-444.

SHARP. D.

- 1890 - On the structure of the terminal segment in some
male Hemiptera.
Trans. Ent. Soc. London, 1890: 399-427, ests. 12-14.

SIGNORET, V.

- 1881 - Révision des groupes de Cydnides de la famille des
Pentatomides.
Ann. Soc. Ent., Fr. (6) 1:25-52; 193-218, 319-332,
423-436, ests. 1, 2, 6-8, 10-12.
1882 - Idem, *ibid*. (6)2:23-42, 145-168, 241-266, 165-484,
ests. 1, 2, 6-9, 13-14.
1883 - Idem, *ibid*. (6)3:33-60, 207-220, 357-374, 516-534,
ests.2-5, 9, 10, 15, 16.
1884 - Idem, *ibid*. (6) 4:45-62, 17-128, ests. 2 e 3.

SILVA, A. G. d'ARAÚJO e

- 1933 - Contribuição para o estudo da biologia de tres pen-
tomídeos. O possível emprego destes insetos no
combate biológico como destruidor de espécies no-
civas.
O Campo, 4(3) :23-25, 5 figs.
1936 - Alguns insetos com os seus respectivos hospedeiros.
Rio de Janeiro, 39 pp.

SMYTH, E. G.

- 1919 - Un insecto extraño que cubre su cria do mesmo que una gallina.
Rev. Agr. Porto Rico, 2:27-31, 2 ests.

SQUIRE, F. A.

- 1931 - A study of *Mormidea poecila* Dall.
Agric. Jour. Brit. Guiana, 5:245-252, 1 fig., 3 ests.

STAL. C.

- 1867 - (V. bibliogr. Coreoidea).

STONER, D.

- 1920 - The Scutelleroidea of Iowa.
Univ. Iowa Studies Nat. Hist. 8(4). 140 pp.

WATSON. J. R.

- 1926 - Citrus insects and their control.
Univ. Florida, Agric. Exp. Sta. Bull. 183, 423 pp.,
218 figs.

Superfamília **COREOIDEA**¹⁶


260. **Caracteres e classificação.** - Os Hemípteros que constituem esta superfamília caracterizam-se, principalmente, pelo aspecto da membrana dos hemelítrios, que se apresenta, geralmente, com várias ou muitas nervuras, quasi paralelas, mais ou menos salientes, algumas bifurcadas, rodas, porem, partindo de uma nervura basal, curva, que corre paralelamente ao bordo do corium (fig. 224). Antenas de quatro segmentos, inseridas acima de uma linha imaginária tirada da base do rostrum ao meio do olho (*Supericornia*, dos antigos autores); ocelos presentes; rostrum de quatro segmentos; scutellum relativamente pequeno, nunca atingindo a base da membrana; tarsos trímeros, providos de arólios.

Esta superfamília compreende cerca de 2.000 espécies, distribuídas nas tres famílias: **Coreidae**, **Coriscidae** (= *Alydidae*) e **Corizidae**.

¹⁶ Gr. *coris*, percevejo.

Família **COREIDAE**

261. **Caracteres e classificação.** - Búculas geralmente longas, prolongadas até a inserção das antenas; pronotum, na parte posterior, tres vezes ou, pelo menos, mais de duas vezes a largura da cabeça; scutellum atingindo ou excedendo a base do metanotum, geralmente mais largo que a




- Fig. 284 - *Hirilcus gracilis* (Burmeister, 1835) (Merocorinae).
 Fig. 285 - *Meropachys nigricans* (Laporte, 1832), (fêmea) (Merocorinae).
 Fig. 286 - *Athaumastus haematicus* (Stal, 1859), (macho) (Mictini).
 Fig. 287 - *Machtima crucigera* (Fabr., 1775), (fêmea) (Mictini).
 Fig. 288 - *Phthia picta* (Drury, 1770), (fêmea) (Leptoscelini).
 Fig. 289 - *Acauthorcerus clavipes* (Fabr., 1803), (macho) (Mictini).

cabeça entre os olhos; orifícios metasternais (ostiolos) distintos; 1° urotergito truncado posteriormente; 4° e 5° urotergitos com a margem basal (proximal) sinuada.

É esta a família que abrange a maior parte dos Coreídeos descritos (perto de 2.000), nela também se encontrando, não somente as espécies de cores mais brilhantes, como as de porte mais avantajado.

É formada por duas subfamílias, **Merocorinae** e **Coreinae**, que se distinguem pelos seguintes caracteres:

- 1 Tíbias posteriores tendo, no ápice e em baixo, um espinho ou dente subfam. **Merocorinae** (*Meropachydida* Stal)
 1' Tíbias posteriores, quasi sempre, mermes no ápice
 subfam. **Coreinae**



- Fig. 290 - *Pachylis pharaonis* (Heibst, 1784). (fêmea) (Mictini).
 Fig. 291 - *Pachylis pharaonis* (Herbst, 1784), (macho) (Mictini).
 Fig. 292 - *Leptoglossus dilaticollis* Guérin, 1838, (fêmea) (Anisoscelini).
 Fig. 293 - *Corecoris fuscus* (Thunberg, 1783) (Menenotini).
 Fig. 294 - *Crinoceris sanctus* (Fabr., 1758), (machos) (Mictini).
 Fig. 295 - *Holymenia clavigera* (Herbst, 1784), (fêmea) (Anisoscelini).
 Fig. 296 - *Chariesterus armatus* (Thunberg, 1825), (macho) (Chariesterini).

A subfamília **Merocorinae** é representada por poucas espécies, aliás sem valor econômico. As mais comumente encontradas no Brasil pertencem aos gêneros *Hirilcus* Stal, 1862 (fig. 284) e *Lycambes* Stal, 1862.

A subfamília Coreinae, incontestavelmente a mais importante, compreende várias tribus¹⁷, das quais apenas as oito seguintes têm representantes no Brasil: **Acanthocephalini**, **Mictini**, **Anisoscelini**, **Leptoscelini**, **Menenotini** (= *Corecorini*), **Chariesterini**, **Coreini** (= *Centroscelidae*) e **Discogasterini**.

262. **Espécies mais interessantes.** - As duas primeiras tribus não têm representantes de interesse agrícola.

Da tribu Mictini devo mencionar, em primeiro lugar, *Pachylis pharaonis* (Herbst, 1781) (figs. 290 e 291), o maior Coreideo encontrado no nosso território, com 35 mm. de comprimento, menor, porém, que *Thasus gigas* (Burmeister, 1835), Micteneo do México e S. O. dos Estados Unidos, cujo macho pode exceder de 50 mm. de comprimento.

O. MONTE (1937) observou *Pachylis pharaonis* e *P. laticornis* (Fabr., 1798), sobre "cortiço" ou "pau rolha" (Mimosaceae).

Um Mictineo frequentemente visto no Brasil é o *Crinocerus sanctus* (Fabr., 1775) (fig. 294), de cor-geral amarelado, com a membrana, o clavus, uma mácula no meio do bordo, externo do corium e as pintas dos fêmures de cor negra. BONDAR observou-o, sugando folhas, rebentos e vagens de feijão de porco (*Canavalia ensiformis*). Em Minas Gerais, segundo O. MONTE, ataca feijões do gênero *Dolichos*. Na República Argentina BOSQ (1937) vi-o sobre *Canavalia* e *Cassia*. O. MONTE (1937) criou *Acanthocerus clavipes* (Fabr., 1803) (fig. 289) em guaco e mamoneira.

No Rio Grande do Sul, *Athaumastus haematicus* (Stal, 1859) (fig. 286) ataca a laranjeira, segundo material colhido por A. MONTANO (C. LIMA det.).

Machtima crucigera (Fabr., 1775) (fig. 287), no Rio de Janeiro, segundo observação de CINCINATO GONÇALVES, suga brotos de roseira, fazendo-a secar. BRANDÃO FILHO viu o mesmo inseto atacando dalias.

¹⁷ Algumas delas elevadas a categoria de subfamílias por vários autores.

Da tribu Acanthocephalini ha a citar: *Acanthocephala latipes* (Drury, 1782) (fig. 298), cujos machos têm quasi 30 milímetros de comprimento.

Várias são as espécies de Anisoscelini que atacam as nossas plantas cultivadas.

Assim, *Holymenia histrio* (Fabr., 1803) e *H. clavigera* (Herbst, 1784) (fig. 295), vivem sobre espécies de *Passiflora*. Este último inseto, que observei em Estrela (Estado do Rio), sugando *Passiflora edulis* (1930), é parasitado pelo microimnoptero. *Hexacladia smithii* Ashmead, 1891 (fam. Encyrtidae).

As espécies de *Holymenia*, muito curiosos por terem o fâcias de um himenoptero, apresentam o 2^o e o 3^o segmentos antenais dilatados, fêmures posteriores excedendo consideravelmente o ápice do, abdome e as asas anteriores completamente transparentes, com o corium de estrutura idêntica a da membrana.

Um Coreideo assás conhecido em nosso país é o *Diactor bilineatus* (Fabr., 1803) (fig. 283), vulgarmente conhecido como "percevejo do maracujá", por se criar no, maracujá comum (*Passiflora quadrangularis*), apresenta aspecto bem característico, não somente pelas brilhantes cores que apresenta nos vários estádios do desenvolvimento., como também pela singular dilatação foliácea que possuem as tíbias do par posterior.

Apresentam também dilatação foliácea nas tíbias posteriores, mais ou menos larga, as espécies de *Leptoglossus* Guérin, 1838, que podem causar danos consideráveis às plantas cultivadas.


No Brasil as duas espécies mais conhecidas são: *Leptoglossus gonagra* (fig. 304) e *L. stigma* (fig. 302).

263. **Leptoglossus gonagra** (Fabr., 1775) e **Leptoglossus stigma** (Herbst, 1784).

O primeiro, encontrado do México à Argentina, é facilmente reconhecível pelos seguintes caracteres: tíbias posteriores sem anel pálido no ápice, pronotum apresentando

uma faixa amarela, estreita e em arco e os ângulos laterais proeminentes e subespinhosos, superfície inferior do corpo com máculas e faixas amarelas.

Em Minas Gerais, como em Porto Rico (COTTON, 1918) e outros lugares, foi observado por O. MONTE (1932-1935) sobre Cucurbitaceae.



- Fig. 297 - *Menenotus lunatus* Laporte, 1832, (macho) (Menenotini).
 Fig. 298 - *Acanthocephala latipes* (Drury, 1782), (fêmea) (Acanthocephalini).
 Fig. 299 - *Leptoscelis* sp., (fêmea) (Leptoscelini).
 Fig. 300 - *Phthia lunata* (Fabr., 1787), (macho) (Leptoscelini).
 Fig. 301 - *Sephina erythromelaena* (White, 1842), (fêmea) (Menenotini).

No Rio de Janeiro já o vimos sobre maracujás e CIN-CINATO GONÇALVES encontrou-o sugando laranjas e melão de São Caetano (*Mormodica charantia*).

LEONARD (1931), chamando a atenção para os danos causados por este inseto em Porto Rico à laranjas e "grape fruits", informa que nesse país *Mormodica charantia* é a planta hospedadora.

O *Leptoglossus stigma* (Herbst, 1784) é facilmente reconhecível pela linha creme ou amarelada, transversal e em

zig-zag, que se vê sobre os hemelítrios. No Rio de Janeiro encontra-se frequentemente sobre Mirtáceas, especialmente araçazeiro (*Psidium areca*) e goiabeira (*Psidium guajava*). Como a espécie precedente, sugando laranjas, mesmo ainda verdes, ocasiona o seu apodrecimento. Segundo verificações de CH. HATHAWAY o mesmo pode ocorrer com outras frutas: abóbora, carambola, manga, romã e tangerina. Gomes (1936), no Distrito Federal, observou *L. stigma* atacando romãs.

Em meu 3º Catálogo cito mais duas outras espécies de *Leptoglossus*: *L. conspersus* Stal, 1870, observado por O. MONTE (1934, 1937) (C. Lima det.) sobre tomateiro, alimentando-se principalmente dos frutos, e *L. dilaticolis* Guérin, 1838 (fig. 292), encontrado sobre cacauzeiro, no Distrito Federal, por J. DESLANDES (D. Mendes det.) e em Belo Horizonte sobre *Magnolia* sp., por O. MONTE (1937).


264. **Phthia picta** (Drury, 1770) (fig. 288). Da tribu Leptoscelini *Phthia* Stal, 1862 é o único gênero interessante sob o ponto de vista econômico, tendo como principal representante *Phthia picta* (Drury, 1770), um dos Coreídeos mais frequentemente encontrados em todo o Brasil, que ataca várias Solanáceas. Prefere, porém, o tomateiro. Em Porto Rico, segundo COTTON (1919), as formas jovens, de cor vermelha brilhante, congregam-se em grupos sobre os frutos do tomateiro, deformando-os com as picadas. Em Belo Horizonte O. MONTE (1932, 1934), assinalou, para a mesma planta, idênticos estragos. No Rio de Janeiro CH. HATHAWAY observou-o sugando brotos de romanzeira.

HAMBLETON e SAUER (1938) assinalaram o ataque do algodoeiro no Nordeste pela *Phthia ornata* Stal, 1865.

Da tribu Menenotini, além de *Menenotus* Laporte, 1832, com o curioso *M. lunatus* Laporte, 1832 (fig. 297), facilmente reconhecível pelos ângulos laterais do pronotum prolongados para diante em forma de meia lua, merecem

mencionadas as seguintes espécies dos gêneros *Corecoris* Hahn, 1834 (= *Spartocera*, Lap., 1832) e *Sephina* Amyot & Serville, 1843.

265. **Corecoris fuscus** (Thunberg, 1783) (fig. 293). O *Corecoris* mais encontrado em quase todo o Brasil; vive sobre Solanaceas silvestres e tomateiro. Entretanto, em Porto Rico, ataca principalmente a batata doce.



- Fig. 302 - *Leptoglossus stigma* (Herbst, 1784), (fêmea) (Anisoscelini).
 Fig. 303 - *Anasa* sp. (fêmea) (Coreini).
 Fig. 304 - *Leptoglossus gonagra* (Fabr., 1775), (fêmea) (Anisoscelini).
 Fig. 305 - *Ugnius kermesinus* (Linne, 1758), (macho) (Centroscelini).
 Fig. 306 - *Sphictyrtus chryscis* (Lichtenstein), (macho) (Coreini).
 Fig. 307 - *Hypselonotus interruptus* Hahn, 1831, (macho) (Coreini).
 Fig. 308 - *Hypselonolus fulvus* (De Geer, 1775) (fêmea) (Coreini).

No Rio Grande do Sul O. SOARES observou *Corecoris brevicornis* (Stal, 1870) atacando o fumo (DARIO MENDES det.). BOSQ (1937) informa que na Argentina a planta hospedadora desta espécie é a erva moura (*Solanum nigrum*), encontrando-se-a também sobre Solanaceas cultivadas.

Da mesma região recebi recentemente exemplares de *Corecoris dentiventris* Berg, 1884, colhidos também sobre

fumo. Este inseto, segundo me informou VON PARSEVAL, na primavera de 1935 foi o maior inimigo da lavoura do fumo, determinando o enrolamento das folhas novas, que depois murcham.

266. **Sephina erythromelaena** (White, 1842) (fig. 301). Espécie vistosa, de cor geral amarela, com pernas, antenas, máculas do torax, do abdome, o pronotum, os hemelitos, em quasi toda a sua extensão e o scutellum, de cor negra; em Tracateua (Pará), segundo informação de H. BARRADAS, que me enviou exemplares para determinação, ataca "maracujá" e "angélica".

A tribu Coreini, conquanto constituída por um grande número de espécies fitófagas, distribuídas em muitos gêneros, não pode ser considerada como a mais importante sob o ponto de vista econômico, pois bem poucas são as que se conhece prejudiciais às plantas cultivadas.

Ha tempos recebi exemplares de *Sphicyrtus chryseis* (Lichtenstein) (*S. fasciatus* (Burmeister, 1835)) (fig. 306), colhidos sobre algodoeiro, no Rio Grande do Norte, por J. DESLANDES.

As espécies de *Sphicyrtus* Stal, 1859, conquanto vistosas pelas partes verdes e vermelhas do corpo, não são tão belas como algumas do gênero *Paryphes* Burmeister, 1835, cujo corpo se apresenta, em baixo pelo menos, de cor verde-ouro.

Duas espécies frequentemente vista em toda a região neotrópica são: o *Hypselonotus fulvus* (De Geer, 1775) (fig. 308) e o *H. interruptus* Hahn, 1831 (fig. 307).

A primeira foi encontrada por CH. HATHAWAY, sugando brotos de abacateiro (*Persea gratissima*).

Da tribu Discogasterini a espécie que me parece mais interessante, principalmente pelo achatamento consideravel do corpo, é o *Coryzoplatus rhomboideus* (Burm., 1835).

Ha tempos F. HOFFMANN enviou-me de Nova Bremen (Santa Catarina) um exemplar de um Coreineo (tribu Co-

reini), que verifiquei ser o *Plunentis porosus* Stal, 1859 (fig. 309).

Faço do inseto uma menção especial porque o exemplar recebido, um macho, apresentava uns 20 ovos colados à face inferior do abdomen. Abrindo um desses ovos, retirei uma forma jovem seguramente de *Plunentis*. prestes a nascer.




Fig. 309 - *Plunentis porosus* Stal, 1859
(macho) com ovos colados à face
inferior do abdomen, (Coreini).

Ora, da família Coreidae, só sei de um outro inseto - *Phylomorpha laciniata* - da Europa, cujo macho carrega os ovos. Estes, porem, ficam dispostos no dorso escavado do inseto, presos por espinhos implantados nos bordos do torax e do abdomen.

Na espécie brasileira, conforme disse, os ovos ficam colados aos urosternitos, como se pode ver na figura.

Família **CORISCIDAE**

(*Alydidae*)

267. **Caracteres e espécies mais interessantes.** - Búculas curtas, não prolongadas até a inserção das antenas; rostrum de quatro segmentos, às vezes, porem (subfam. *Micrelytrinae*) parecendo ter tres, porque o 3º segmento é muito curto;




Fig. 310 - *Megalotomus* sp., ninfa,
vista de cima (X 3,5), (Coriscidae).
(Lacerda del.).

pronotum, na parte posterior, não ou pouco mais largo que a cabeça, raramente apresentando o dobro ou pouco mais do dobro da cabeça; scutellum geralmente não atingindo a base do metanotum e um tanto mais estreito que a largura da cabeça entre os olhos; orifícios metasternais (ostíolos)

presentes, às vezes, porem, obsoletos; nervuras da membrana geralmente simples; 1° urotergito posteriormente arredondado; 4° e 5° urotergitos com a margem basal ou proximal sinuada.

Estes Coreideos, frequentemente vistos sobre vegetação arbustiva, mormente onde ha Leguminosas, raramente são encontrados em grande número; daí quasi não terem importância sob o ponto de vista econômico.

As espécies de *Megalotomus* Fieber, 1861 (subfamília Coriscinae) (figs. 310, 311 e 312), frequentemente encontradas sobre *Crotalaria*, são bem interessantes, porque as formas jovens mimetizam, de maneira admiravel, formigas




Fig. 311 - *Megalotomus* sp., ninfa vista de perfil (X 3,5), (Coriscidae).
(Lacerda del.).

do gênero *Camponotus*. Ha anos, observando o fato (1920), procurei mostrar que o inseto descrito por DISTANT (Biol. Centr. Amer. Hem. Het 1:459; est. 39, fig. 223) como *Galeottus formicarius* n.g.e n.sp. devia ser uma ninfa de *Megalotomus*, provavelmente da espécie *M. pallescens* (Stal, 1860) (fig. 312).

Hoje, porem, se sabe que o referido inseto é o *Hyalymenus tarsatus* (Fabr., 1803), espécie extremamente variavel, com área de distribuição dos Estados Unidos à Argentina. Alias *Hyalymenus* Amyot & Serville, 1843 e *Megalotomus* Fieber, 1861, são dois gêneros extremamente próxi-

mos, diferindo este daquele por terminarem as tíbias posteriores num esporão agudo.

Idêntico mimetismo ocorre com as espécies de *Trachelium* Herr.-Schäeffer, 1853 (fig. 313), da subfamília Micrelytrinae, que também muito se parecem com formigas, mesmo na fase adulta. Na República Argentina ha uma espécie de Micrelytrini - *Myrmecalydus celeripes* Berg, 1884, que, à primeira vista, pode ser confundida com uma formiga do gênero *Atta*, não somente pela forma, como pela ligeireza com que corre sobre o solo ou plantas rasteiras.



Fig. 312 - *Megalotomus palescens* (Stal, 1860) (X 2), (Coriscidae).

Fig. 313 - *Trachelium* sp., (X 2), (Coriscidae).




Fig. 314 - *Corizus (Liorhyssus) hyalinus* (Fabr., 1794) (X 29) (Corizinae) (De Readio, 1928, est. 10, fig. 8).

Curiosas são também as espécies da subfamília Leptocorisinae, de corpo extremamente delgado, filiforme, e pernas finas e alongadas, especialmente do gênero *Leptocorisa* Latreille, 1825, que, à primeira vista, lembram Dipteros da superfamília Tipuloidea.

Na República Argentina BOSQ (1937) observou *Leptocorisa filiformis* (Fabr., 1775), espécie que se encontra da América Central à Argentina, sobre arroz e *Panicum*, vendo-a também destruir ovos de *Solubea ypsilonoides* (Berg, 1879) (Pentatomidae).

Família **CORIZIDAE**¹⁸

268. **Caracteres e espécies mais interessantes.** - Distinguem-se das demais espécies da superfamília Coreoidea pelos seguintes caracteres: orifícios metasternais (ostíolos) geralmente obsoletos; quando presentes, colocados perto da




Fig. 315 - *Corizus (Niesthrea) sidae* (Fabr., 1794) (X 29) (Corizinae).
(De Readio, 1928, est. 11, fig. 8).

linha mediana, entre as ancas médias e posteriores, com dois sulcos divergentes dirigidos para fora; 4° urotergito estrangulado no meio, isto é, sinuado nas duas margens ou apenas na margem posterior.

¹⁸ Gr. *coris*, percevejo.

Família relativamente pequena, constituída por e espécies com menos de 10 centímetros de comprimento, encontradas sobre vegetação rasteira ou arbustiva, causando, às vezes, danos apreciáveis a plantas cultivadas. Assim, MONTE (1937) viu pés de alface definhando em consequência do ataque de *Corizus (Liorhyssus) hyalinus* (Fabricius, 1794) (subfam. Corizinae), espécie cosmopolita e polífaga (figura 314).

Outra espécie frequentemente encontrada no Brasil é a *Jadera sanguinolenta* (Fabr., 1775) (fig. 316). BOSQ (1937), na República Argentina, encontrou em abundância sobre




fig. 316 - Hemelítrio de *Jadera sanguinolenta* (Fabr., 1775) (cerca de X 9) (Corizidae, Leptocorinae).

algodoeiro, prejudicando-o, não só esta espécie, como também *Corizus (Niesthrea) sidae* (Fabricius, 1794), var. *pictipes* (Stal, 1859), cuja área de distribuição se estende da América do Norte à Patagônia (fig. 315). DENIER (*apud* BOSQ, 1937), tratando destes insetos, menciona a possibilidade de veicularem bactérias e fungos patogênicos.

Para o estudo dos insetos desta família, além da obra clássica de SIGNORET (1859), ha toda a vantagem em se consultar os trabalhos de HAMBLETON (1908) e de READIO (1928).

269. Bibliografia.

BLOETE, H. C.

- 1936 - Catalogue of the Coreidae in the Rijksmuseum van natuurlijke Historie. Part. III Coreinae, second part.
Zool. Meded., 19:22-66, 14 figs.
- 1938 - Idem. Part. IV. Coreinae, third part.
Zool. Meded., 20:275-308, 3 figs.

BONDAR, G.

- 1930 - Insetos daninhos e moléstia dos feijões na Baía.
Bol. lab. Pat. Veget., Baía, 9:83 pp. 30 figs.

BREAKEY, E. P.

- 1936 - Histological studies of the digestive system of the squash bug, *Anasa tristis* De. G. (Hemiptera, Coreidae).
Ann. Ent. Soc. Amer. 29:561-577, 4 ests.

COTTON, R. T.

- 1918 - Insects attacking vegetables in Porto Rico.
Jour. Dept. Agric. Porto Rico, 2:265-317, fig. 24-67.

DEAY, H. O.

- 1928 - The Coreidae of Kansas.
Univ. Kans. Sci. Bull. 18:371-415, ests. 60-62.

FRACKER, S. B.

- 1918 - The Alydinae of the United States.
Ann. Ent. Soc. Amer. 11:255-282, ests. 24 e 25.

GIBSON, E. H. & HOLDRIDGE.

- 1918 - The genus *Narnia* Stal, and a key to the genera of Anisoscellini A. and S. (Coreidae: Heteroptera).
Psyche, 25:1-4.

GIRAULT, A. A.

- 1906 - The method of feeding of *Leptoglossus*.
Entom. News. 17:382-383.

GONÇALVES, C. R.

- 1937 - Mais um percevejo sugador de laranjas.
O Campo, 8(85):52, 1 fig.

HAMBLETON, E. J. & SAURER, F. G.

- 1938 - Observações sobre as pragas da cultura algodoeira, no Nordeste e Norte do Brasil.
Arq. Inst. Biol., São Paulo, 9:319-330.

HAMBLETON, J. C.

- 1908 - The genus *Corizus* with a review of the North and Middle American Species.
Ann. Ent. Soc. Amer. 1:133-152, ents 8-11.

HORVATH, G.

- 1913 - Revisio critica generis *Paryphes* Burm. et affinium.
Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. 11 :344-373.

LEONARD, M. D.

- 1931 - *Leptoglossus gonagra* Fab. injuring Citrus in Puerto Rico.
Jour. Econ. Ent. 24:765-767.

LIMA, A. da COSTA.

- 1920 - Nota sobre o mimetismo do *Alydus* (*Megalotomus*) *pallescens* com formiga e considerações relativa ao *Galeottus formicarius* Dist.
Arch. Esc. Sup. Agric. Med. Veter. 4:5.
- 1930 - Sobre insetos que vivem em maracujás (*Passiflora* spp.).
Mem. Inst. Osw. Cruz, 23:159-162, 3 ests.

MONTE, O.

- 1932 - Um percevejo sugador do tomate, *Phthia picta* Drury.
Chac. Quint. São Paulo, 45:222-224, 1 fig.
- 1932 - As pragas das aboboreiras.
Bol. Agr. Zool. Veter. Belo Horizonte, 5(4) :65-69.
3 figs.
- 1934 - Cultura do tomateiro.
Ed. Chac. Quint., São Paulo, 72 pp., figs:
- 1937 - Notas hemipterológicas.
O Campo, 8(89) :70-72.

MOODY, D. L.

- 1930 - The morphology of the repugnatory glands of *Anasa tristis* De Greer.
Ann. Ent. Soc. Amer. 23:81-104, 5 ests.

PAYNE, M. A.

- 1934 - Intravitam studies on the Hemipteron *Leptocoris trivittatus*. A description of the male reproductive organs and the aggregation and turning of the sperms.
 Jour. Morph. 56:513-533, 2 ests.

PENNINGTON, M. S.

- 1922 - Notas sobre Coreideos Argentinos.
 Physis (B. Aires) 5:28-39; 125-170.

READIO, P. A.

- 1928 - Studies on the biology of the genus *Corizus* (Coreiidae, Hemiptera).
 Ann. Ent. Soc. Amer. 21:189-201, ests. 10 e 11.

SCHMIDT, E.

- 1926 - Neue südamerikanische Coreiden (Hem. Heteropt.).
 Deuts. Ent. Zeits. :137-144.

SIGNORET, V.

- 1859 - Monographie du genre *Corizus*.
 Ann. Ent. Soc. Fr. (3) 7:75-105.

STAL, C.

- 1859 - Till Kannedomen om *Coreida*.
 öfver. Kongol. Vetens. Akad. Förh. 16:449-175.
 1867 - Bidrag till Hemipterernas Systematik.
 öfver. Kongl. Vetens. - Akad. Förh. :491-650.
 (Sinópses dos gêneros de Pentatomidae e de Coreoidea).
 1870 - Enumeratio Hemipterorum, part 1.

TORRE-BUENO, J. R. de la

- 1939 - Remarks on the subgenus *Tivarbus* Stal of the genus *Hyalimenus* A. & S. with descriptions of five new species (Hemiptera-Alydidae).
 Bull. Brookl. Ent. Soc. 34:177-197.

TOWER, D. G.

- 1913 - The external anatomy of the squash bug, *Anasa tristis* De Geer.
 Ann. Ent. Soc. Amer. 6:427-37, ests. 15-18.
 1914 - The mechanism of the mouth parts of the squash bug, *Anasa tristis* De Geer.
 Psyche, 29:99-108, ests. 1 e 2.

Superfamília **LYGAEOIDEA**¹⁹

270. **Caracteres e classificação.** - Os Hemipteros agrupados nesta superfamília têm, como os da superfamília Coreoidea, antenas e rostrum de quatro segmentos e tarsos de tres artículos, sendo o apical provido de arólhos (*onychchia*) (daí o nome - *Onychiophora*²⁰ dado por Reuter); distinguem-se, porem, daqueles insetos por apresentarem um sistema de nervação na membrana muito, diferente do que é característico dos Coreideos em geral. Ademais, em quasi todos os Lygeideos, as antenas não se inserem acima da linha imaginária tirada da base do rostrum ao meio do olho; daí os nomes *Infericornes* ou *Infericornia* dados a este grupo de Hemipteros pelos antigos autores.

As duas principais famílias que formam esta superfamília são: **Lygaeidae** (= *Geocoridae*, *Myodochidae*) e **Pyrrocoridae**. A família **Hyocephalidae** não tem representantes na América.

Os autores modernos incluem em Lygaeoidea, **Colobathristidae** e **Neididae** (= *Berytidae*), esta última família, alguns anos atrás ainda considerada como subfamília de Coreidae.

Ha cerca de 2.000 espécies de Lygaeoidea descritas, em sua maioria sugadoras de seiva.

Dou a seguir a chave das famílias de Lygaeoidea:

- | | | |
|-------|--|---------------------|
| 1 | Corpo muito estreito; pernas finas e alongadas; uma incisão transversal adiante dos ocelos; 1ª segmento antenal e femur dilatados na extremidade distal; membrana com 4 ou 5 nervuras longitudinais, simples | Neididae |
| 1' | Outra combinação de caracteres | 2 |
| 2(1') | Ocelos ausentes | Pyrrocoridae |
| 2' | Ocelos presentes (ausentes em <i>Cnemodus</i> Herrich-Schaeffer, 1853, da família Lygaeidae) | 3 |

¹⁹ Gr. *lygaeus*, obscuro.

²⁰ Gr. *onix*, unha; *pherein*, trazer.

- 3(2') Corpo muito delgado; antenas e pernas finas, mais ou menos alongadas, porem o 1^a segmento antenal e os fêmures não são dilatados na extremidade distal; membrana sem nervuras **Colobathristidae**
- 3' Corpo mais ou menos robusto; membrana com 4 ou 5 nervuras simples, isoladas ou anastomosadas, partindo diretamente da margem do corium **Lygaeidae**




Fig. 317 - *Jalysus sobrinus* Stal, 1863 (cerca de X 10) (Metacanthinae)

Família **NEIDIDAE**²¹

(*Berytidae*)²²

271. **Caracteres e classificação.** - Pequenos Hemípteros de corpo linear ou sublinear, com antenas e pernas muito finas e longas, aquelas com o artículo proximal muito mais longo que a cabeça e clavado no ápice, estas com os fêmures igualmente clavados na extremidade distal; cabeça com o vertex apresentando, um sulco profundo, transversal de olho a olho, adiante dos ocelos (fig. 317).

²¹ Etimologia desconhecida.

²² De Berytus, antigo nome de Beyrouth.

Antenas, de quatro segmentos, inseridas em tubérculos anteníferos situados acima da linha tirada do olho à base do rostrum, este fino, de quatro segmentos.

Pronotum mais longo que largo, apresentando uma carena mediana, mais ou menos perfeita e, em algumas espécies, armado de espinhos; scutellum pequeno, às vezes, também, provido de espinho, erecto; hemelitos longos e estreitos, não raro apresentando a mesma estrutura em toda a extensão; parte distal do corium prolongada além do meio da membrana; esta com algumas nervuras subretilíneas ou subsinuosas; tarsos trimeros, providos de arólios.

272. **Classificação.** - Constituem esta família cerca de 80 espécies, distribuídas em duas subfamílias.

- 1 Cabeça alongada, vertex projetando-se anteriormente em um processo curvo, porreto, sobre o tylus; hemelitos com o clavus e o corium coriáceos, fortemente pontuados; scutellum inerme ou mutico **Neidinae**
- 1' Cabeça curta, sem o processo referido em (1); hemelitos com o clavus e o corium membranosos, com algumas pontuações; scutellum provido de uma apófise ou espinho ereto **Metacanthinae**

273. **Espécies mais interessantes.** - Desta família são mais conhecidas em nosso país as espécies de *Jalysus* Stal, 1862 (subfam. Metacanthinae). No Rio encontra-se frequentemente *J. sobrinus* Stal, 1863 (fig. 317). DUTRA (1903, Contra os inimigos do fumo, Bol. Agric. S. Paulo, 4 (1): 111-122), relativamente ao comportamento deste inseto em S. Paulo, escreveu o que se segue:

"O bichinho das cápsulas (*Jalysus sobrinus* Stal.) determinado pelo Sr. O. Heidemann, por intermédio do Dr. L. O. Howard, é um inseto delgado, provido de penas ou penugem, de antenas finas e longas, com 18,5 mm. de comprimento e somente 1,5 mm. de largura. É de cor castanho-áurea, com tres listras claras longitudinalmente dispostas no torax e mais claras na nuca.

Na extremidade posterior do torax ha tres espinhos, um de cada lado e o terceiro no centro. A última articulação das antenas, assim como a extremidade do femur, é um tanto grossa.

Ele frequenta, na época da maturidade das cápsulas, as panículas e os botões das flores do fumo, perfurando aquelas, sem causar à planta nenhum outro dano.

Estes insetos são, geralmente, pouco numerosos, mas ha anos em que aparecem em grande número, de modo que as cápsulas das sementes das plantas deixadas para *porta-grãos* estão todas furadas, perdendo-se, com a agitação das panículas pelo vento, uma boa parte das sementes maduras, já porque caem no solo, já porque, com as chuvas, muitas cápsulas *melam* ou apodrecem.

Não ha tratamento possível."

Família COLOBATHRISTIDAE²³

274. **Caracteres, etc.** - Hemípteros de corpo delgado, tendo, no máximo, 20 mm. de comprimento; possuem antenas longas e finas; asas (quando, presentes) muito estreitas e sem nervuras; tarsos trímeros, providos de arólios, e abdomen estreitado na base.

Compreende esta pequena família cerca de 60 espécies descritas, das regiões indomalaia-papuânica e neotrópica.

Dos gêneros que se encontram nesta última região devo citar *Colobathristes* Burm., 1835 (= *Curupira* Distant, 1888) e *Peruda* Dist., 1888, com as espécies principais: *Colobathristes chalconcephalus* Burm., 1835 (= *Curupira illustrata* Dist., 1888 (fig. 318) e *Peruda typica* Dist., 1888, ambas de aspecto mirmecoide, encontradas no Rio de Janeiro.

POPPIUS e BERGROTH (1921), em seu interessante trabalho, apresentaram a figura de *Trichocentrus gibbosus* Horváth, 1904, que tambem muito se parece com uma formiga, principalmente as formas braquiptera e aptera do inseto e quando ele está vivo.

Nenhuma espécie desta família, no Brasil, causa estragos a plantas cultivadas. Em Java, entretanto, segundo VAN DEVENTER (1906) *Phaenacantha* (*Anorygma*) *saccharicida* (Karsch, 1888), ataca a cana de açúcar.

²³ Gr. *colobathristes*, que caminha com "pernas de pau".

275. **Bibliografia.**

DEVENTER, W. van

- 1906 - De Dierlijke vijanden van het Suikerriet en Hunne Parasieten; Handboek te dienste van de Suikerriet - Cultuur en de Rietsuiker - Vabricage op Java, II Deel.

HORVATH, G.

- 1904 - Monografia Colobathristinarum.
Ann. Mus. Nat. Hungar. 2:117-172.

POPPIUS, B. & BERGROTH, E.

- 1921 - Beiträge zur Kenntnis der myrmecoiden Heteropteren.
Ann. Mus. Nat. Hung. 18:31-88, 2 ests.

Família **LYGAEIDAE***(Myodochidae)*²⁴

276. **Caracteres.** - Hemipteros pequenos ou de tamanho médio; as maiores espécies, em geral, não excedem de 20 mm. de comprimento.

Cabeça geralmente curta, por vezes, porém, prolongada posteriormente em uma espécie de pescoço, mais ou menos alongado, não raro mais longo que o pronotum (*Myodocha*); tylus geralmente mais saliente, adiante, que os lobos laterais (jugae), que são acuminados e convergentes; antenas de quatro segmentos, inseridas em tubérculos anteníferos, mais ou menos salientes, geralmente situados abaixo da linha tirada da base do rostrum ao meio do olho; ocelos raramente ausentes; rostro de quatro segmentos.

Pronotum trapezoidal, subplano ou subconvexo, em muitas espécies apresentando, no meio ou um pouco atrás

²⁴ Gr. *myia*, mosca; *doka*, festim, iguarias.

do meio, forte constrição que o divide em dois lobos distintos, anterior e posterior; scutellum curto; hemelitos geralmente cobrindo o abdomen, raramente atrofiados ou incompletos e com a membrana rudimentar; esta apresentando quatro ou cinco, nervuras simples, isoladas ou anastomosadas, partindo diretamente da sutura da membrana (figs. 319 e 320); fêmures anteriores normais ou mais ou



Fig. 318 - *Colobathristes chalconcephalus* Burmeister, 1835 (Colobathristidae).

menos dilatados e armados de dentes em baixo; tarsos trimeros; garras providas de arólhos; orifícios das glandulas odoríferas (ostiolos) distintos.

277. **Classificação.** - Ha na família Lygaeidae cerca de 1.500 espécies descritas, sendo as que se encontram no Brasil distribuidas nas subfamílias referidas na chave seguinte, organizada por BARBER (1917) segundo a anteriormente apresentada por STAL (Enum. Hemipt., Parte 4, 1874).

- | | |
|------|---|
| 1 | 3ª sutura ventral, entre o 3º e 4º urosternitos, retilínea, atingindo as margens laterais, cabeça geralmente sem cerdas perto dos olhos 2 |
| 1' | 3ª sutura ventral, entre o 3º e 4º urosternitos, curvilínea, sinuosa ou rota, não atingindo as margens laterais; cabeça geralmente com 2 cerdas perto dos olhos; fêmures do par anterior notavelmente dilatados e armados de dentes em baixo Rhyparochrominae 25 |
| 2(1) | Fêmures do par anterior, comparados com os dos outros pares, não muito dilatados e raramente armados em baixo de dentes ou espinhos; borda posterior do pronotum, pelo menos na parte que fica adiante do scutellum, convexa e voltada para baixo; todos os es- |

²⁵ Gr. *rhyparos*, sordido; *chroma*, cor.

- tigmas abdominais situados dorsalmente, sobre o con-nexivum 3
- 2' Fêmures anteriores relativamente curtos e dilatados, ar-mados ou inermes; a margem posterior do pronotum adiante do scutellum não é convexa nem voltada para baixo; pelo menos o 6 ° urômero com os estigmas na face ventral 4
- 3(2) Hemelitos e, não raro, cabeça, pronotum e scutellum, não ou indistintamente pontuados; borda posterior do pro-notum, entre o scutellum e os ângulos laterais, com impressão ou depressão distinta; as 2 nervuras in-ternas da membrana geralmente anastomosados perto da base **Lygaeinae**²⁶
- 3' Hemelitos, cabeça, pronotum e scutellum mais ou menos profundamente pontuados; borda posterior do pronotum, entre o scutellum e os ângulos laterais, indistin-tamente deprimida ou sem impressão; as 2 nervuras int ernas da membrana não anastomosadas mediante uma nervura transversal **Cyminae**
- 4(2') Nem todos os espiráculos abdominais situados ventral-mente; com esta situação, no máximo, apenas os dos 3 segmentos apicais; fêmures anteriores, em geral, moderadamente dilatados e geralmente inermes; rara-mente (*Ischnodemus*) muito dilatados e armados 5
- 4' Todos os espiráculos abdominais situados Ventralmente; fêmures anteriores mais ou menos dilatados e sempre armados em baixo com um ou mais dentes 6
- 5(4) Cabeça sempre mais estreita que a margem posterior do pronotum; tylus não sulcado; hemelitos não convexos, quasi ou completamente sem pontuações; clavus não se estreitando para o ápice; comissura distinta, pelo menos tendo a metade do comprimento do scutellum: fêmures anteriores por vezes muito dilatados (*Ischno-demus*) **Blissinae**²⁷
- 5' Cabeça, ao nível dos olhos, muito larga, tão ou mais larga que o bordo posterior do pronotum; tylus geralmente sulcado; hemelitos convexos e completamente pon-tuados; clavus estreitando-se para o ápice; comissura ausente ou muito curta; fêmures anteriores modera-damente dilatados e inermes **Geocorinae**²⁸

²⁶ Gr. *lygaeus*, obscuro.

²⁷ Gr. *blixo*, eu sugo.

²⁸ Gr. *gea*, terra; *coris*, percevejo.

- 6(4') Fêmures anteriores fortemente dilatados e armados em baixo de um ou mais dentes; corium não excedendo a margem do abdomen, com a nervura externa não paralela ao bordo costal; ancas posteriores não largamente se paradas; búculas curtas, ocupando a parte anterior da cabeça 7
- 6' Fêmures anteriores menos dilatados, tendo em baixo um dente apenas; corium expandido, excedendo a margem do abdomen, com a nervura externa subparalela ao bordo costal; ancas posteriores largamente separadas; búculas estendendo-se até a base da cabeça **Oxycareninae**²⁹
- 7(6) Membrana com as 2 nervuras internas anastomosadas anteriormente, mediante nervuras transversais, formando células basais; margem posterior do pronotum, adiante do scutellum, muito côncava; fêmures anteriores armados de numerosos dentes. **Heterogastrinae**³⁰
- 7' Membrana com as 2 nervuras internas não ligadas anteriormente, por uma nervura transversal; toda as nervuras partindo da base, às vezes reticuladas posteriormente; margem posterior do pronotum, adiante da scutellum, reta; fêmures anteriores muito dilatados e armados de muitos dentes **Pachygronthinae**³¹

278. **Espécies mais interessantes.** - A esta família pertence o *Blissus leucopterus* (Say, 1832) (subfam. Blissinae) (fig. 321), o famoso "chinch bug" dos norte-americanos, que causa vultuosos estragos às Gramíneas cultivadas, destruindo principalmente o trigo e o milho, sendo mesmo considerado nos Estados Unidos como uma das maiores pragas da agricultura. Os prejuizos resultantes dos ataques do "chinch bug" nesse país, de 1850 a 1900, foram avaliados em cerca de \$350.000.000, sendo que, só no ano de 1874, excederam de \$100.000.000.

No Brasil, felizmente, ainda não foi assinalada a presença deste inseto. Na República Argentina, porem, segundo

²⁹ Gr. *oxys*, agudo; *careun*, carena.

³⁰ Gr. heteros, outro; *gaster*, ventre.

³¹ Gr. *pachys*, grosso; *gronthos*, punho fechado.

BOSQ (1937), tem sido encontrado em Buenos Aires e arredores desde 1931, quando foi descoberto por BLANCHARD.

Como outros Hemipteros que atacam folhas, os Ligei-deos nelas determinam o aparecimento de pequenas manchas cloróticas nas partes picadas pelo rostro e, em consequência destas lesões, as folhas secam e morrem.



Fig. 319 - Asa de *Oncopellus* sp.
(cerca de X 10) (Lygaeinae).



Fig. 320 - Asa de *Orthaea* sp.
(X 10) (Rhyparochrominae).

Se algumas espécies, proliferando extraordinariamente, podem causar danos apreciáveis às plantas cultivadas, pode dizer-se que ainda não foi observada no Brasil uma que se possa considerar como verdadeira praga.

Em São Paulo, observou-se *Nysius simulans* Stal, 1859 (subfam. Lygaeinae) (fig. 322), atacando algodoeiro, arroz e milho.

Na fig. 326 vê-se um desenho semi-esquemático de *Orthaea bilobata* (Say, 1931) (subfam. Rhyparochrominae)




Fig. 321 - *Blissus leucopterus* (Say, 1859) (Blissinae): a-d, primeiros estádios; e, último estágio ninfal; f, adulto macroptero; g, adulto microptero; h, ovos. (De Drake, Decker & Worthington, 1934)

(fig. 326), que em Belo Horizonte (Minas Gerais), segundo O. MONTE, ataca o tabaco.

Uma outra espécie interessante é o *Oxycarenus hyalinipennis* (Costa, 1838) (subfam. Oxycareninae) (fig. 323), percevejo de 3,5 a 4 mm. de comprimento, de corpo preto e asas claras, frequentemente encontrado em algodoeiro e outras Malváceas, às vezes em grande quantidade, mormente depois da abertura dos capulhos, entre as fibras do algodão, sugando as sementes. Sobre os hábitos deste inseto recomendando a leitura do trabalho de KIRKPATRICK (1923).




Fig. 322 - *Nysius simulans* Stal, 1859 (cerca de X 13,5) (Lygaeinae).

ARISTOTELES SILVA (1936) verificou a presença de formas jovens e adultas em frutos de quiabeiro (*Hibiscus esculentus*).

Quanto aos danos que *Oxycarenus* pode causar, não somente às sementes do algodoeiro, como ao próprio algodão, que pode ficar manchando quando os insetos são esmagados na colheita ou durante o beneficiamento, ainda não ha informações detalhadas em nosso meio. Quando percorri o Nordeste em 1917, fazendo investigações sobre a lagarta

rosada, vários sertanejos informaram-me que o *Oxycarenum* ataca as lagartas nos capulhos do algodoeiro, matando-as.

As espécies de *Oncopeltus* Stal, 1868 (subfam. Lygaeinae), de porte relativamente grande, são frequentemente vistas no Brasil, especialmente o *Oncopeltus* (*Oncopeltus*) *varicolor* (Fabr., 1794) (fig. 324) e o *Oncopeltus* (*Erythrishius*) *fasciatus* (Dallas, 1852), sugando, "oficial de sala" (*Asclepias curassavica*).




Fig. 323 - *Oxycarenum hyalinipennis* (Costa, 1838) (cerca de X 16) (Oxycareninae).



Fig. 324 - *Oncopeltus* (*Oncopeltus*) *varicolor* (Fabr., 1794) (Lygaeinae). (cerca de X 2)

Nos Estados Unidos *O. fasciatus* foi observado e estudado em outras espécies de *Asclepias* (v. ANDRÉ, 1934) e, sugando o latex destas plantas, pode transmitir o flagelado *Herpetomonas elmassiani* (Mignone), que aí vive.

BRUCH (1917) estudou os hábitos de *Neoblissus parasitaster* Bergroth, 1903 (subfam. Blissinae), espécie mirme-

cófila, que vive, na Argentina e no Brasil, em ninhos de *Solenopsis geminata* (Fabr.).

Recentemente CASTRO FERREIRA e DEANE (1938) observaram no Pará, vivendo em paredes de cabanas feitas de palha de ubussú (*Manicaria saccifera* Gaertn.), um pequeno Hemiptero, que verifiquei ser a *Clerada apicicornis* Signoret, 1863 (subfam. Rhyparochrominae) (fig. 325). Segundo




Fig. 325 - *Clerada apicicornis* Signoret, 1863 (Rhyparochrominae)
(cerca de X 1).

aqueles observadores, jovens e adultos deste inseto comportam-se como os Hemipteros hematófagos da subfamília Triatominae (Fam. Reduviidae), pois sugam sangue do homem e de animais de laboratório.

Confirmam-se, assim, as observações de BERGROTH (1914) e de ILLINGWORTH (1917), relativas ao hematofagismo em *Clerada*.

A nota de BERGROTH refere-se à descoberta, em ninho de uma gambá da Austrália (*Trichosurus vulpecula* Kerr.)

de exemplares de *Clerada nidicola* alguns dos quais pareciam estar cheios de sangue. Na de ILLINGWORTK verifica-se que o autor, depois de ter apanhado, duas vezes, a *Clerada apicicornis* em leitos, capturou-a uma vez sobre uma criança adormecida, que apresentava uma picada semelhante a de uma pulga.

Tratando-se de uma espécie hematófaga e, sobretudo, por já terem CASTRO FERREIRA e DEANE (1938, 1939) verificado que ela se infecta experimentalmente pelo *Schizotry-*




Fig. 326 - *Orthaea bilobata* (Say, 1832) (pouco menos de X 7)
(Rhyparochrominae).

panum cruzi, podendo também transmiti-lo experimentalmente, compreender-se-á a importância de *Clerada apicicornis* na disseminação da doença de Chagas ou tripanosomose americana. (Ler a crítica de LENT (1939) sobre o trabalho de CASTRO FERREIRA e DEANE.)

279. **Bibliografia.**

ANDRE, F.

- 1934 - Notes on the biology of *Oncopeltus fasciatus* (Dallas).
Iowa State Col. Jour. Sci. 9:73-87, 6 figs., 1 ests.

BARBER, A. G. & BRUNER, S. C.

- 1933 - A new subfamily of Lygaeidae, including a new genus and two new species of Pamphantus Stal (Hemiptera - Heteroptera: Lygaeidae).
Jour. N. Y. Ent. Soc. 41:531-539, 2 ests.

BARBER, H. J.

- 1917 - Synoptic keys to the Lygaeidae (Hemiptera) of the United States - Pt. I
Psyche, 34:128-135.
1918 - Idem - Pt. II (Rhyparochrominae).
Ibid., 25:71-88.

BERGROTH, E.

- 1914 - On an Hemipterous insect from an Australian opossum's nest.
Trans. Roy. Soc. S. Austr. 38:53-57.

BRUCH, C.

- 1917 - Insetos mirmecófilos.
Physis (Buenos Aires), 3:141-149, 3 figs.

FERREIRA, L. de CASTRO & DEANE, L.

- 1938 - Encontro de um novo hematófago do homem com hábitos domiciliares (Nota prévia).
Bras. Med. 52(52):1137-1141, 11 figs.
1939 - Infecção experimental do *Clerada apicicornis* Signoret, 1863, pelo *Schizotrypanum cruzi*.
Bras. Med., 52(53):1181.
1939 - Transmissão experimental do *Schizotrypanum cruzi* (Chagas, 1909) pelo *Clerada apicicornis* Signoret, 1863.
Bras. Med. 53(6):249.

HOOD, C. H.

- 1933 - The anatomy of the digestive system of *Oncopeltus fasciatus* Dall. (Heteroptera: Lygaeidae).
Ohio Jour. Sci. 37:151-160, 3 ests.

HORVATH, G.

- 1909 - Species generis Lygaeidarum Clerada Sign.
Ann. Mus. Nat. Hung. 7:622-625.

ILLINGWORTH, J. F.

- 1917 - Clerada apicicornis sucking blood (Hemip.).
Proc. Hawai. Ent. Soc. 3:274.

KIRKPATRICK, T. W.

- 1923 - The egyptian cotton seed bug (Oxycarenus hyalinipennis Costa).
Minist. Agric. Egypt. Techn. Sci. Service. Bull 35.

LENT, H.

- 1939 - Sobre o hematofagismo da Clerada apicicornis e outros artrópodos; sua importância na transmissão da doença de Chagas.
Mem. Inst. Osw. Cruz 34:583-606, 4 figs.

PAINTER, R. H.

- 1928 - Notes on the injury to plant cells by chinch bug feeding.
Ann. Ent. Soc. Amer. 21:232-242, est. 13.

Família **PYRRHOCORIDAE**³²

280. **Caracteres e classificação.** - Hemipteros muito próximos dos Ligeídeos, porém deles se distinguindo por não terem ocelos e pelo aspecto da membrana dos hemelítrios, que apresenta as nervuras anastomosadas na base, onde se formam algumas células, dividindo-se depois em ramos que limitam as células menores (fig. 328).

Não raro se observa, devido principalmente à atrofia da membrana, um dimorfismo alar mais ou menos pronunciado; daí haver, numa mesma espécie, além de formas macropteras, formas braquipteras ou micropteras.

Conquanto os Pirrocorídeos geralmente pouco excedam de 1 cm. de comprimento, é a esta família que pertence

³² Gr. *pyrrhos*, igneo, fogo; *coris*, percevejo.

Macroceroea grandis (Gray, 1832), um dos maiores Hemipteros que se conhece, encontrado na região Oriental. Os machos deste inseto podem ter de 40 a 54 mm. de comprimento.

Ha descritos pouco menos de 400 Pirrocorideos, distribuidos em duas subfamílias: **Euryophthalminae** (= *Larginae*) cujas espécies apresentam o 6° urosternito (na fêmea) dividido na linha mediana e **Pyrrhocorinae**, com tal urosternito inteiro.




Fig. 327- *Epipolops frondosus* Herrich- Schaeffer, (cerca de X 10)
(Lygaeidae, Geocorinae).

As espécies mais importantes, sob o ponto de vista agrícola, pertencem aos gêneros *Dysdercus* Amyot & Serville, 1843 (subfam. Pyrrhocorinae) e *Euryophthalmus* Laporte, 1832 (subfam. Euryophthalminae).

281. **Espécies de Dysdercus.** *Dysdercus ruficollis* (L., 1764). - Das espécies de *Dysdercus* Amyot & Serville, 1843, assinaladas no Brasil- *albofasciatus* (Berg, 1878), *clarki* Distant, 1902, *honestus* Blöte, 1931, *longirostris* Stal, 1861, *maurus* Distant, 1901, *mendesii* Blöte, 1937, *ruficeps* (Perty, 1833) e *ruficollis* (L., 1764) esta última e *mendesii* são as mais conhecidas, sendo abundantemente en-

contradas sobre algodoeiro e Malváceas silvestres, especialmente do gênero *Sida*.




Fig. 328 - Asa de *Dysdercus* sp. (pouco mais de X 9) (Pyrrhocorinae).

D. ruficollis, como as espécies afins de outros países, que também vivem em Malváceas, causa, às vezes, danos consideráveis ao algodoeiro, sugando capulhos ou maçãs,




Fig. 329 - *Euryophthalmus humilis* (Drury, 1782) (cerca de X 3,5) (Euryophthalminae).

quando ainda fechados, ou sementes, quando aqueles já estão abertos.

Deve-se a HEMPEL (1908) a primeira notícia relativa aos danos causados pelo *Dysdercus ruficollis* em nosso país.

Recentemente Mendes (1936) apresentou uma valiosa contribuição ao estudo dos chamados "manchadores" do algodão (*Dysdercus* spp.)³³.

Nesse trabalho, que contem dados interessantes, citados linhas a seguir, relativos ao comportamento desses insetos em São Paulo, o autor assim se manifesta, respeito aos prejuizos que podem causar:

"O manchador» pode causar o estrago conhecido por "podridão interna dos capulhos ou stigmatomycose", pela introdução de baterias ou esporos do certos fungos, nos capulhos. A manifestação principal dessa moléstia é uma podridão interna geral e a produção de uma coloração nas fibras, de amarelo a pardo-amarelado.

Diretamente, o "manchador" pode ser causa dos seguintes prejuizos à cultura algodoeira:

a) queda do maçãs novas, em virtude de ação mecânica de suas picadas;

b) mau desenvolvimento das maçãs, principalmente atacadas quando novas;

c) abertura defeituosa das maçãs atacadas em estado de desenvolvimento, com prejuizo parcial (em uma ou mais lojas) ou total;

d) manchas nas fibras, causadas pela morte das células e disseminação do conteúdo protoplasmático no interior da cavidade da maçã. Neste caso as fibras ficam também mais fracas em virtude de interrupção no fornecimento regular de seus componentes normais;

e) manchas nas fibras, causadas pelas dejeções dos insetos. No geral tal acontece quando um ataque intenso se manifesta por ocasião da abertura dos capulhos, sendo, entretanto, pequena a proporção de fibra manchada por esta causa;

³³ Em publicação ulterior (1938) Mendes informa, que, das espécies de *Dysdercus* por ele observadas nos algodoeiros de São Paulo, além de *ruficollis* e *honestus* ha uma outra, também encontrada nos algodoeiros do Perú, que foi classificada por Blöte como nova espécie - *Dysdercus mendesi* Blöte, 1937.

f) mau desenvolvimento ou morte dos sementes atacadas, que apresentam baixo poder germinativo e menor teor em óleo.

Entretanto, não é pelos prejuízos diretos que *Dysdercus* spp. são insetos perigosos à cultura algodoeira. Os prejuízos acima citados, reunidos, apresentam menor valor econômico que os que podem causar indiretamente, servindo de veículo à transmissão de fungos e bacterias causadores da referida "podridão interna dos capulhos".

.....

.....

.....

Alguns autores referem-se à transmissão da antrachnose do algodoeiro, causada pelo fungo *Glomerella gossypii*, por *Dysdercus ruficollis* L., o que ainda não está provado. O que parece ser mais provavel é o desenvolvimento mais rápido do fungo referido, nas lesões feitas pelo inseto, que lhes serve de caminho a uma maior infecção."

Segundo MENDES, as fêmeas, em condições normais, parecem ter uma longevidade maior que a dos machos, podendo viver aproximadamente um mês após ter atingido a fase adulta.

A cópula, de acordo com as observações de MENDES, realiza-se tres dias depois da fêmea atingir a fase adulta, ficando macho e fêmea, como aliás se observa com os demais Pirrocoideos, unidos pelo ápice do abdomen e voltados em direções opostas.

Tal ato neste inseto é sempre demorado, durando, segundo MENDES, de 1 a 7 dias ou, em média, 3,5 dias.

"pelo que pudemos observar, os machos podem passar mais de metade de sua vida copulando, desde que se encontrem num meio que lhes proporcione alimentação abundante e fêmeas virgens em número suficiente.

Cada cópula dura de 1 a 7 dias, com uma média de 3,5 dias.

Os machos parece procurarem se unir com maior frequência às fêmeas virgens; entretanto, unem-se também às

fêmeas já fecundadas, desde que estas estejam dispostas para tal ou que o desenvolvimento de seu abdômen não impossibilite ao macho alcançar seus órgãos genitais em posição conveniente.

As fêmeas, na sua maioria, copularam uma só vez, tendo sido observados, entretanto, casos em que se sujeitaram a mais de uma união. O número médio de uniões sexuais (com o mesmo macho), por fêmeas, foi de 1,4."

A fêmea, depois de fecundada, prepara para a postura um ninho no solo, onde deposita os ovos. Em várias posturas uma fêmea põe, segundo MENDES, uma média de 246



Fig. 330 - *Euryophthalmus humilis* (Drury, 1782) (X 1,6)
(Euryophthalminae).

Fig. 331 - *Dysdercus longirostris* Stal, 1861 (X 1,6) (Pyrrhocorinae).

ovos. Destes, alguns dias depois, emergem as formas jovens. Inicia-se assim o desenvolvimento post-embrionário, que se realiza com mais quatro estádios jovens. Os resultados médios obtidos por MENDES para a mudança dos vários estádios imaturos foram os seguintes: 1^a estádio 3,1 dias; 2^a - 4,3; 3^o - 4,6; 4^o - 6,8; 5^o - 10,3; realizando-se o ciclo vital, contado do dia em que é feita a primeira postura, até se ter a primeira fêmea adulta, em pouco mais de 40 dias.

Para combater estes insetos são indicadas as seguintes medidas: destruição das plantas imprestáveis que os hospede-

dam (*Sida*, *Hibiscus*)³⁴ e apanha dos insetos, pela manhã, em vasilhas contendo querosene, batendo as plantas infestadas. É também indicado o método que consiste no emprego de armadilhas constituídas por bagaço de cana de açúcar, onde os insetos no fim de algum tempo se acumulam em grande quantidade, podendo-se assim facilmente destruí-los.

282. **Dysdercus longirostris** Stal, 1861 (figs. 331-333). - Sobre esta espécie, bem característica pelo rostrum muito alongado, que atinge aproximadamente o 5° urosternito, GOMES (1938) escreveu interessante artigo, do qual transcreverei os seguintes trechos:

"Natureza dos danos - Como observei, esse percevejo perfurando e introduzindo na laranja, através da casca, os estiletos maxilares e mandibulares do seu rostrum longo, sugalhe a polpa, chegando a permanecer em certos casos, num só ponto cerca de 30 minutos, quando não perturbados. Um único inseto fere, em geral, mais de uma vez a mesma fruta, que pode apresentar também vários deles.

As laranjas lesionadas alteram, comumente, no fim de pouco tempo, a cor da casca em torno das perfurações, bem se acentuando nas de maturação ainda incompleta. Decorridos 7-8 dias, em média, uma podridão sobrevem, caracterizada pela frutificação de *Penicillium* (*P. italicum* Wehmer, e *P. digitatum* Sac.).

No pomar em que presenciei o ataque deste hemíptero, grande era o número de frutas podres no solo, tendo havido, em relação à safra do ano anterior, uma perda em caixas avaliada em cerca do 20%.

34 "Alem deste (*Gossypium*), tem sido notado também sobre outras plantas da família Malvaceae: *Urena* sp. (Guaxima, Carrapicho ou Carapicú), *Sida* sp. (Cuiteleiro), *Hibiscus esculentus* L. (quiabeiro) e da família Bombacaceae: *Chorisia* sp. (paineira). Monte diz ter encontrado *Dysdercus ruficollis* L. sobre representantes da família Bombacaceae: *Pachira aquatica* Aubl. (Castanheira do Maranhão, Mamorana, Embiruçu, ou Paina de Cuba) e *Bombax ventricosa*. Arr. Cam. (B arriguda ou Paineira), e da família Cochlospermaceae: *cochlospermum insigne* St. Hil. (Algodoeiro do campo, Butuá de Corvo. Rui-bardo do campo, Periquiteira, Algodão Cravo, Samaúna do Igapó, Algodão do Mato ou pacoté). As ocorrências citadas por esse autor referem-se assim o acreditamos, ao Estado de Minas Gerais". (Mendes).

O fato de não se alimentar de laranjas em decomposição, caídas no terreno e mesmo nas árvores, faz que não seja admitido como transmissor direto do mofo pela picada, sendo, todavia, responsável pela entrada dos esporos deste através dos orifícios feitos na casca pelas peças bucais.

O ataque das formas jovens em geral se acentua quando nas fases mais adiantadas de desenvolvimento, próximas a se transformarem em adultos.




Fig. 332 - *Dysdercus longirostris* Stal, 1861 (X 3,5) (De Gomes, 1938).

Dados biológicos - Das observações que fiz, pude averiguar que este percevejo dá preferência pelas laranjeiras pouco insoladas, situadas em lugares baixos e úmidos, apresentando menor atividade nas horas mais quentes do dia, quando se aglomeram em pontos sombrios, em geral, nas partes baixas dos troncos e no chão. Pela manhã, ao contrário, é sempre encontrado em maior quantidade sobre os frutos.

No ato de cópula, que pode durar mais de 2 horas, a fêmea e o macho ficam em direções opostas, unindo-se pelas extre-

midades dos abdomens. Durante a operação ambos se locomovem e se alimentam.

Diferentemente de outro hemiptero sugador de laranjas, o coreideo *Leptoglossus gonager* (Fr.), que deposita os ovos, segundo verificou C. H. Reiniger, nas folhas de Melão de São Caetano (*Mormodica charantia*), a fêmea do *D. longirostris*, depois de fecundada, procura no terreno um lugar próprio para efetuar a postura, em geral abrigado, entre restos de vegetação terra fofa, fendas, etc. Uma vez encontrado escava uma cela, o suficiente para permitir a sua




Fig. 333 - *Disdercus longirostris* Stal, 1861, joven (cerca de X 4)
De Gomes, 1938).

entrada, colocando-se no interior em posição inclinada, com o abdomen voltado para baixo, e assim permanece até completar a oviposição. Finda esta, que demora poucas horas, retira-se da cela, cobrindo em seguida os ovos com cisco ou terra para protege-los.

Estes são esféricos, brancos, ligeiramente amarelados, dispostos em massa, tornando-se pardacentos à medida que se aproximam da eclosão.

O fato de ter encontrado sobre frutos semente poucas formas jovens em últimos estádios, levou-me a procurá-las na vegetação adventícia do pomar, e certo é que em carurú de espinho (*Amaranthus spinosus*) encontrei inúmeras, parecendo exato que nesta fase procuram plantas mais tenras para alimento.

Medida de combate - Pelo pouco que acima ficou dito com relação a certos pormenores do modo de vida do *D. longirostris*, acho que, na defesa do laranjal contra o seu ataque, devem ser tomadas as seguintes medidas:

1º, uma vez constatada a sua presença, proceder a destruição das formas adultas quando em repouso, durante as horas quentes do dia, no chão, junto ao tronco ou sobre este, procurando o melhor meio de esmagá-las;

2º, efetuar a apanha das que se acharem sobre as laranjeiras, acondicionando-as numa vasilha contendo uma solução inseticida (água e querosene, p. ex.). Por não voarem os adultos logo assim se sentem molestados, esta operação não se torna de todo impossível;

3º, manter o terreno limpo, evitando a amontoa em torno das laranjeiras dos restos de vegetação, proveniente da capina, entre os quais as fêmeas encontram, em geral lugar próprio para a postura. O tratamento superficial do terreno, que em carácter experimental realizei, contra as larvas alojadas na cobertura de terra frouxa e vegetação seca, pela rega com emulsão de bisulfureto de carbono, pode ser feito com algum resultado, se bem que pouco econômico para casos de infestação generalizada;

4º, finalmente, procurar melhorar o arejamento das laranjeiras".

MENDES (1938) informa que M. DINIZ colheu este inseto sobre sementes de paineira (*Chorisia* sp.).

As espécies de *Dysdercus* são parasitadas no Brasil por várias moscas da fam. Gymnosomatidae descritas por TOWNSEND (1937-1938). Dentre elas, porém, a mais eficiente é a *Acaulona brasiliana* Townsend, 1937, que ataca *D. honestus* Blöte, *D. ruficollis* (L.) e *D. mendesi* Blöte.

283. **Outros Pirrocorídeos interessantes.** - Além das espécies de *Dysdercus*, encontram-se também frequentemente no Brasil vários representantes de *Euryophthalmus* Laporie, 1932 (= *Largus*, 1831), dentre os quais devem ser citados: *Euryophthalmus humilis* (Drury, 1782) (figs. 329 e 330), *E. lunaris* (Gmelin, 1788) e *E. rufipennis* Laporte, 1832. No Rio Grande do Sul, BRUCK e DESLANDES (1927), observaram

esta última espécie atacando a batatinha e o fumo. Várias espécies de Pyrrhocoridae, principalmente da subfamília Euryophthalminae, mimetizam outros insetos, especialmente formigas. Na fig. 334 apresento o desenho de HUSSEY (1927) de uma dessas espécies - *Thaumastaneis montandoni* Kirkaldy & Edwards, 1902, encontrado em Goiaz e em Mato Grosso (Chapada).




Fig. 334 - *Thaumastaneis moutandoni* Kirkaldy & Edwards, 1902 (Euryophthaminae), (fêmea) vista de perfil (De Hussey, 1927).

Ha na coleção do Instituto Osvaldo Cruz uma interessante espécie de *Theraneis* (Spinola, 1810), ainda não descrita, cujo aspecto lembra o de um Himenoptero da família Mutilidae.

284. Bibliografia.

BLÖTE, H. C.

- 1931 - Catalogue of the Pyrrhocorides in's Ryks Museum van Natuurlijke Histoire.
Zool. Meded. 14:97-136, 9 figs.
- 1933 - New Pyrrhocoridae in the collection of the British Museum (Natural History).
Ann. Mus. Nat. Hist.. (10)11:588-602, 3 figs.
- 1937 - A new cotton-stainer (Heteroptera-Pyrrhocoridae
Zool. Meded. 20:181-182, 1 fig.

GOMES, J.

- 1938 - Sobre o *Dysdercus longirostris* Stal. Um percevejo sugador de laranjas no D. Federal.
O Campo, 9(97):58 e 60, 2 figs.

HEMPEL, A.

- 1908 - insetos nocivos ao algodoeiro e seu tratamanto
(2^a edição).
Secret. Agric. Com. Obr. Publ. São Paulo, 34 pp.,
20 figs.

HOLMES, T. O.

- 1925 - the relation of *Herpetomonas elmassiani* (Migone)
to its plant and insect hosts.
Biol. Bull. 49:323-337. 5 figs.

HUSSEY, R. T.

- 1929 - Pyrrhocoridae - in Gen. Catal. of the Hemiptera.
144p.
Southampton: Smith College.

MENDES, L. O. T.

- 1936 - II - Os "manchadores" do algodão (*Dysdercus* spp.).
Inst. Agr. Campinas, Bol. Tech. 23, 21 pp., 2 ests.
1938 - Sobre algumas espécies de *Dysdercus* do Brasil e do
Perú (Hemiptera: Pyrrhocoridae).
Rev. Ent. 8:204-205.
1938 - lista dos inimigos naturais de *Dysdercus* spp., obser-
vados no Estado de São Paulo.
Rev. Ent. 9:215-217.
1938 - Genetics of *Dysdercus*. I. Behaviour of a melanie
form of *Dysdercus mendesi* Bloete.
Jour. Hered. 29:387-389.
1938 - *Dysdercus* das coleções do Instituto Oswaldo Cruz
(Rio de Janeiro) e do Instituto de Biologia Vegetal
(Rio de Janeiro).
Bol. Biol., São Paulo (n. s.) 3:133-134.
1939 - *Dysdercus* da coleção da Escola Nacional de Agro-
nomia (Rio de Janeiro).
Bol. Biol., São Paulo (n. s.) 4:98.

MONTE, O.

- 1936 - O percevejo do algodoeiro, *Dysdercus Ruficollis* L.
Chac. Quint. São Paulo, 53:452-454, 2 figs.

MYERS, J. G.

- 1927 - Ethological observations on some Pyrrhocoridae of
Cuba.
Ann. Ent. Soc. Amer. 20:279-300.

PEARSON, E. O.

- 1932 - Notes on the genus *Dysdercus* (Hemiptera, Heteroptera) in Trinidad, B. W. I.
Psyche, :113-126, 1 est.

SEIDEL, F.

- 1904 - Die Geschlechtsorgane in der embryonalen Entwicklung von *Pyrrhocoris apterus*.
Zeits. Morph. Oekol. Tiere, 1:429-506.

SCHMIDT, E.

- 1931 - Zur Kenntnis der Familie Pyrrhocoridae Fieber (Hemiptera - Heteroptera) .
Stett. Ent. Zeit. 92:1-51.
1932 - Zur Kenntnis der Familie Pyrrhocoridae Fieber (Hemiptera - Heteroptera). Teil II.
Wien. Ent. Zeits. 49:236-281; 328.

TOWNSEND, C. H. T.

- 1937 - New fly parasites of *Dysdercus*.
Rev. Ent. 7:316-318.
1938 - Further fly Parasites of Heteroptera.
Rev. Ent. 8:204; :347-348.

WILLE, J.

- 1934 - Dos informes sobre el arrebatiado, *Dysdercus ruficollis*.
Circ. Estac. Exp. Agr. lima, 28:5-14, 2 ests.

Superfamília **THAUMASTOTHERIOIDEA**³⁵

Família **THAUMASTOTHERIIDAE**

(*Thaumastocoridae*)

285. **Espécie mais interessante.** - Compreende algumas espécies da região australiana e uma encontrada em Cuba e em Flórida de gênero *Xylastodoris* - *X. luteolus* Barber, 1920 (fig. 335), que ataca folhas novas da palmeira imperial (*Oreodoxa regia*), causando às vezes grandes danos.

Neste grupo as garras tarsais são também providas de arólios.

³⁵ Gr. *thaumastos*, admiravel; *therion*, animal Selvagem; *coris*, percevejo.

Superfamília **ARADOIDEA**

286. **Caracteres, etc.** - Pertencem a esta superfamília os Hemipteros da antiga família Aradidae, representada por espécies de alguns milímetros a pouco mais de um centímetro de comprimento, de cor negra ou parda mais ou menos escura e corpo ovalar, fortemente deprimido em cima e em baixo.



Fig. 335 - *Xylastodoris luteolus* Barber, 1920 (Thaumastotheriidae (X 28)
(De Barber, 1920).

Cabeça horizontal com a frente mais ou menos prolongada entre as antenas; estas curtas, espessas, de quatro segmentos, inseridas em tubérculos anteníferos geralmente ponteagudos; ocelos ausentes; rostrum retilíneo, de quatro segmentos (o segmento basal muito curto), ora recebido entre as búculas em sulco rostral profundo, ora livre (Iso-dermidae).

Pronotum geralmente provido de carenas longitudinais; scutellum variavel, triangular, medíocre ou largo e neste caso ocultando grande parte dos tergitos abdominais.

Hemelitros, quando presentes, mais ou menos reduzidos, deixando exposta, aos lados e atrás, grande parte da porção marginal do abdomen que os enquadra; membrana geralmente provida de tres a quatro nervuras irregulares que se anastomosam, porem, às vezes sem nervuras; em várias espécies o corium e a membrana mal se distinguem na estrutura.

Como em outras famílias de Hemiptera, ha espécies pterigo-polimórficas, com indivíduos mais ou menos braquipteros, sem asas funcionais e com hemelitros mais ou menos reduzidos.

Ostíolos raramente visíveis. Tarsos dimeros (bi-articulados, raramente tri-articulados) e geralmente sem arólios.

287. **Classificação.** - Ha cerca de 400 espécies descritas em todo o mundo, distribuidas pelos autores modernos em quatro famílias, que se distinguem pelos seguintes caracteres:

- | | | |
|------|---|------------------------------|
| 1 | Scutellum distinto; com olhos; tylus formando a projeção anterior da cabeça; bucculae geralmente formando um sulco rostral; margem do corpo mais ou menos unida ou com lóbulos irregulares | 2 |
| 1' | Scutellum invisível; sem olhos; tylus no fim de uma incisão profunda que se estende da margem anterior da cabeça para trás; búculas não formando um sulco rostral apreciavel; toda a margem do corpo lobulada, com os lóbulos subiguais separados ou fundidos | Termitaphididae |
| 2(1) | Rostrum não emergindo do ápice da cabeça e disposto num sulco entre as bucculae | 3 |
| 2' | Rostrum emergindo do ápice da cabeça e não disposto num sulco rostral | Isodermidae |

- 3(2) Prosternum com um sulco mediano distinto; rostrum geralmente atingido ou excedendo o prosternum; cabeça estreitando-se para trás dos olhos; estes projetando-se além das genae; hemelitros não limitados exclusivamente ao disco do abdomen, tendo o corium, na base, uma expansão lateral; trocanteres soldados aos fêmures; espiráculos abdominais situados perto da margem basal ou proximal de cada urômero. **Aradidae**
- 3' prosternum sem sulcos; rostrum não excedendo a margem posterior da cabeça: cabeça mais larga atrás que adiante dos olhos; estes não se projetando além das genae; hemelitros incluídos nos limites do disco do abdomen; trocanteres livres; espiráculos abdominais situados a iguais distâncias das margens basal e apical dos urômeros **Dysodiidae**




Fig. 336 - Cabeça de *Aradus* sp.; Vêm-se, na parte anterior e através do tegumento diafanizado, os estiletos bucais enrolados (X 74).

288. **Hábitos.** - Os Aradideos, manifestando quasi sempre um tigmotropismo positivo e um fototropismo negativo, vivem gregariamente em pequenas colônias, sob a casca ou em fendas no caule das plantas. Daí os nomes *Corticicolae*³⁶ e *Phloeobiotica*³⁷ que lhes foram aplicados, respectivamente, por Amyot & Serville e Reuter.

³⁶ Lat. *cortex*, casca.

³⁷ Gr. *phloios*, casca; *bioticos*, que pertence a vida.

Segundo informam os autores que os têm estudado, normalmente se alimentam sugando os fungos que se encontram em tais lugares (micetófagos). As espécies de Termitaphididae vivem em simbiose com termitas.

Família **ARADIDAE**³⁸

289. **Espécie mais interessante.** - Esta família é representada pelo gênero *Aradus* Fabr., 1803, com várias espécies das regiões Paleártica e Neártica.



Fig. 337 - *Dysodius lunatus*
(Fabr., 1794) (Dysodiidae)
(X 2,60).



Fig. 338 - *Aneurus* sp. (Dysodiidae)
(cerca de X 10). As asas
foram retiradas

Devo aqui chamar a atenção para a disposição interessante dos estiletos bucais nas espécies deste gênero. Extraordinariamente alongadas, pois medem cerca de cinco vezes o comprimento do corpo, em repouso ficam enroladas em dupla espiral vertical, como uma mola de relógio, numa

³⁸ Gr. *Arados*, nome de uma antiga cidade da Síria.

grande câmara da cavidade preoral, situada pouco adiante da bomba sugadora e formada, principalmente, pelo clypeus e labrum fundidos (fig. 336).

Do Brasil a espécie mais conhecida é o *Aradus* (*Aradus*) *falleni* Stal, 1860.

Família **DYSODIIDAE**³⁹

(*Brachyrhynchidae*; *Aneuridae*; *Meziridae*)⁴⁰

290. **Espécies mais interessantes.** - A esta família pertencem quasi todos os Aradideos da região neotrópica, distribuídos em vários gêneros, dentre os quais merecem citados *Mezira* Amyot & Serville, 1843, *Neuroctenus* Mayr, 1866 e *Dysodius* Lepelletier & Serville, 1825, este com algumas espécies de aspecto curioso, como *Dysodius lunatus* (Fabr., 1794) (fig. 337).

Na fig. 338 acha-se representada uma espécie do gênero *Aneurus* Curtis, 1825 (provavelmente *A. subdipterus* Burm., 1835), representado por espécies de corpo muito achatado, laminado, asas rudimentares e hemelítrios quasi que inteiramente membranosos e sem nervuras.

O inseto foi-me enviado do Rio Grande do Sul pelo Dr. A. Ronna, com a informação de o ter encontrado em abundância sob casca de videira. Trata-se provavelmente de uma espécie micetófaga.

Família **ISODERMIDAE**⁴¹

291. **Espécie mais interessante.** - Desta pequena família, que se distingue de Aradidae principalmente por terem as suas espécies o rostrum terminal, livre, ha na região neotrópica o gênero *Isodermus* Erichson, 1812, com a espécie *I. gayi* (Spinola, 1852), encontrada no Chile e na Patagônia.

³⁹ Gr. *dysodia*, mau odor.

⁴⁰ Gr. *brachys*, curto; *rhyngchos*, tromba.
Gr. *neuron*, nervura.

Hebreu. *zor*, *zara*, nauseabundo.
⁴¹ Gr. *isos*, mesma; *derma*, pele.

Família **TERMITAPHIDIDAE**⁴²*(Termitocoridae)*

292. **Caracteres, etc.** - Os insetos desta família têm alguns milímetros de comprimento, corpo fortemente deprimido, de contorno elítico e com o dorso escondendo inteiramente as antenas, o rostrum e as pernas.

Evidentemente próximos dos Aradideos, têm também, como mostrou CHINA (1931), grandes afinidades com os Pentatomideos da família plataspidae.

Ha atualmente pouco mais de 10 espécies descritas, da América, da África, da Austrália e da Ásia, quasi todas do gênero *Termitarardus* Myers, 1921, com algumas espécies da região neotrópica, encontradas em termiteiros de *Heterotermes* e outros cupins.

Do gênero *Termitaphis* Wasmann, 1902, citarei *T. circumvallata* Wasm., 1902, encontrada na Colômbia em termiteiros de *Amitermes foreli* Wasm.

"A biologia destes Hemipteros é por assim dizer desconhecida, se bem que se possa supor, dada a conformação das peças bucais, que sejam micetófagas (Myers), como a maior parte dos Aradideos e dos *Coptosomoides* (Plataspidae) (W. E. China, *op. cit.*)" (Poisson, 1938).

293. **Bibliografia.**

BERGROTH, E.

1886 - zur kenntniss der Aradiden.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36:53-60, est. 2.

MYERS I. G.

1924 - On the systematic position of the family Termitaphididae (Hemiptera: Heteroptera) With a description of a new genus and species from Panama.
Psyche, 31 :259-278, est. 10.

⁴² Gr. *termes*, cupim; *aphyo*, sugo; *coris*, percevejo.

- 1932 - Observations on the family Termitaphididae (Hemiptera: Heteroptera) with the description of a new species from Jamaica.
Ann. Mag. Nat. Hist. (10)9:366-372.

PARSHLEY, H. M.

- 1922 - Essay on the american species of *Aradus* (Hemiptera).
Trans. Amer. Ent. Soc. 47:1-106, ests. 1-7.

POISSON, R.

- 1938 - *Ulopella termiticola*, nov. gen., n. sp., type nouveau d'*Ulopinae* commensal des Termites. (Hem. Hom. Jassidae).
Bull. Soc. Ent. Fr. 43:13-17, 2 figs.
(Neste artigo o autor faz interessantes considerações sobre a família Termitaphididae).

SILVESTRI, F.

- 1911 - Sulla posizione sistematica del genere *Termitaphis* Wasm. (Hemiptera) con descrizione di due specie nuove.
Boll. Lab. Zool. Sc. Sup. Agr. Portici, 5:231-236.

SPOONER, C. J.

- 1920 - A note on the mouth parts of the Aradidae.
Ann. Ent. Soc. Amer. 13:121-122, 1 fig.

USINGER, R. L.

- 1936 - Studies in the American Aradidae with descriptions of new species (Hemiptera).
Ann. Ent. Soc. Amer. 29:490-514, ests. 1 e 2.

WASMANN, E.

- 1902 - Species novae insectorum Termitophilorum ex America Meridionali.
Tijdschr. Ent. 45:75-107.

Superfamília **TINGITOIDEA***(Tingidoidea)*

294. **Classificação.** - Constituem a superfamília Tingitoidea as famílias **Tingitidae** e **Piesmidae**. Esta, representada pelo gênero *Piesma* Le Peletier & Serville, que tem como representante no Brasil a *P. cinerea* (Say, 1832).

Rica em espécies é a família Tingitidae, que passo a considerar.

Família **TINGITIDAE**⁴³*(Tingidae; Tingididae)*

293. **Caracteres, etc.** - Insetos pequenos, de alguns milímetros de comprimento, facilmente reconhecíveis pelo aspecto reticulado ou alveolado do torax, principalmente notavel nos hemelitos e no pronotum, que, não raro, apresenta expansões lobuladas ou vesiculares mais ou menos conspícuas.

Antenas relativamente curtas, de quatro segmentos, espessas ou delgadas; ocelos ausentes; vertex geralmente provido de espinhos mais ou menos proeminentes (fig. 342); rostrum retilíneo, de quatro segmentos, alojado num distinto canal rostral, formado, na cabeça, pelas búculas muito salientes e no torax por um sulco que se estende do prosternum ao, metasternum. Pronoto mais ou menos convexo, prolongado posteriormente em um processo que cobre o escutelo; a porção anterior pode ser mais ou menos proeminente, apresentando-se com o aspecto de um capús ou dilatação empolácea ou visculiforme que encobre a cabeça (*hood*) (figs. 340 e 341). O disco do pronoto pode ter de uma a tres rugas longitudinais (*carinae*) (figs. 342-3) e as

⁴³ De *Tingis* Fabr., 1803, com etimologia incerta; Segundo Amyot e Serville, nome da cidade de Tanger.

partes laterais frequentemente se apresentam expandidas em abas foliáceas, planas ou de bordos voltados para cima, às vezes bem largas (*paranota*, de CHAMPION) (figs. 340,




Fig. 339 - Hemelitra de Tingitideo com as respectivas áreas e areolas: 1, área costal (*membrana costal* de Stal); 2, área subcostal (*area costalis* de Stal); 3, área discoidal.

341 e 342). Hemelitros homogêneos, distintamente reticulados, não se notando distinção estrutural entre o corium e a membrana.

As principais nervuras delimitam as seguintes regiões: *área costal* (*membrana costae* de STAL) (figs. 339⁻¹); *área subcostal* (*area costalis* de STAL) (figs. 339⁻²); *área discoi-dal* (*area discoidalis* de STAL.) (figs. 339⁻³); *área sutural*, correspondente à membrana, nas outras famílias.




Fig. 340 - *Stephanitis olyrae* Drake & Hambleton, 1935 (Tingitidae) (cerca de X 26) (De Drake & Mambleton, 1935, Fig. 5). Os dois traços indicam uma das paranota e a carena mediana.

Nos Tingitídeos não são raros os casos de dimorfismo alar, verificando-se a atrofia parcial ou total das asas posteriores e o encurtamento dos hemelitros.

A família Tingitidae compreende mais de 600 espécies, das quais cerca de 400 vivem nas Américas, quasi todas da

subfamília **Tingitinae**. Bem poucas ha pertencentes às subfamílias **Cantacaderinae** e **Serenthiinae**.

A literatura relativa aos nossos Tingitideos, alem do que escreveram STAL (Ennumeratio, 3), DISTANT (Biol. Centr. Amer.), GIBSON (1919 e 1922) e BERGROTH (1922), é princi-




Fig. 341 - *Dicysta lauta* Drake & Hambleton, 1935 (Tingitidae) (cerca de X26)
(De Drake & Hambleton, 1935, fig. 6)

palmente representada pelos vários trabalhos de DRAKE, alguns em colaboração com outros autores, citados na bibliografia deste grupo e de MONTE.

295. **Hábitos, importância econômica e meios de combate.** - Vivem os Tingitideos em colônias mais ou menos

numerosas, na face inferior das folhas; aí fazem as posturas, ficando os ovos colados à superfície das folhas pela secreção das glândulas coletéricas ou embutidos no parênquima foliar. Deles saem formas jovens com o corpo em geral fortemente espinhoso.




Fig. 342 - *Liotingis aspidospermae* Drake & Hambleton, 1935 (Tingitidae) (cerca de X 26) (De Drake & Hambleton, 1935, fig. 3).

Dos danos causados pelos Tingitideos pode fazer-se uma idéia lendo o trecho seguinte de BONDAR, em que ele descreve os estragos produzidos nas folhas do algodoeiro pela *Gargaphia torresi* Costa Lima, 1922:

"As larvas e adultos vivem nas folhas, principalmente na página inferior, chupando a seiva da planta e provocando a "ferrugem". O centro da folha, atacado primeiro, envelhece e morre queimado pelo sol, e a periferia frequentemente conserva-se verde. Examinando a página inferior da folha atacada, notam-se grandes colônias deste inseto, larvas de diversas idades e adultos. No logar ocupado, a folha é amarela

pela distribuição da chlorophylla e coberta com numerosas manchas pretas, excrementos do inseto. Quando a folha está para morrer os adultos abandonam-na e vão procurar folhas novas para depositar ovos e alimentar-se. Além do algodoeiro, observamos o mesmo inseto em quiabeiros que se acharam completamente estragados pelo inseto."

No meu "3º Catálogo dos insetos que vivem nas plantas do Brasil", estão relacionadas as espécies cujas plantas hospedadoras eram conhecidas, até 1934. Nos trabalhos de




Fig. 343 *Psilobyrsa vriesiae* Drake & Hambleton, 1935 (Tingitidae) (cerca de X 26) (De Drake & Hambleton, 1935, fig 4).

DRAKE, publicados de 1935 em diante, ha a citação de outras espécies, com a indicação das plantas em que vivem.

DRAKE descreveu uma espécie do Congo Belga, *Copium hamadryas*, que produz galhas em inflorescências de uma espécie de *Clerodendron*.

Os Tingitideos são combatidos mediante pulverizações de quaisquer insecticidas externos (emulsão sabonosa de querosene, extrato de tabacos, etc.).

296. Bibliografia.

BERGROTH, E.

- 1922 - On some neotropical Tingitidae,
Ann. Soc. Ent. Belg. 42:149-152.

BLANCHARD, E. E.

- 1926 - Sobre un Tingido nueva para la Fauna Argentina.
Physis, 8:361-363, 1 fig.

BONDAR, G.

- 1925 - Insetos daninhos e moléstias das plantas culturais.
Bol. Lab. Path. Veg., Bahia, 2:41-57, figs. 7-13.
1936 - Tingitideo nocivo às Anonáceas frutíferas do Brasil.
O Campo, 7(73):51, 1 fig.

CHAMPION, G. C.

- 1898 - Notes on American and other Tingitidae with descriptions of two new genera and four species.
Trans. Ent. Soc. London: 55-64, ests. 2 e 3.

DRAKE, C. J.

- 1922 - Neotropical Tingitidae with descriptions of three new genera and thirty-two new species and varieties (Hemiptera).
Mem. Carneg. Mus. 9:351-378, 2 figs. est. 39.
1922 - On some North and South American Tingitidae (Hemip.).
Florida Entom., 5:37-43; 48-50, 1 fig.
1923 - Two new species of Cantacader (Hemiptera Tingitidae).
Bull. Brookl. Ent. Soc., 18:81-84, 1 fig.

DRAKE, C. J. & BRUNER, S. C.

- 1923-1924 - Concerning some Tingitidae occurring in the West Indies.
Mem. Soc. Cubana Hist. Nat. "Felipe Poey, (3 e 4).

DRAKE, C. J.

- 1926 - The South American species of the genus *Tingis* Fabricius (Hemiptera).
Ann. Carneg. Mus. 17:83-85.
- 1928 - New and little known neotropical Tingitidae.
Iowa St. Col. Jour. Sci. 3:41-56.
- 1928 - Concerning some Tingidae from Argentina with descriptions of five new species.
Physis, Buenos Aires, 9:72-76.
- 1929 - Some Tingitoidea from Central and South America.
Bull. Brookl. Ent. Soc. 24:35-37, 1 fig.
- 1930 - Some Tingitidae from Brazil (Hemiptera).
Bull. Brookl. Ent. Soc. 25:25-26.
- 1930 - Notes on American Tingitidae (Hemiptera).
Bull. Brookl. Ent. Soc. 25:268-272.
- 1930 - Some Tingitidae (Hemiptera) from Brasil.
Amer. Mus. Novit. 398, 3 p.
- 1931 - Two new species of *Tigava* from South America (Hemiptera - Tingitidae).
Proc. Hawaii. Ent. Soc. (1929-1930) 7:405-406.
- 1931 - Concerning the genus *Leptodietya* Stal (Hemiptera - Tingitidae).
Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 7:119-122.
- 1931 - Neotropical Tingitidae (Hemiptera).
Ann. Mag. Nat. Hist. 10(8):225-227, 1 est.
- 1931 - The Cornell University entomological expedition to South America, 1919 and 1920; scientific results number 5. Hemiptera-Tingitidae.
Ann. Ent. Soc. Amer. 24:510-514.

DRAKE, C. J. & BONDAR, G.

- 1932 - Concerning brazilian Tingitidae (Hemiptera).
Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 8:87-96, 1 est.

DRAKE, C. J. & HAMBLETON, E. J.

- 1934 - Brazilian Tingitidae (Hemiptera) (Parte I).
Rev. Ent. (Rio de Janeiro), 4:435-451, 2 figs.

DRAKE, C. J. & POOR, M. E.

- 1935 - An undescribed rubber Tingitid from Brazil (Hemiptera).
Jour. Wash. Acad. Sci. 25:283-284. 1 fig.

DRAKE, C. J.

- 1935 - American Tingitoidea (Hemiptera) in the Natural History Museum of Vienna.
konowia, 14:9-20, 2 figs.

DRAKE, C. J. & HAMBLETON, E. J.

- 1935 - New Brazilian Tingitidae (Hemiptera) (Parte II).
Arch. Inst. Biol. São Paulo, 6:141-154, 6 figs.

DRAKE, C. J. & POOR, M. E.

- 1936 - The genus and genotypes of Tingitoidea of the Western Hemiptera.
Iowo State Coll. Jour. Sci. 10:381-390.

DRAKE, C. J.

- 1936 - Some Tingitoidea from Argentina (Hemiptera).
Trav. Inst. Zool. Acad. Sci. U. R. S. S. 3:699-701,
 1 fig.

DRAKE, C. J. & POOR, M. E.

- 1937 - The South American Tingitidae described by Stal.
Mem. Carneg. Mus. 11:301-314, est. 36.
 1937 - Concerning the genus *Leptobyrsa* Stal (Hemiptera).
Proc. Biol. Soc. Wash. 50:163-166.
 1938 - Concerning Brazilian Tingitidae (Hemiptera)
 (Part. III).
Rev. Ent. 8:44-68, 11 figs.

DRAKE, C. J. & HAMBLETON, E. J.

- 1938 - Brazilian Tingitoidea (Hemiptera) (Part. IV).
Arq. Inst. Biol. São Paulo, 9:51-57, 2 figs. ests. 9-10.

DRAKE, C. J. & POOR, M. E.

- 1938 - Los Tingitidae (Hemiptera) de la colección Carlos Berg.
Notas Mus. La Plata, 3, (Zool.) 10:103-109, 2 figs.
 1938 - Nine new American Tingitidae (Hem.).
Bull. Brookl. Ent. Soc. 33:28-34, 1 fig.
 1939 - Seven American Tingitidae (Hem.).
Bull. Brookl. Ent. Soc. 34:31-35.
 1939 - Some Tingitidae from the Republic of Argentina.
Physis, 17:95-98, 1 fig.
 1939 - Seven new South American Tingitidae (Hemiptera).
Rev. Ent. 10:525-530.

GIBSON, E. H.

- 1919 - The genera *Corythaica* Stal and *Dolichocysta* Champion (Tingidae).
Proc. Biol. Soc. Wash. 32:97-103.
- 1919 - The genus *Gargaphia* Stal (Tingidae-Heteroptera).
Trans. Amer. Ent. Soc. 45:185-200.

HORVÁTH, G.

- 1925 - Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-19 15-Tingitidae.
Ent. Tidskr. 46:219-220.

LIMA, A. da COSTA.

- 1922 - Nota sobre os insetos que atacam o algodoeiro no Brasil.
Chac. Quint. 25(2):110-112.

MONTE, O.

- 1937 - Tingitideos de Belo Horizonte.
Rodriguesia, Rio de Janeiro, 2:29-36, 15 figs.
- 1937 - Um percevejo das Solanaceas (*Corythaica planaris* Uhler).
Chac. Quint. 56:79-80, 1 fig.
- 1937 - As espécies do gênero *Nectocader* (Hemiptera-Tingitidae).
Rev. Chil. Hist. Nat. 41:111-115, 2 figs.
- 1938 - Novos Tingitideos. Nota prévia.
O Campo, 9(98)64, 3 figs.
- 1938 - Tingitideos neotrópicos.
Bol. Biol. São Paulo (n. s.) 3:127-132, 1 fig.
- 1938 - An undescribed *Gargaphia* from Venezuela.
Rev. Chil. Hist. Nat. 42:292-294, fig. 32.
- 1938 - Sobre Tingitideos de la Argentina.
An. Soc. Cient. Argent. 126:387-392, 1 fig.
- 1939 - Lista preliminar dos Tingitideos de Minas Gerais.
Rev. Soc. Bras. Agron. 2(1), 25 p. (separado).

PENNINGTON, M. S.

- 1919 - Descripción de un nuevo Hemiptero, *Leptobyrsa mendocina*.
Physis, 4:526-527.

Superfamília **REDUVIOIDEA**

297. **Caracteres e classificação.** - Constituem esta superfamília Hemipteros terrestres que apresentam, como caracteres principais e constantes, os seguintes: rostrum curto, aproximadamente do comprimento da cabeça, ou pouco mais longo, em repouso, porém, recurvado em gancho ou retilíneo e, neste caso, disposto paralelamente à superfície inferior da cabeça e dela mais ou menos afastado; pernas anteriores distintamente de tipo raptorial ou, pelo menos, com fêmures mais dilatados que nos outros pares; hemelitos sem cuneus; garras sem arólia; espécies predadoras ou hematófagas.

A superfamília Reduvioidea compreende seis famílias, caracterizadas na chave seguinte, em parte baseada na que foi apresentada por BLATCHLEY.

- | | |
|-------|---|
| 1 | Pronotum dividido em 3 lobos; cabeça apresentando forte constricção atrás dos olhos; hemelitos, excetuando as nervuras, completamente membranosos; terço apical das tfbias anteriores dilatado e comprimido; tarsos anteriores de 1 artículo, raptorais; tarsos médios e posteriores de 2 artículos. Comprimento não excedendo de 4 mm. Espécies terrestres, geralmente higrófilas; voam em enxame Enicocephalidae |
| 1' | Pronotum não dividido em 3 lobos. Com mais de 4 mm. de comprimento. Espécies terrestres, tanófilas (que habitam mato cerrado) 2 |
| 2(1') | 4º segmento das antenas muito espessado, clavado ou fusiforme; fêmures anteriores extremamente robustos, tfbias curtas e retrateis; corpo curto, robusto e asperamente esculpado Phymatidae |
| 2' | 4º segmento das antenas fino, nem clavado, nem fusiforme; fêmures anteriores não muito espessados; corpo de aspecto diferente. 3 |
| 3(2') | Pronotum sem sulco estridulatório; rostrum de 4 segmentos (o 1º muito curto, raramente de 3); cabeça sem sulco transversal 4 |
| 3' | Pronotum com sulco longitudinal entre os quadris anteriores com fina estriação (<i>sulco estridulatório</i>); ros- |

- trum de 3 segmentos, o 1º geralmente robusto e mais ou menos recurvado; cabeça geralmente com sulco transversal interocular ou postocular 5
- 4(3) Tarsos de 3 artículos **Nabidae**
- 4' Tarsos de 2 artículos **Joppeicidae**
- 5(3') Corpo e antenas lineares ou extremamente finos; ocelos ausentes; quadris anteriores muito alongados, atingindo ou excedendo o ápice da cabeça, respectivas cavidades coxais abertas para diante e para baixo; hemelitos, exceto as nervuras, membranosos, não divididos em corium e clavus **Ploiariidae**
- 5' Corpo e antenas de forma diferente; ocelos geralmente presentes; quadris anteriores não muito alongados, respectivas cavidades coxais abertas para baixo; hemelitos de aspecto normal, isto é, divididos em corium, clavus e membrana. **Reduviidae**

A pequena família **Joppeicidae** (= *Elasmodemidae*) pertence o gênero *Elasmodema* Stal, 1860, representado pela espécie brasileira *Elasmodema erichsoni* Stal, 1860.

Família ENICOCEPHALIDAE⁴⁴

(*Henicocephalidae*)

298. **Caracteres, etc.** - Esta família compreende espécies de alguns milímetros de comprimento, facilmente reconhecíveis pelo aspecto singular da cabeça, que é alongada, porreta e consideravelmente dilatada ou globosa na parte retro-ocular, onde se acham os ocelos (fig. 344). Antenas e rostrum de quatro segmentos, este muito curto e relativamente robusto, aquelas com o 1º, o 2º e o 3º segmentos seguidos de um segmento anelar.

Pronotum geralmente dividido, por duas constrições transversais, em tres lobos. Hemelitos, completamente membranosos, percorridos por nervuras distintas, longitudinais e algumas transversais.

⁴⁴ Gr. *enikos*, unica; *kephale*, cabeça.

Tíbias do par anterior distintamente alargados na parte apical (distal); tarsos anteriores de um art culo, com uma ou duas garras, dimero nas outras pernas.

A forma do rostrum e o aspecto das pernas anteriores indicam que estes insetos s o predadores. Alguns s o mirme-c filos.




Fig. 344 - Cabeça, pronotum e pernas anteriores de *Enicocephalus* sp. (Enicocephalidae) (muito aumentado) (Tirado da figura de *Enicocephalus concolor* Champion, 1898, in Biol. Centr. Amer. Hem. Het. 2, est. 10, fig. 1).

Tem se observado esp cies desta fam lia voando,   tarde, em grandes enxames, como o fazem certos dipteros das fam lias Chironomidae e Ceratopogonidae.

A fam lia Enicocephalidae compreende perto de 30 esp cies, distribuidas por todo o mundo, em tres g neros, dos quais apenas *Enicocephalus* Westwood, 1837 (= *Henicocephalus* Westw., Stal emend., 1864), possui represen-

tantes brasileiros (*E. rhyparus* (Stal, 1858); *E. spurculus* (Stal, 1850), ambos encontrados no Rio de Janeiro).

299. **Bibliografia.** - Alem do que se pode ler em trabalhos gerais, citados na parte "Sistemática" da bibliografia de Hemiptera (BLATCHLEY, CHAMPION, STAL e outros), consulte-se:

USINGER, R. L.

- 1932 - Miscellaneous studies in the Hencocephalidae (Hemiptera).
Pan-Pacific Ent. 8:145-156, 1 est.

Família **PHYMATIDAE**⁴⁵

(*Syrtides*; *Spissipedes*; *Macrocephalidae*)

300. **Caracteres.** - Hemípteros pequenos ou de tamanho médio, de forma irregular e corpo mais ou menos recortado, com o tegumento enrugado, granuloso, ou apresentando cristas ou espinhos aguçados. Bem característico, porém, é o aspecto das pernas anteriores destes insetos (v. figs.)

Cabeça pequena, porreta, provida de búculas bem desenvolvidas, que formam um profundo sulco rostral; antenas de quatro segmentos, com o último geralmente mais longo e mais grosso que os precedentes; ocelos presentes; rostrum curto, aparentemente de tres segmentos (o verdadeiro 1º segmento rudimentar), atingindo ou excedendo os quadris anteriores.

Torax - Pronotum transversal, geralmente recortado e com os bordos mais ou menos expandidos e obliquamente levantados; scutellum de tamanho normal (Phymatinae) ou extraordinariamente alongado, cobrindo a maior parte do abdome (Macrocephalinae).

Hemelitros com clavus distinto do corium e da membrana; esta multinervada, com as nervuras anastomosando-se e não raro formando um retículo de células.

⁴⁵ Gr. *phyma*, inchação.

Pernas anteriores de tipo raptorial (preensil) peculiar, com anca notavelmente saliente, femur extraordinariamente espessado e internamente sulcado, para receber a tibia em repouso; esta falciforme, formando com o femur uma forte pinça; tarso, ausente (Macrocephalinae) (fig. 348), ou muito




Fig. 345 - *Phymata* sp.); 1, processo preocelar; 2, ângulo anterior do pronotum; 3, processo lateral do pronotum; 4, crista longitudinal do pronotum; 5, conexivum; 6, processo frontal; 7, processo ocelar; 8, lóbo anterior do pronotum; 9, lóbo posterior do pronotum; 10, ângulo posterior do pronotum; 11, scutellum (cerca de X 11,5).

pequeno, de dois artículos (Phymatinae) (fig. 346), implantando-se na tibia um pouco antes do ápice; nas outras pernas, que são normais, os tarsos também são biarticulados.

Abdome com conexivum laminado, em geral consideravelmente saliente e anguloso na linha média-transversal.

301. **Hábitos, classificação e espécies mais interessantes.**
 - Os Phymatideos são insetos predadores, frequentemente encontrados em flores de Compostas. Nelas aguardam a chegada dos pequenos insetos que as visitam para capturá-los e sugar-lhes a hemolinfa.




Fig. 346 - *Phymata* sp.), perna anterior.



Fig. 347 - *Phymata fortificata* (Herrich-Schaeffer, 1844) (cerca de X 4). (Phymatinae)

Ha descritas nesta família cerca de 120 espécies, muitas das quais da América Meridional, distribuidas em duas sub-famílias, que se distinguem do modo seguinte:

- 1 Tarsos das pernas anteriores, conquanto muito pequenos, sempre presentes, em repouso escondidos num sulco no lado interno da tíbia; scutellum pequeno, triangular, visível entre os clavos dos 2 hemelitos **Phymatinae**
- 1' Pernas anteriores sem tarso; scutellum grande, prolongado até o ápice do abdomen, cobrindo os hemelitos em repouso e o abdomen em quasi toda a sua extensão. **Macrocephalinae**

Dentre as várias espécies encontradas no Brasil, menciono, como mais encontradiças:

Phymata erosa (L., 1758), com algumas de suas variedades;




Fig. 348 - *Macrocephalus* sp;
perna anterior.




Fig. 349 - *Macrocephalus notatus*
(Macrocephalinae) vê-se o escutelo
prolongado até o ápice do
abdomen (X 8).

Phymata acutangula (Guérin, 1857), que tem, como a anterior, uma vasta distribuição geográfica, estendendo-se de Flórida a República Argentina;

Phymata fortificata Herrich-Schäffer, 1844, de aspecto bem curioso (fig. 347);

Macrocephalus affinis Guérin, 1838 e

Macrocephalus notatus Westwood, 1843 (fig. 349).

302. Bibliografia.

DUDICH, E.

1922 - Die Phymatiden des Hungarischen National-Museum.
Ann. Mus. Nat. Hung. 19:161-181, 8 figs.

EVANS, J. H.

- 1931 - A preliminary revision of the ambush bugs of North America (Hemiptera, Phymatidae).
Ann. Ent. Soc. Amer. 24:711-736, 2 ests.

HANDLIRSCH.

- 1897 - Monographie der Phymatiden.
Ann. Naturh. Hofmus. 12:127-230, 6 ests. 35 figs.

JENSEN-HAARUP.

- 1922 - Hemipterological notes and descriptions II.
Ent. Medd. 4, 4(?)5, 1-16, 4 figs.

LIMA, A. da COSTA.

- 1935 - Notas hemipterológicas.
Rev. Ent., 5:23-25, 2 figs.

MELIN, D.

- 1931 - Hemiptera from South and Central America II.
(Contribution to a revision of the genus Phymata).
Ark. Zool. 22A(1), 40 p., figs, 7 ests.

PENNINGTON, M. S.

- 1919 - Notas sobre las especies argentinas del género Phymata Latr.
Physis, Buenos Aires, 4:523-526, 2 ests.

READIO, P. A.

- 1927 - Biological notes on Phymata erosa subsp, fasciata (Gray) (Phymatidae. Hemiptera).
Bull. Brookl. Ent. Soc. 22:256-262, 1 est.

STAL, C.

- 1876 - Enumeratio Phymatidarum, in Enumeratio Hemipterorum. 5:131-136.

WESTWOOD.

- 1841 - Observations upon the Hemipterous Insects composing the genus Syrtis of Fabricius, or the family Phymatites of Laporte, with a monograph of the genus Macrocephalus.
Trans. Ent. Soc. London, (1)3:18-31, 1 est.

Família **PLOIARIIDAE**⁴⁶*(Emesidae)*

303. **Caracteres.** - Hemípteros de tamanho variavel, de alguns milímetros a quasi tres centímetros de comprimento, bem caracterizados pelo aspecto geral do corpo, muito fino,




Fig. 350 - *Gardena* sp; (Ploiariidae) (pouco mais de 20 mm)

⁴⁶ Gr. *plouarion*, pequeno barco.

bacilar ou linear, como o dos Fasmídeos, providos de pernas médias e posteriores extremamente alongadas e filiformes e pernas anteriores relativamente curtas, raptórias, de tipo muito parecido com o que se observa nos Mantídeos (fig. 350).

Cabeça porreta, mais ou menos alongada, ora mais longa que a largura ao nível dos olhos, ora o inverso; geralmente dividida por uma sutura, de olho a olho, em dois




Fig. 351 - Cabeça e perna anterior do exemplar da figura 350.

lóbulo; sem ocelos; antenas de quatro segmentos, sendo o 1° e o 2° muito alongados; rostrum pouco mais longo que a cabeça (tipo predador), de tres segmentos (v. fig. 351).

Torax - Pronotum trapezoidal, mais ou menos alongado; scutellum pequeno, triangular; prosternum com sulco

estridulatório entre as ancas anteriores. Hemelítrios, quando presentes, de estrutura uniforme, membranáceos. Pernas anteriores raptórias (fig. 351), com as ancas muito alongadas, em posição normal dirigidas para diante, atingindo ou excedendo o ápice da cabeça; cavidades coxais anteriores abertas para diante e para baixo; fêmures também alongados, apresentando, em baixo numerosos dentículos ou cerdas espinhosas; igualmente armadas também se apresentam as tíbias deste par de pernas; as outras pernas são muito finas e alongadas, especialmente as do par posterior. Tarsos das pernas anteriores de um a tres artículos.




Fig. 352 - Ploiariídeo em postura (De Howes, 1918, Insect Behavior).

304. **Hábitos.** - Os Ploiariídeos são hemípteros terrestres, de hábitos predadores. Ha tempos observei formas jovens de uma pequena espécie (da qual não me foi possível obter formas adultas) que viviam sugando *Pinnaspis minor* (Mask.) (Homoptera-Coccoidea-Diaspididae).

Ha cerca de 160 espécies descritas, das quais muitas da região neotrópica.

305. **Bibliografia.**

BERGROTH, E.

- 1906 - Zur Kenntnis der Ploiariinae.
Ver. Zool.-bot. Ges. Wien. 56:305-324.
1922 - The american species of Ploiaria Reut.
Not. Ent. 2:49-51, 77-81.

DOHRN, A.

- 1860 - Beiträge zu einer monographischen Bearbeitung der Familie der Emesina.
Lin. Ent. 14:206-355, 1 est.
1863 - Idem, ibid. 15:42-76.

Mc ATEE, W. L. & MALLOCH, J. R.

- 1925 - Revision of the American bugs of the Reduviid sub-family Ploiariinae.
Proc. U. S. Nat. Mus. 67(1), 2.573, 135 p., 9 ests.

PIZA Jor., S. de TOLEDO.

- 1939 - Dois novos Ploiariideos do Brasil (Hemiptera).
Rev. Ent. 10:619-622, 8 figs.

Família **REDUVIIDAE**⁴⁷*(Nudirostri part.)*

306. **Caracteres, anatomia externa.** - Hemípteros de tamanho médio, de alguns milímetros a alguns centímetros de comprimento, cujo aspecto varia consideravelmente nos diferentes grupos que constituem a família.

Cabeça livre, estreitando-se em pescoço para trás e geralmente dividida em dois lóbulos separados por um sulco ou depressão transversa interocular.

⁴⁷ ? Lat. *reduviae*, despojos. Possivelmente Fabricius aplicou para o género típico destes insetos o nome *Reduvius*, porque eles vivem de presas, de despojos. Pode-se também admitir que esta designação derive de *reduvia* (pequena úlcera na raiz da unha), pela presença da fosseta, em forma de úlcera, no ápice das tíbias anteriores.

Rostrum mais ou menos robusto, representado por um lábio de tres segmentos, geralmente recurvado em gancho, de modo a formar, com o perfil inferior da cabeça, um ângulo curvilíneo. (fig. 221), às vezes, porem, reto e, em repouso, encostado à face inferior da cabeça ou dela pouco afastado (fig. 222).




Fig. 353 - *Linshcosteus carnifex* Distant, 1904 (Triatominae) (De C. Pinto, 1931, fig. 70).

Excetuando *Linshcosteus* Distant, 1904 (Triatomineo da Índia, cujo rostrum não chega à base da cabeça) e *Cavernicola* Barber, 1937 (fig. 353), a ponta do rostrum, em re-




Fig. 354 - Parte anterior e inferior do protorax de um Ectricodiíneo, para se ver o sulco estridulatório, indicado pela ponta do rostrum.

pouso, nos demais Reduviídeos, atinge sempre um sulco prosternal, transversalmente estriado, chamado *sulco estridulatório* pela maioria dos autores (fig. 354). Tal sulco é, sem dúvida, o caracter mais importante de Reduviidae, pois,

na superfamília Reduivoidea, só se o encontra também em Ploiariidae e Phymatidae, insetos, aliás, facilmente reconhecíveis pelo aspecto característico do corpo e, sobretudo, das pernas anteriores.

Antenas, geralmente, de quatro segmentos, às vezes, porém, com maior número, quando um ou dois desses segmentos se apresentam subdivididos em dois ou mais subsegmentos (Microtominae).




Fig. 355 - Perna anterior de Piratinae, vendo-se, no ápice da tíbia, a fossula esponjosa.

Ocelos ausentes em Saicinae, Tribelocephalinae, Chryxinae e Vesciinae; presentes nas demais subfamílias. Todavia, em fêmeas apteras de algumas espécies das outras subfamílias, especialmente em Ectrichodiinae, Piratinae e Reduviinae, ou os ocelos se apresentam mais ou menos atrofiados, ou mesmo não ha ocelos.

Torax. - Protorax trapezoidal, na maioria das espécies dividido por estrangulamento transversal em dois lobos, anterior, mais estreito, e posterior. Nas espécies de *Noto-cyrtus* Burmeister, 1835, apresenta-se consideravelmente dilatado, como que insuflado, e em *Arilus* Hahn, 1831,

ornado de uma crista vertical, semicircular e serrada. Scutellum pequeno, triangular.

Pernas, em geral, pouco diferenciadas, do tipo ambulatório; as anteriores, entretanto, na maioria das espécies, apresentam os fêmures consideravelmente dilatados e não raro com estes e, às vezes, também, as tíbias, armados de dentes ou espinhos em baixo.




Fig. 356 - Tíbia anterior de *Spiniger ochripennis* Stal., 1854, com longa fosseta esponjosa.

Devido a este aspecto, são consideradas de tipo preen-sil, apesar de não se apresentarem completamente diferenciadas em verdadeiras pernas raptorais, como as que se encontram nas espécies de Ploiariidae, as quais se caracterizam, principalmente, pelo extraordinário, alongamento dos quadris anteriores.

Todavia em Bactrodinae os quadris anteriores são quasi tão alongados como em Ploiariidae, porem, nesses Reduviídeos ha ocelos, que se não encontram nas espécies desta família.

Em muitos Reduviídeos as tíbias anteriores, e não raro as médias, apresentam, no lado interno da parte distal, uma espécie de sola oval, mais ou menos côncava e alongada, chamada *fossa*, *fóssula* ou *fosseta esponjosa* (figs. 355 e 356).

Tarsos geralmente trímeros, excepcionalmente dímeros (*Aradomorpha*); garras tarsais apicais. Ostíolos vestigiais ou ausentes.

Hemelitros geralmente com corium, clavus e membrana bem desenvolvidos; esta com as nervuras anastomosando-se e formando duas ou tres grandes células alongadas (*células discoidais*) (fig. 357).

Em algumas espécies os hemelitros e as asas são mais ou menos atrofiados em ambos os sexos ou somente nas fêmeas. Neste caso, as fêmeas se apresentam geralmente fisogástricas e bem diferentes dos machos (Reduviinae, Ectrichodiinae e Piratinae).




Fig. 357- Asa de *Panstrongylus megistus* (Burmeister, 1835) (Triatominae)

Como disse ha pouco, tal diferença compreende tambem os ocelos, que se atrofiam consideravelmente, a ponto de desaparecerem por completo. Vê-se isto muito bem em fêmeas de alguns dos nossos Ectrichodiíneos e Piratíneos.

Em espécies de outras regiões, alem de machos alados, ha machos teleomorfos, apteros, semelhantes às fêmeas apteras, extremamente diferentes, portanto, dos machos normais.

Abdome com connexivum, mais ou menos saliente.

307. **Mimetismo.** - Alguns dos nossos Reduviídeos mimetizam Himenopteros da superfamília Ichneumonoidea (espécies de *Hiranetis* Spinola, 1837 e de *Graptocleptes* Stal, 1866), ou vespas caçadoras do gênero *Pepsis* (algumas espécies de *Spiniger* Burm., 1835).

As espécies miméticas de *Spiniger*, encontradas em todo o Brasil, ainda mais se parecem com tais vespas, quando pousam, pois movem então as asas exatamente como aqueles Himenopteros (v. SEITZ, 1890).

308. **Hábitos e importância econômica.** - Os Reduviídeos vivem da hemolinfa de outros insetos (espécies predadoras) ou do sangue de aves e mamíferos (espécies hematófagas).




Fig. 358 - Ovo de *Melanolestes picipes* (Herrich-Schaeffer, 1848) (Piratinae); à esquerda visto de lado e consideravelmente aumentado; a direita, visto de cima, aqui ainda mais aumentado que na figura anterior. (De Readio, 1926, est. 9).

Os primeiros, que podem desempenhar papel saliente no combate aos insetos-pragas, ao atacarem uma vítima qualquer, prendem-na com as pernas anteriores e, rapidamente, cravam-lhe no corpo o rostrum. Neste ato inoculam uma saliva de ação paralizante tão violenta, que, imediatamente, determina a imobilização completa da vítima, a qual,

então, fica presa apenas pelo rostrum ao predador. Às vezes, este, para saciar o apetite, introduz o rostrum noutra parte do corpo da vítima.

Relativamente às posturas destes insetos (figs. 358-361), como bem diz READIO (1926), variam consideravelmente. Em geral, os ovos são encontrados nos lugares em que são



Fig. 359 - Reduviideo em postura (De Howes, 1918. Insect behaviour)

vistos os adultos. E se muitas espécies põem-nos em grupos ou massas compactas, de tres a mais de 150 ovos (espécies de *Arilus*), colados às partes epígeas das plantas ou à pedras, não poucas são as que os põem, um a um, isoladamente, ora soltos (espécies de *Reduvius* e da subfam. Triatominae), ora colados a um suporte (espécies de *Melanolestes* e de *Pselliopus*).

A forma dos ovos é também um tanto variável; em geral, porém, são cilíndricos ou em ovoide alongado e sem-

pre operculados. O opérculo, simples em muitas espécies, apresenta-se em algumas com ornamentação mais ou menos conspícua. Esta e a da zona do corium que circunda o opérculo dão ao ovo aspecto singular, às vezes, bastante curioso (v. figs. 358, 360, 361 e 398).

Alguns Reduviídeos predadores, como por exemplo, *Heza insignis*, *Melanolestes picipes*, *Zelus leucogrammus*, etc., quando presos entre os dedos sem o devido cuidado, podem fincar rápida e profundamente o rostrum na polpa, numa picada tão dolorosa como a ferroadada de um "marimbondo" (*Polistes*), ficando a parte lesada mais ou menos dorida durante alguns dias.




Fig. 360 - Ovos de um Reduviídeo americano, de espécie ignota; nove ainda se acham fechados e os cinco restantes, marcados pelas linhas pontilhadas, completa ou incompletamente abertos (De Berlese, Gli Insetti, 1914, fig.,192, segundo Sharp).

Quanto aos Reduviídeos hematófagos, além do dano que causam diretamente aos animais atacados, pela sucção do sangue, podem também, como sóe dar-se com certas espécies de Triatominae, transmitir o *Schizotrypanum cruzi* (Chagas, 1909), agente etiológico da "doença de Chagas" ou tripanosomose americana.

309. **Classificação.** - A família Reduviidae, incontestavelmente o ramo mais importante da superfamília Redu-

vioidea, compreende cerca de 3.200 espécies, em sua maioria habitantes da região neotrópica.

As espécies de Reduviidae podem ser distribuídas em 17 subfamílias, das quais, duas apenas, Holoptilinae e Tribelocephalinae, constituídas por espécies das regiões indo-australiana e etiópica, não têm representantes na região neotrópica. A subfamília Chryxinae é exclusivamente representada por uma espécie do Panamá. As subfamílias restantes, porém, têm vários ou muitos representantes na região neotrópica e especialmente em nosso território.




Fig. 361 - Ruptura e saída da forma joven dos ovos apresentados na figura anterior (De Berlese, loc. cit., fig., 193, segundo Sharp).

São elas as seguintes: **Bactrodinae**, **Saicinae**, **Stenopodinae**, **Triatominae**, **Sphaeridopinae**, **Reduviinae**, **Cetherinae**, **Salyavatinae**, **Vesciinae**, **Piratinae**, **Ectrichodiinae**, **Microtominae**, **Apiomerinae** e **Zelinae**.

É fácil distinguí-las mediante a seguinte chave:

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | Ocelos ausentes em ambos os sexos | 2 |
| 1' | Ocelos presentes em ambos os sexos, ou fêmeas com ocelos rudimentares ou sem ocelos; neste caso, porém, tais fêmeas são braquípteras ou ápteras e geralmente fiso-gástricas | 4 |

- 2(1) Corpo relativamente estreito, piloso ou seríceo; 1º segmento antenal muito mais longo que a cabeça; pernas, principalmente as médias e posteriores, muito finas, alongadas e pilosas; 1º artículo tarsal geralmente mais longo que o 2º (em *Oncerothelus* Stal, 1868, tão longo quanto o 2º); corium e membrana com a mesma estrutura **Saicinae**
- 2' Corpo e pernas de aspecto normal; 1º segmento antenal mais curto que a cabeça; 1º artículo tarsal geralmente mais curto que o 2º; corium e membrana normais, isto é, de estrutura diferente 3
- 3(2') Pronotum com a constrição interlobular adiante do meio; tíbias do par anterior normais **Chryxinae**
- 3' Pronotum com a constrição interlobular, como em *Piratinæ*, isto é, situada atrás do meio; tíbias do par anterior curvadas para dentro ou para trás no ápice e com uma parte saliente além da inserção tarsal. **Vesciinae**
- 4(1') Corpo estreito, fino; quadris anteriores consideravelmente alongados, porém não atingindo o ápice da cabeça
..... **Bactrodinae**
- 4' Outro aspecto 5
- 5(4') Scutellum bifido ou trifido no ápice 6
- 5' Scutellum com uma só ponta no ápice 7
- 6(5) 2º segmento antenal subdividido em 7 ou mais segmentos; ocelos sempre presentes, situados pouco atrás de uma linha imaginária passando pelo meio dos olhos
..... **Microtominae**
- 6' 2º segmento antenal simples; ocelos geralmente situados atrás de uma linha imaginária tangenciando o bordo posterior dos olhos; ausentes nas fêmeas ápteras
..... **Ectrichodiinae**
- 7(5') Cabeça transversal, isto é, mais larga que longa (largura tomada ao nível dos olhos); olhos mui salientes, quasi pedunculados **Cetherinae**
- 7' Cabeça geralmente mais longa que larga; olhos não pedunculados 8
- 8(7') Tarsos anteriores de 2 artículos, médios e posteriores de 3; segmentos abdominais com espinho mais ou menos alongado nos ângulos postlaterais **Salyavatinae**
- 8' Todos os tarsos com o mesmo número de artículos 9

- 9(8') Cabeça bruscamente terminando adiante dos olhos, não apresentando, pois, uma parte anteocular, mais ou menos alongada; tubérculos anteníferos mais ou menos salientes alem do bordo anterior dos olhos
..... **Sphaeridopinae**
- 9' Cabeça mais ou menos prolongada adiante dos olhos 10
- 10(9') Constrição interlobular do pronotum mais próxima da base que do ápice; quadris das pernas anteriores relativamente robustos, mais alongados que os das outras pernas e com a face externa plana ou ligeiramente côncava; tíbias anteriores não raro dilatando-se consideravelmente para o ápice e apresentando larga fossa esponjosa **Piratinae**
- 10' Constrição interlobular do pronotum geralmente mais próxima do ápice que da base, às vezes no meio ou indistinta; quadris das pernas anteriores semelhantes aos das outras pernas; tíbias anteriores, na maioria das espécies, não dilatadas, ou pouco dilatadas no ápice, com fossa esponjosa mais ou menos alongada ou sem fossa esponjosa 11
- 11 (10') Membrana com grande célula, via de regra pentagonal ou hexagonal, perto do ângulo basal interno, imediatamente diante das duas grandes células, às vezes indistintamente separada da célula menor, interna; antenas, em geral, muito curtas e geniculadas na articulação do 2º com o 1º segmento; este mais ou menos espessado e porreto, os demais segmentos antenais muito finos
..... **Stenopodinae**
- 11' Membrana sem aquela célula, imediatamente adiante das grandes células pode haver uma auréola ou célula pequena, geralmente quadrangular, situada, porem, no corium e não na membrana 12
- 12(11') Ocelos geralmente situados para fora de 2 paralelas imaginárias tangenciando o bordo interno dos olhos; tíbias anterior e média apresentando, no ápice, um sulco ou fovéola para receber o tarso, que é retrátil e, relativamente, muito pequeno; pernas, em geral, densamente pilosas; garras tarsais simples **Apiomerinae**
- 12' Outros caracteres 13

- 13(12') 1º segmento antenal geralmente muito mais longo que a cabeça; garras tarsais, em geral, denticuladas ou apendiculadas **Zelinae**
- 13' 1º segmento antenal mais curto que a cabeça; garras tarsais simples 14
- 14(13') Cabeça com impressão transversa ou constrição anular atrás dos olhos; rostrum, na maioria das espécies, mais ou menos incurvado **Reduviinae**
- 14' Cabeça sem impressão transversa ou constrição atrás dos olhos; rostrum sempre reto **Triatominae**




Fig. 262 - *Saica* sp, cabeça e torax (cerca de X 22) (Saicinae)

Subfamília **BACTRODINAE**⁴⁸

310. **Caracteres, etc.** - Pequena subfamília constituída por espécies cujo aspecto lembra o dos Ploiariídeos, destes, porém, se distinguindo facilmente por terem ocelos e os quadris anteriores menos alongados.

As espécies mais comuns pertencem ao gênero *Bactrodes* Stal, 1858, aliás criado para uma espécie do Rio de Janeiro - *B.biannulatus* Stal, 1858.

⁴⁸ Gr. *baktron*, bastão.

Subfamília SAICINAE⁴⁹

311. **Caracteres, etc.** - Pequena subfamília representada por vários gêneros com representantes no Brasil.

As espécies de *Saica* Amyot & Serville, 1843 (fig. 362), as mais comumente encontradas no Brasil, são facilmente reconhecíveis por terem os fêmures e principalmente as tíbias anteriores incurvadas, pernas médias e posteriores muito alongadas e torax armado de espinhos (dois pronotais, assestados pouco adiante dos ângulos posteriores do pronotum e um ou mais escutelares).

As espécies desta subfamília, como os Ploiariídeos, não possuem ocelos, porem os quadris anteriores são muito menos desenvolvidos que naqueles insetos.

Subfamília STENOPODINAE⁵⁰

312. **Caracteres, etc.** - As espécies que formam esta subfamília (cerca de 50, distribuidas em 17 gêneros), são, em geral, de corpo estreito, lados subparalelos e cor parda acinzentada (cor de terra); têm a cabeça e o 1º segmento das antenas porretos, aquela com a região antecular tão ou bem mais longa que a postocular e estas, em geral, curtas, com o segmento basal formando joelho com os demais segmentos.

Das várias espécies encontradas no Brasil, nenhuma - que eu saiba - tem importância, sob o ponto de vista econômico.

Devo, porem, mencionar especialmente uma espécie, estudada por CEZAR PINTO (1927), ao meu ver pertencente a esta subfamília, cujo aspecto difere consideravelmente do geralmente observado nos demais Stenopodíneos, lembrando, até certo ponto, Reduviídeos de outras subfamílias.

⁴⁹ Árabe, *shaïca*, espinhoso.

⁵⁰ Gr. *stenos*, fino; *pous*, pé.

Quero referir-me a *Otiodyctylus signatus* Pinto, 1927, tipo do gênero *Otiodyctylus* Pinto, 1927⁵¹, Stenopodineo tanto mais interessante, porque a célula discoidal do corium (célula pentagonal), tão característica destes insetos, não



Fig. 363 - *Stenopoda cinerea* Laporte, 1832 (Stenopodinae) (X 2).

apresenta nervura distal ou apical distinta que a feche, confundindo-se, portanto, com a que lhe fica adjacente na membrana.

Para um estudo minucioso dos Stenopodinae do Brasil é indispensável recorrer-se ao trabalho de BARBER (1930).




Fig. 364 - Asa de *Stenopoda cinerea*, vendo-se, indicada pela seta, a célula pentagonal.

⁵¹ *Kodormus* Barber, 1930 é seguramente idêntico a *Otiodyctylus* Pinto, 1927, e a respectiva espécie tipo *K. bruneosus* Barber, 1930, do Panamá, parece ser também idêntica a *O. signatus* Pinto.

Subfamília TRIATOMINAE⁵²(Conorhiniidae⁵³; Triatomidae; Triatomini)

313. **Caracteres, etc.** - Compreende esta subfamília insetos conhecidos no Brasil sob várias designações vulgares. Em Minas Gerais, Goiás e outros Estados são geralmente denominados "barbeiros".



Fig. 365 - *Otiodactylus signatus* Pinto, 1927 (X 2) (Stenopodinae).

Trata-se de um grupo de real importância econômica, pois, das espécies que o formam, aquelas cujos hábitos são conhecidos, como normalmente sugam sangue do homem ou de outros animais (mamíferos e aves), podem transportar germes de doenças, os quais, não raro, passam parte do ciclo evolutivo no corpo do inseto transmissor.

Em rigor esta subfamília e as duas que se seguem não deveriam ser separadas de Reduviinae, seguindo-se, assim,

⁵² Gr. *tria*, tres; *tome*, secção.

⁵³ Gr. *konos*, cone; *rin*, nariz, tromba.

o critério de JEANNEL (1919), talvez o mais acertado, de considerar Reduviinae constituída pelas tribus Reduviini, Cetherini e Triatomini às quais associaria *Sphaeridopini*.



Fig. 366 - Cabana de paredes de barro ordinário, cheias de frestas, onde se desenvolvem os "barbeiros" (De Pinto, 1930, "Arthropodos parasitos", etc., fig. 62).

Exagera-se, pois, ao meu ver, a importância taxionômica deste grupo de Hemípteros, quando se o eleva à categoria de família.

O carater que se apresenta como mais importante para diferenciar Triatominae de Reduviinae é o aspecto do rostrum: reto naquela subfamília e curvo nesta.

A prevalecer, porem, tal critério para a criação de novas famílias, retirando-as de Reduviidae, os gêneros *Lophcephala* Laporte, 1932, da índia e Madagascar e *Phonolibes* Stal, 1854, da África, com espécies de rostrum relativamente fino e reto, deveriam formar grupo à parte dos demais Harpactorini (subfamília Harpactorinae), cujas espécies, como se sabe, apresentam rostrum espesso e curvo-



Fig. 367 - Ovos de *Triatoma megista* (Burmeister, 1835) (Triatominae); A, exemplares de cor pérola, recentemente postos; B, exemplares róseos, indicando que as larvas estão prestes a sair (De Pinto, 1930, "Arthropodos parasitos", etc., fig. 38).

Ora, que me conste, ninguém até agora achou vantajosa a separação desses gêneros, sequer em tribu à parte. E o que se faria, então, como as espécies de *Aradomorpha*, com caracteres de Reduviinae, porem possuidores de um rostrum reto e de tarsos biarticulados?

O fato dos Triatomineos pôem ovos isoladamente, em posturas parceladas e não aglutinados uns aos outros, presos a uma superfície suporte, como se observa na maioria dos Reduvidos, não é característico daqueles Hemípteros, porque, não somente alguns os põem isoladamente, colando-os, porem, a uma superfície suporte, como *Melanolestes picipes* (Herrich-Schaffer, 1848), *Pselliopus cintus* (Fabricius, 1777) e mesmo em Triatomineos do gênero *Rhodnius*, como ha

outros, cujos ovos e posturas são exatamente idênticos aos das espécies de *Triatoma*. E é interessante consignar que




Fig 368 - Formas jovens de *Triatoma infestans*, primeiro e último estágio (ninha) (X 7).

isto se verifica com *Reduvius personatus* (L., 1758), precisamente a espécie tipo da família Reduviidae.

Eis o que diz READIO (1926) sobre os ovos de *Reduvius personatus* e de duas espécies de *Triatoma*, *T. sanguisuga* (Le Conte, 1855) e *T. protracta* (Uhler, 1894):

"The eggs of these three species are similar and differ from the eggs in other subfamilies in lacking the usual ornamentation of the top of the egg and of the cap. In fact, they are the simplest of the reduviid eggs studied".

O hematofagismo obrigatório é, sem dúvida, um bom caráter para a distinção etológica de Triatominae dos demais Reduviídeos, cujas espécies são exclusivamente predadoras. Todavia, como a hematofagia normal destes insetos provavelmente evoluiu do predatismo, ainda observado em espécies que lhes são afins, sugadoras da hemolinfa de outros insetos, compreender-se-á porque, na minha opinião, tal caráter etológico, mesmo ligado a modificações para o lado do aparelho digestivo (v. ELSON, 1937), por si só, é insuficiente para justificar a criação de uma família diferente de Reduviidae.

Aliás os Triatomíneos eventualmente podem exercer o canibalismo, conforme observação de A. MACHADO com o *Panstrongylus megistus* (*apud* NEIVA, 1914).

A propósito BRUMPT (Précis de Parasitologie), diz o seguinte:

"Ces Hémiptères sont hémato-phages, mais un certain nombre d'espèces, poussées par la faim, peuvent être prédatrices et se nourrir de Punaises des lits, de certain Insectes ou encore être Cannibales. Ce cannibalisme est évidemment un souvenir ancestral de l'entomophagie normal chez les Réduvidés non suceurs de sang".

Convém lembrar que, mesmo em Hemíptera, ha famílias constituídas por espécies fitófagas e predadoras (Pentatomidae, Lygaeidae) cujo rostrum pode apresentar modificações estruturais notáveis, de acordo com o regime alimentar do inseto.

Em Lygacidae, por exemplo, se as espécies, em sua maioria, são fitófagas, ha as da subfamília Rhyparochrominae que são predadoras e até mesmo *Clerada apicicornis* Signoret, que suga sangue como qualquer "barbeiro" (v. a citação desta espécie na secção 278).

Ademais, a se reunir *Triatoma* e gêneros afins em família distinta de Reduviidae, seria imperioso elevar também, à categoria de família, Reduviinae e demais subfamílias, que constituem atualmente Reduviidae (Steph., 1829) Saund., 1875.




Fig. 369 - Cabeça de *Panstrongylus*
(vista de cima).




Fig. 370 - Cabeça de *Panstrongylus*
(vista de perfil).

Isso importaria, obrigatoriamente, na promoção das famílias que formam Reduvidae (Enicocephalidae, Phymatidae, Reduviidae, etc.) à categoria de superfamílias. Consequentemente, Reduvidae passaria a ser considerada subordem e as demais subordens Gymnocerata (*Geocorizae*) e Cryptocerata (*Hydrocorizae*), transformar-se-iam, naturalmente, em ordens, equivalentes, portanto, a Orthoptera,

Coleoptera, Lepidoptera, etc., desaparecendo assim a ordem Hemíptera.

314. **Hábitos e importância econômica.** - Nas linhas que se seguem transcrevo o que sobre a biologia destes insetos escreveram NEIVA (1914) e PINTO (1930), especialistas neste grupo de Hemípteros:

"Reunindo tudo quanto ha, pode-se sem dúvida concluir que as espécies de *Triatoma* são hematófagas obrigadas; a alimentação sanguínea procede de qualquer mamífero mesmo de morcegos, conforme nos informaram; alguns observadores têm verificado a *T. rubrofasciata* sugando percevejos (*Acanthia lectularia*) e, mais de uma vez, temos ouvido idêntica acusação para algumas espécies brasileiras que frequentam os domicílios, sem contudo termos observação pessoal a respeito. Algumas espécies podem exercer o canibalismo conforme a observação do A. Machado com a *T. megista*.

Sem o repasto sanguíneo não se dá a evolução, isto é, as larvas, quando muito, farão apenas uma mudança de pele. Nos estádios mais atrasados as refeições se amiam; também o tempo de sucção é menor; as ninfas e adultos, levam longo tempo sem se alimentar, contudo, podem sugar durante 10-20.

Em qualquer estágio, a resistência ao jejum é muito grande e basta lembrar a observação feita por Laboulbene de uma exemplar de *T. infestans* o qual, durante 7 meses, não se alimentava.

Em regra, as triatomas sugam durante a noite: mas em lugares escuros podem alimentar-se durante o dia, sendo que, quando acoçadas pela fome, procuram a presa a qualquer hora. A picada é muito pouco dolorosa e perfeitamente suportável, provocando comichão local e algumas vezes empoamento; a quem dorme profundamente, a picada é incapaz de acordar; não ha parte de predileção para ser atacada e o fato das mão e rosto serem as preferidas, não indica qualquer tropismo, são as partes que durante o sono permanecem descobertas e por isso de mais facil acesso.

Logo depois de picar, a triatoma dejecta: as dejeções são líquidas e são de duas qualidades; uma é líquido amarelo que rapidamente seca ao contato do ar; a outra de dessecação mais lenta, é uma substância negra. Lafont, Boname e De

Sorny que estudaram a composição química das dejeções na *T. rubrofasciata* acharam o seguinte resultado nas análises que procederam:

Dejeção amarela	Reação ácida
Água	12,72
Uréa	3,04
Urato de soda	41,73
Azoto combinado	7,53
Matérias indeterminadas	34,98
	<hr/>
	100,00

As dejeções negras têm reação neutra, não apresentam ácido úrico e deixam resíduo ferruginoso. As matérias mine-rais fornecem a seguinte composição:

Clorureto de sódio	47,36
Sesquióxido de ferro	42,10
Cal, ácido fosfórico, enxofre e indeter- minados	10,54
	<hr/>
	100,00

É muito importante o papel das fezes na transmissão dos tripanosomas pois, segundo experiências realizadas por Brumpt e por nós, conseguimos verificar a transmissão do *Trypanosoma cruzi* e *equinum* pelas fezes das *T. megista infestans* e *sordida* através da conjuntiva sã de cobaia e mu-cosa nasal de camandongos.

Aliás estamos convencidos de que a moléstia de Chagas, em regra, se transmite não pela picada, a qual só por exceção será infetante, mas por intermédio das dejeções, quando estas entram em contato com as mucosas ou através da própria pele, penetrando o tripanosoma pelas escoriações ocasionadas pelas unhas nas proximidades do lugar da picada, acarretando as dejeções contaminadas e entrando em contato com as soluções de continuidade da pele.

Tres a cinco dias depois de nascidas, começam as larvas a sugar; antes de picar, porem, secretam um líquido incolor de reação alcalina o qual com o crescimento do inseto vai adquirindo cheiro acre, sensível à distância nas ninfas e adultos.

A cópula prolonga-se por muito tempo e um macho pode copular várias vezes, porem não no mesmo dia; a cópula pode verificar-se entre exemplares de espécies diferentes e em laboratório; obtivemos que *T. megista*, *sordida* e *infestans* copulassem entre si; todavia nenhum fenômeno de hibridismo foi observado como consequência.

A fêmea é copulada um a só vez, acontece porem às vezes, observar-se outra cópula de pequena duração. Uma vez fecundada, começa a postura em alguns casos 20 dias após a cópula como conseguimos verificar com a *T. sordida*; nas nossas verificações com esta e outras espécies, representa este tempo um espaço muito curto; comumente, porem, antes dos 30 dias após a cópula, começam as posturas.

Fêmea não fecundada pode desovar, mas, alem dos ovos serem estéreis, a postura começa tardiamente e nunca é tão numerosa.

As posturas são sempre parceladas, podendo constar de 1-45 ovos e o número depende da espécie, assim como, o total de ovos; na *T. megista*, por exemplo, podem-se observar mais de quarenta posturas com o total acima de 220 ovos; segundo Lafont a *T. rubrofasciata* põe no máximo 182 ovos; a *T. infestans* nas nossas observações, pode atingir o total de 163 ovos; certamente este número será ultrapassado porquanto temos a impressão de ser exíguo, contudo, foi este o resultado que obtivemos com o exemplar que forneceu 26 posturas.

Os ovos são postos a granel em qualquer lugar; todavia observamos certa vez a *T. megista* desovar sobre folhas verdes dum arbusto colocado no interior de um caixão, onde existiam muitos exemplares desta espécie; nesta ocasião observávamos que os ovos se encontraram aglutinados, como é de regra, para os representantes da família. Logo depois de postos, são os ovos de colorido branco; rapidamente porem, em contato com o ar, pela ação das oxidases vão amarelecendo. Com o desenvolvimento do embrião, o colorido vai começando a ficar róseo e a intensidade cresce até ao rubro, sinal da proximidade da eclosão, a qual se realiza pelo polo opercular. Heidemann tem sobre a estrutura dos ovos de hemipteros, importante trabalho, onde o autor tambem se ocupa da *T. sanguisuga* podendo a sua observação a respeito desta espécie, se generalizar a todo o gênero como temos verificado em várias espécies por nós estudadas.

A eclosão ou desalagamento, varia com a temperatura e espécie; Lafont verificou que em alguns casos, os ovos da

T. rubrofasciata podem desalagar de 8-10 dias; nós trabalhámos também com esta espécie sem contudo observar tão rápida evolução; o mínimo que verificámos foi de 16 dias com a *T. infestans*. A larva sai do ovo completamente rósea em todas as espécies; aos poucos vai escurecendo e este fenômeno se repete toda a vez que se verifica as mudanças de pele que são em número de cinco; a imago ao sair do estojo ninfal é completamente rósea levando aproximadamente cerca de 24 horas até adquirir o colorido definitivo; sendo que a coloração do torax, principalmente nos lados e porção anterior, leva dias até atingir a cor verdadeira. O desconhecimento deste fato tem dado origem a erros com a criação de espécies novas, como aconteceu com a *T. rubroniger* Stal e *T. porrigens* Walker.

O ciclo completo de ovo a imago é aproximado em rodas as espécies; as nossas observações registam o mínimo de 210 dias para a espécie que nas nossas experiências se desenvolveu mais rapidamente: a *T. rubrofasciata*; a que levou mais tempo exijiu 260 dias; referimo-nos à *T. megista*; as *T. sordida* e *infestans* ocupam posição intermediária.

Estes dados são obtidos em laboratório onde as condições são ótimas; nas condições naturais, porem, acreditamos que o desenvolvimento se efetue mais ou menos no espaço de nove meses; no Brasil os adultos de todas as espécies começam a aparecer em setembro; aos poucos, o número vai aumentando e em janeiro, ao se examinar uma casa infestada por triatomas, só por exceção se encontrarão larvas; os exemplares presentes estão no 2º estágio ninfal ou então adultos; para os meados do ano as condições variam predominando os estádios larvais, enquanto os adultos vão rareando; todavia, em localidades favoráveis ao desenvolvimento das triatomas e onde elas pululam, é possível encontrar-se adultos em qualquer mês embora em número escasso.

Devido às condições climáticas, nos Estados Unidos a *T. sanguisuga* aparece em maior abundância nos meses de abril e maio; apesar disto, a evolução se faz mais ou menos do mesmo modo já observado nas espécies tropicais. O ovo leva a evolover cerca de 20 dias; segundo Bertha Kimball, a *T. sanguisuga* é insetívora alimentando-se nas suas experiências com moscas e afirmando que ataca os percevejos. A biologia das triatomas norte-americanas é ainda muito mal conhecida e o próprio Marlatt, ainda dá crédito à crença vulgarizada por Burmeister a respeito dos primeiros estádios da *T. megista*, quando afirmava que somente quando adulto,

era a *T. megista* hematófaga. Esta afirmação levou Riley e Walsh a estender a verificação de Burmeister para a *T. sanguisuya*, a qual, para eles, nos estádios larvais e ninfais sugam "the juices of the insects". Nós nunca obtivemos durante a nossa permanência nos Estados Unidos um único exemplar vivo de espécie norte-americana, contudo, pelo conhecimento da biologia do gênero *Triatoma*, podemos asseverar que, sem nenhuma exceção, as espécies deste gênero são hematófagas em todos as estádios.

O número de espécies domésticas já é muito grande; algumas são estritamente caseiras como as *T. megista*, *sordida*, *sanguisuga*, *infestans*, *rubrofasciata*, *maculata*, *rubrovaria*; certamente este fato constitui adaptação relativamente recente, pois se deu depois do descobrimento da América, excetuando a *T. rubrovaria* que, com toda a probabilidade, tem a sua origem na Índia. Os reiterados esforços efetuados com o fim de encontrarmos exemplares do *T. megista* fora de casa, têm sido até hoje infrutíferos; muita gente afirma ter encontrado a espécie em questão sobre árvores, distante das moradas, mas todos os exemplares apanhados nestas circunstâncias e que nos têm sido entregues, são representantes dos gêneros *Apiomerus*, *Ectrichodia*, *Pachylis*, *Hammatocerus*, etc. Fato análogo foi registrado por Lafont com a *T. rubrofasciata*, em Maurícia. Até hoje as palhoças dos índios não são frequentadas pela *T. megista* e a este respeito ha observações recentes efetuadas pelo Dr. Murillo de Campos, de modo que esta espécie se adaptou ao domicílio depois do descobrimento do Brasil. Da *T. brasiliensis*, hoje hóspede assídua dos domicílios dos Estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Baía, podemos descobrir a habitação de onde se difundiu para os domicílios; o *habitat* primitivo desta espécie são as locas do macó (*Ceredon rutpestris*, Wied) onde atualmente ainda se encontra em grande profusão. A espécie norte-americana *T. neotomae* até hoje só foi encontrada no ninho de um roedor o *Neotoma micropus* Baird. Espécie que aos poucos vai invadindo as casas e é a *T. geniculata*, cujo *habitat*, segundo as verificações de Chagas, são as tocas do tatú (*Dasyopus novemcinctus*, L.). Algumas espécies como *T. protracta* Uhler, embora já por vezes encontradas no interior das habitações humanas, não parecem ser ainda estritamente domésticas.

Quando nos referimos a domicílios, compreendemos as dependências frequentadas também por animais domésticos como cavalariças, chiqueiros, galinheiros, currais, etc., onde

as espécies de triatomas domésticas são também encontradas. Todos os continentes possuem representantes do gênero, pois, até, em Açores (único lugar europeu onde tem sido registrada) foi encontrada a *T. rubrofasciata*, aliás a única espécie comospolita conhecida e que, na nossa opinião é de origem asiática, tendo-se difundido com os antigos veleiros que faziam a navegação com as Índias.

Em todo o continente americano esta espécie é litorânea e pelas informações de Lafont, o mesmo acontece em Maurícia e Reunião; as outras localidades africanas, onde têm sido encontrada, estão também no litoral.

A *T. brasiliensis* só é encontrada no Brasil central; a *T. sordida* que possui vasta distribuição na América do Sul, é encontrada sempre à beira dos cursos d'água; esta espécie como a *T. infestans*, é encontrada desde cidades à beira-mar como em Buenos Aires, até em povoações bolivianas situadas a mais de 2 mil metros de altitude.

Geralmente, toda zona tem a sua espécie; todavia, podemos verificar no Piauí a presença simultânea nos domicílios das *T. megista*, *brasiliensis*, *sordida* e *maculata*; é muito comum a associação da *T. megista* e *sordida* ou destas e mais *T. infestans*, nos Estados do Sul do Brasil.

No Norte do Brasil as triatomas são conhecidas pelas denominações de "*bicho de parede*", "*chupão*", "*fincão*"; em Minas e Sul de Goiás, de "*barbeiro*"; em algumas zonas de Mato Grosso de "*chupança*"; as ninfas de "*cascudos*" ou ainda de "*borrachudos*" nas localidades onde os representantes do gênero *Simulium*, que são conhecidos em quasi todo o país por esta designação, são chamados de "*mosquitos*". Na capital de Goiaz, a denominação vulgar é de "*Vum-vum*", em localidades baianas como registrou Pirajá da Silva; ainda existem as denominações de "*percevejo francês*", "*percevejo do sertão*", "*furão*", "*rondão*"; em outras localidades baianas e goianas verificamos as denominações de "*percevejão*", "*percevejo gauderio*", ou simplesmente "*percevejo*", nos logares onde a *Acanthia lectularia* é conhecida pelo nome de "*fim-fim*", "*percevejo da Baía*" ou de "*Comércio*".

Nos países hispano-americanos, a designação vulgar é de "*vinchuca*", no México de "*chinha-voladora*", nos Estados Unidos de "*Blood-sucking cone nose*", "*Kissing-bug*", "*Mexican-bedbug*" (Texas) ou simplesmente "*The big bedbug*", "*monitor bug*", (Califórnia). Segundo Donovan, a *T. rubrofasciata* é chamada na Índia por alguns de "*mother of the bugs*"; esta mesma espécie é conhecida em Maurícia e Reunião pelas in-

formações de Lafont, pela designação de "*Punaise maupin*" e "*Punaise morpin*", corruptela de nome do Governador Maupin, o qual, em consequência da picada deste hemíptero, contraiu um antraz.

Quanto à profilaxia, baseia-se em impedir o acesso às fendas e brechas existentes não só nas casas de taipa, como em construções de madeira. Em localidades infestadas pelas triatomas, habitações bem construídas, podem abrigar estes insetos, os quais se ocultam em qualquer frincha da parede, assoalho ou forro. Das espécies por nós conhecidas, a mais difícil de se combater é a *T. sordida*, a qual facilmente se abriga até atrás dos quadros. Enquanto existir a prática tão vulgarizada no Brasil, de construir casas de taipa ou adobes, é ocioso falar-se em medidas profiláticas. O expurgo pelo gás sulfuroso é certamente de real proveito para quem quiser extinguir as triatomas domiciliadas. As formigas, principalmente as do gênero *Eciton*, aranhas e ratos dão raça intensa às triatomas.

A propagação se faz de *proche en proche* ou à distância, quando acarretada pelas selas dos tropeiros, onde facilmente as triatomas se abrigam como por várias vezes temos verificado. O inseto alado voa bem, e, facilmente, transpõe de uma só vez toda a largura das ruas de qualquer cidade do interior; nos meses em que ele pulula é fácil apreciá-lo voando no interior das habitações". (Neiva).

"55. *Biologia* - Os barbeiros vivem nos ranchos ou *cafus* rebocados com barro ordinário (fig. 366, pg. 168), penetrando pelas frestas das paredes ocasionadas pelo dessecação. Aí constituem o seu viveiro predileto, efetuando as posturas e saindo geralmente à noite, para exercerem o hematofagismo indispensável à vida desses insetos, que são hematófagos obrigados.

É fácil reconhecer-se um rancho infestado por *barbeiros*, pela existência das fezes desses hemípteros que defecam nas paredes, deixando manchas de tonalidade escura. Durante o dia é raro observar-se um exemplar de *barbeiro* pela parede, o mesmo não acontecendo à noite em obscuridade. Retirando-se fragmentos de reboque das paredes dos ranchos infestados, começam a aparecer os insetos (larvas, ninfas e adultos), sempre dotados de grande agilidade e que procuram ocultar-se na primeira fresta que encontram.

Segundo C. Pinto, em certos Estados do Brasil (Mato Grosso e Estado do Rio), encontram-se hemípteros da subfamília Reduviinae - *Spiniger domesticus* Pinto - e subfamília

lia Acanthaspidinae - *Leogorrus litura* (Fabr.), que vivem nas frestas das paredes dos ranchos e procuram sugar outros insetos (*baratas*). Aqueles hemípteros não podem ser confundidos com os *barbeiros*, porque têm o rostro curvo e a sua picada é muito dolorosa.

As larvas dos *barbeiros* nos primeiros meses de vida são às vezes muito pequenas (*Triatoma sordida*, *Rhodnius prolixus*, *R. brumpti*, etc.) e por isso relativamente difíceis de se encontrarem, porque escondem-se mesmo no barro pulverizado que sai das paredes, quando se tiram os blocos de argila. Os ranchos, quando infestados pelo *Triatoma megista*, também o são pelo *Triatoma sordida*, este sempre em menor quantidade (Chagas, Neiva, Torres e Pinto).

As palhoças dos índios do Brasil não são infestadas pelos *barbeiros* (*T. megista*), segundo observações de Murilo de Campos.

O *Triatoma sordida* é encontrado também nos galinheiros, currais e montes de lenha, sendo ainda pouco adaptado à vida doméstica.

O *Triatoma infestans* pode viver nas grandes altitudes (3.000 metros), segundo observações de Neiva, na Argentina e C. Pinto, em exemplares da Bolívia.

O *T. chagasi* só foi verificado nas locas de um roedor (*Cerodon rupestris*), segundo Brumpt e Fl. Gomes. O *T. geniculata* vive de preferência nas locas dos *tatús* (*Tatusia novemcinctus*, *Cabassus uncinatus*, etc.), onde foi verificado por C. Chagas, podendo também habitar os domicílios, segundo Neiva, Pinto e Travassos.

No Norte do Brasil (Estado do Ceará) o *Rhodnius prolixus* vive no interior dos ranchos e na Venezuela foi observado nos buracos dos *tatús*, por Tejera. O *Rhodnius brethesi* Matta foi encontrado por Alfredo da Matta, nas palmeiras do Amazonas, observação interessante, porque indica os hábitos primitivos desta espécie de *barbeiro*.

Segundo Gavião Gonzaga, no Ceará, durante as estações secas os *Triatomídeos* (*Triatoma brasiliensis* e *Rhodnius prolixus*) não podendo acompanhar a emigração do homem e dos animais que lhes fornecem sangue e impelidos pela adaptação ao meio, conservam-se em vida latente, secos e quase imóveis.

O *Triatoma megista* é uma espécie completamente adaptada aos domicílios, alimentando-se quase que exclusivamente no homem.

O *Triatoma rubrofasciata* é a única espécie cosmopolita, vive de preferência nos portos marítimos, no interior das habitações e no Brasil nunca se apresenta parasitado pelo

Trypanosoma cruzi, porque está afastado dos lugares onde se possa infectar com o agente etiológico da trypanosomose americana.

O *T. vitticeps* foi observado por C. Pinto e Martinho da Rocha Júnior nos bairros do Leme e Copacabana (Rio de Janeiro) à noite, em habitações luxuosas, atraídos pela luz.

O *Triatoma brasiliensis* Neiva já é uma espécie doméstica, embora se encontre ainda nos chiqueiros de ovelhas e nas locas de um roedor (*Cerodon rupestris*), fatos que lembram os hábitos primitivos e a tendência para a domesticidade daquele *barbeiro*.

No Brasil os adultos destes insetos começam a aparecer em setembro; no mês de janeiro, ao se examinar uma *cafua* ou rancho infestado por Triatomídeos, só por exceção se encontrarão larvas; os exemplares presentes estão no segundo estágio ninfal ou então adultos; para meados do ano as condições variam, predominando os estádios larvais, enquanto os adultos vão rareando. Todavia, em localidades favoráveis ao desenvolvimento destes insetos e onde eles pululam é possível encontrarem-se adultos em qualquer mês, em número escasso (A. Neiva).

As larvas de *Triatoma sordida* Stal, pelas dimensões pequenas que apresentam, podem viver atrás dos quadros, sob os tapete, etc. (Neiva), frequentando também os ninhos de pássaros, segundo Florêncio Gomes.

Os Triatomídeos alimentam-se em qualquer mamífero, na falta de sangue exercem o *canibalismo* e o *coprofaatismo* (Astrogildo Machado e Magarinos Torres).

Nos primeiros dias de vida as larvas recusam alimento e sugam geralmente do terceiro ou quinto dia em diante (*Triatoma megista*, *T. sordida*, *T. infestans*, *Rhodnius brumpti*, etc.).

Antes de picar os *barbeiros* secretam um líquido incolor, de reação alcalina, o qual, com o crescimento do inseto vai adquirindo cheiro acre, sensível à distância. Em todas as fases do ciclo evolutivo, a alimentação é feita com maior avidez em temperaturas altas; a 14°C. diminui de muito a vontade de se alimentar e não possuem a atividade que exercem no tempo quente (Neiva).

A picada dos Triatomídeos é indolor, sendo suportada mesmo quando a pessoa dorme (Chagas e Neiva), provocando apenas ligeiro prurido e às vezes empolamento no lugar onde introduziram a trompa. A face, as mãos e os pés são geralmente as partes do corpo mais atingidas pela picada dos *barbeiros*.

Geralmente, após a picada, os hemípteros defecam, sendo as dejeções de duas qualidades: uma é líquida amarelada, que rapidamente seca ao contacto do ar; a outra, de dessecação mais lenta, é uma substância negra (Neiva).

Cópula e postura. - A cópula entre estes insetos é demorada, sendo que um macho pode copular várias vezes, porem, não no mesmo dia. O fenómeno sexual pode verificar-se entre exemplares de espécies diferentes (*Triatoma megista*, *T. sordida* e *T. infestans*), não havendo fenómeno de hibridismo entre tais espécies, segundo Neiva, que fez experiências nesse sentido.

As fêmeas, geralmente, só copulam uma vez, depois de fecundadas iniciam a postura, 30 dias depois da cópula (*T. sordida*) ; as não fecundadas podem desovar, sendo a postura tardia e os ovos resultantes são estéreis (Neiva). De acordo com as observações deste autor, sabe-se que o *Triatoma megista* pode efetuar mais de 40 posturas com um total de 220 ovos; o *T. infestans* pode atingir a 163 ovos em 26 posturas. Segundo Lafont, o *T. rubrofasciata*, põe no máximo 182 ovos.

Segundo Neiva, o ciclo evolutivo do *T. megista* é o seguinte: *ovos* - de 1 a 10 dias, são esbranquiçados; de 12 a 20 dias coloridos de róseo; de 20 a 30 dias são vermelhos. *Larvas* - desalagamento entre 25 a 30 dias, nos meses quentes; entre 30 a 40 dias, nos meses frios. *Mudança de pele ou ecdyse* - 1ª muda, aos 45 dias; 2ª muda, com 2 a 3 meses; 3ª muda, com 4 a 6 meses.

Ninfas: a 4ª muda assinala o período ninfal, que é atingido no fim de 190 dias. O período ninfal é do 42 dias, efetuando-se a última muda ou 5ª.

Adultos: após a última muda a ninfa transforma-se em adulto e a primeira postura é feita 53 dias depois de abandonar o período ninfal.

O tempo para o ciclo evolutivo completo de ovo a inseto adulto é de 271 dias e de ovo a ovo 324 dias.

56. *Propagação dos Triatomídeos.* - A propagação dos Triatomídeos pode ser feita pelo voo dos insetos, que facilmente transpõem de uma só vez a largura das ruas de qualquer povoado, do interior, sendo relativamente facil apreciá-los voando no interior das habitações, quando em grande número. A disseminação pelas bagagens ou pelas selas dos tropeiros, onde facilmente se abrigam, foi observada por Arthur Neiva.

A disseminação do *Triatoma rubrofasciata* e *Triatoma rubrovaria*, aquele cosmopolita e este último existente em

Java e no continente sulamericano, segundo observação de Pinto e Larrousse, é feita pelas embarcações marítimas.

57. *Destruição.* - Os Triatomídeos vivem nos ranchos, habitações primitivas de taipa, nos buracos dos desipodídeos (tatús) e o *Rhodnius brethesi* Matta, acoimado nas palmeiras (*Leopoldina piassaba*) do Amazonas.

A profilaxia baseia-se em impedir o acesso destes insetos às fendas e brechas existentes nas casas de taipas e de madeira. Na prática este método falha por completo e a medida mais aconselhável seria o expurgo por meio de um inseticida de alto poder mortífero.

Os Triatomídeos são os insetos mais resistentes aos inseticidas até hoje empregados em profilaxia. Segundo experiências feitas em laboratório, por Ezequiel Dias, S. Libânio e Marques Lisboa, os *barbeiros* resistem durante 10 minutos ao ácido cianídrico; 15 horas aos vapores quasi negros de naftalina; 21 horas ao gás acetileno (experiências com larvas e adultos) e 24 horas ao cloro.

Os gases de carvão mineral produzidos pelo aquecimento de uma grama de carvão bruto foram inofensivos para as larvas de *barbeiros*, durante 24 horas.

A ação do gás sulfuroso durante tres horas não os extermina e, segundo Leocádio Chaves, 25% dos *barbeiros* de uma cafua, resistem à ação deste gás, embora a habitação seja envolvida em duplo manto de lona e papel.

Em experiências feitas em laboratório, Pinto observou que o *Cuprex* mata os adultos de *Triatoma megista* e *Triatoma brasiliensis* em 2 a 4 minutos, colocando uma gota de inseticida na face superior do abdome, por cima das asas dos insetos. As larvas resistem muito menos e as ninfas são mais resistentes que os próprios adultos. O poder de penetração do *Cuprex* é verdadeiramente notavel, pois atravessa a casca dos ovos daquelas espécies do *barbeiros*; impedindo o nascimento das larvas em qualquer estágio de evolução.

58. *Criação dos Triatomídeos.* - Estes insetos criam-se facilmente em laboratório, sendo suficiente colocá-los em cristalizadores grandes com um suporte de madeira (Fig. 64), possuindo pequenos orifícios por onde saíam, afim de alimentar-se em pequenos animais (cobaios). É conveniente guardá-los em logar escuro, e se possível, manter um certo g rau de humidade no meio ambiente. Para o estudo da biologia de uma dada espécie é preferível colocar os exemplares em pequenos vidros com um pedaço de papel no interior, afim, de servir de suporte aos insetos. A alimentação deve

ser feita de tres em tres dias ou semanalmente, sendo preferivel fazê-los sugar em pombos.

Os *barbeiros* podem jejuar por longo tempo, o que muito facilita o transporte destes insetos de um país para outro. Para este fim usam-se pequenas caixinhas contendo uma tampa com tela de arame, devendo-se ter o cuidado de pregá-la para que se não abra durante a viagem.

59. *Formas evolutivas do "Trypanosoma cruzi" nos Triatomídeos.* - De acordo com as pesquisas de Chagas e Magarinos Torres, sabe-se que a idade do inseto transmissor têm relação direta com a infecção pelas formas evolutivas do *Trypanosoma cruzi*.

Nos ranchos das regiões onde a doença é endêmica, todos os adultos de *Triatoma megista* (Burm.) são parasitados pelas formas evolutivas do agente etiológico da trypanosomose americana, as ninfas, porem não o são de modo consistente. Nas larvas que sofreram as últimas mudas ou ecdyses a infecção é mais escassa e raríssima ou completamente nula nas de primeira idade.

Os *barbeiros* só se infectam após correrem numerosas possibilidades de infecção, isto é, nos últimos estádios larvários ou nas idades de ninfa e adulto (M. Torres).

De acordo com as pesquisas feitas por Gomes Faria e Oswaldo Cruz Filho, sabe-se que o *Trypanosoma cruzi* (Chagas) pode penetrar no interior das células epiteliais do intestino posterior do *Triatoma megista* (Burm.), onde aparecem sob a forma de *Leishmanias* (formas de Gaspar Vianna), isoladas ou em número variavel (algumas dezenas). Em algumas destas formas, Faria e Cruz Filho, verificaram a presença de um aparelho flagelar rudimentar. Alem destes estádios evolutivos, os autores citados observaram Tripanosomas com caracteres seguintes: corpo longo e fino, núcleo principal alongado em forma de faixa longitudinal; blefaroplasto colocado imediatamente para trás do núcleo principal ou na extremidade posterior do Tripanosoma. Não foi verificada a presença de membrana, envolvendo os aglomerados de Tripanosomas intracelulares, como acontece com o *Trypanosoma lewisi*.

O *Trypanosoma cruzi* localiza-se numa espécie de vacuolo do cytoplasma, sendo que nas células intestinais muito parasitadas o protoplasma pode ser reduzido a uma verdadeira trama reticular e os núcleos fortemente afastados para uma das paredes das células.

Os protozoários localizam-se ao nivel da camada epithelial ou nas partes mais profundas. As formas intrace-

lulares do *Trypanosoma cruzi* já tinham sido observadas no intestino de um carrapato (*Ornithodoros moubata*) por Meyer e Rocha Lima.

Faria e Cruz Filho puderam demonstrar que tais formas também existem no *Triatoma megista*, um dos hospedeiros habituais do agente etiológico da doença de Chagas.

As interessantes observações acima referidas demonstram que o *Trypanosoma cruzi* é dotado de um histotropismo pronunciado, mesmo no inseto transmissor.

As figs 65 e 66 indicam as diferentes partes do aparelho digestivo de um *barbeiro* e as formas evolutivas do *Trypanosoma cruzi*.

60. *Insetos nocivos aos Triatomídeos.* - São relativamente raros os insetos que, em condições naturais, podem destruir os *barbeiros*. Neiva observou que certas espécies de formigas do gênero *Eciton* atacam estes hemípteros, destruindo-os. Os Triatomídeos mantidos em criação no interior de pequenos vidros são perseguidos pelas formigas, devendo-se ter o cuidado de protegê-los colocando as gaiolas em suportes isolados por uma superfície d'água.

Costa Lima descobriu uma espécie de microimenoptero, *Telenomus fariai* C. Lima, 1927, que tem a interessante particularidade de atacar *in natura* os ovos de *barbeiros*, neles fazendo as posturas.

De acordo com as experiências devidas a Costa Lima, sabe-se que o *Telenomus fariai* é muito ativo durante o dia, à noite, pela manhã, ou quando a temperatura do ambiente é pouco elevada, essa atividade diminui ou cessa de todo e os microimenopteros se reúnem, formando pequenos grupos de alguns indivíduos aconchegados uns aos outros na tampa dos frascos de criação ou em algum espaço entre ela e a parede do frasco. À proporção que a temperatura se vai elevando eles se dispersam e entram novamente em atividade.

Costa Lima verificou que o *Telenomus fariai* pode permanecer vivo, sem se alimentar, durante dez dias. O tempo que este inseto leva para depositar os seus ovos pode variar entre seis a treze minutos. Uma fêmea, em quatorze dias de vida, infestou dezesseis ovos de *barbeiros*, sendo oito de *Triatoma megista* e oito de *Triatoma sordida*; uma outra fêmea, em dezoito dias de vida, infestou vinte ovos, sendo dez de *Triatoma megista* e dez de *Triatoma sordida*, tais observações porém são consideradas ainda incompletas.

Em criações obtidas no laboratório, nos meses de maio a setembro, com a temperatura média oscilando entre 19° a 21° C., Costa Lima verificou que, entre a postura e a saída

das formas adultas do *Telenomus*, decorrem vinte e sete a trinta dias. A temperatura baixa, oscilando entre 4°C a 5,5°C, retarda ou talvez mesmo iniba o desenvolvimento do microinseto nos ovos dos *barbeiros*. Numa experiência feita por Costa Lima os ovos de *Triatoma megista* parasitados pelo *Telenomus fariai* e mantidos na temperatura ambiente deram os primeiros parasitos no fim de vinte e sete dias, ao passo que os ovos mantidos na câmara frigorífica com a temperatura de 4°C a 5,5°C só deram os primeiros insetos alados no fim de cinquenta e dois dias, a contar da postura". (Pinto).

315. **Classificação.** - NEIVA e LENT (1936) catalogaram 75 espécies de Triatominae, das quais 28 já encontradas no Brasil.

Pinto, em seu mais recente trabalho sobre a sistemática destes insetos, distribuiu-os nos seguintes gêneros: *Linshcosteus* Distant, 1901; *Adricomius* Distant, 1903; *Psammolestes* Bergroth, 1911; *Belminus* Stal, 1859 (= *Marlianus* Distant, 1902); *Eratyrus* Stal, 1859; *Rhodnius* Stal, 1859; *Triatoma* Laporte, 1832 (= *Conorhinus* Laporte, 1832; *Mecus* Stal, 1859); *Eutriatoma* Pinto, 1926; *Neotriatoma* Pinto, 1931 e *Panstrongylus* Berg, 1879 (= *Lamus* Stal, 1859; *Mestor* Kirkaldy, 1904).

Alem destes gêneros, devem ser incluídos em Triatominae: *Bolboderia* Bruner & Fracker, 1926, com a espécie *B. scabrosa* Bruner & Fracker, 1926, de Cuba; *Cavernicola* Barber, 1937, com a espécie *C. pilosa* Barber, 1937, do Panamá e *Paratriatoma* Barber, 1938, com a espécie *P. hirsuta* Barber, 1938, da Califórnia e Arizona.

Depois de dar uma chave para a determinação dos gêneros americanos de Triatominae, considerarei cada um deles apresentando chaves das espécies observadas no Brasil e das que se encontram em outras partes da região neotrópica.

Todavia, não tratarei das espécies até agora somente observadas no México, nem do *Triatoma coxo-rufa* Campos, 1933, do Equador, de descrição deficiente.

Relativamente à bibliografia desta subfamília, deve-se também consultar a que se acha no capítulo VIII do livro de CEZAR PINTO (1930 (Anthrop. Parasit., etc., tomo I, páginas 224-234).

316. **Chave dos gêneros americanos de Triatominae.**

- 1 Cabeça mais ou menos dilatada atrás dos olhos 2
- 1' Cabeça não dilatada atrás dos olhos 4
- 2(1) Jugae sob a forma de 2 processos porretos, ponteagudos, de cada lado do tilus; tubérculo antenífero com processo e spiniforme apical, externo 3
- 2' Jugae e tubérculos anteníferos normais; rostrum com o 1º segmento mais curto que o 2º; scutellum apresentando na base um dentículo obtuso (quasi invisível)
Psammolestes
- 3(2) Scutellum com denticulo obtuso de cada lado, perto da base; rostrum com o 1º e o 2º segmentos subiguais (o basal ou 1º mais longo) **Belminus**
- 3' Scutellum sem o dentículo referido em 3 **Bolbodera**⁵⁴
- 4(1') Antenas inseridas perto do ápice da cabeça; ponto de inserção 2 ou mais vezes distante do olho que do ápice da cabeça; 2º segmento do rostrum 3 a 4,5 vezes mais longo que o 1º segmento (fig. 375, pág. 191) **Rhodnius**
- 4' Inserção das antenas mais afastada do ápice da cabeça; 2º segmento do rostrum, na maioria das espécies, com menos de 3 vezes o comprimento do 1º segmento, às vezes porem (algumas espécies de *Eutriatoma*), com 3 ou mais vezes esse comprimento 5
- 5(4') ângulos postero-laterais do pronotum espinhosos ou agudos; scutellum com o ápice terminando em processo espiniforme mais ou menos alongado; parte anterior

⁵⁴ Tenho a impressão de *Bolbodera* ser idêntico a *Belminus*. Infelizmente, porem, não posso chegar a qualquer conclusão à respeito, porquanto a espécie tipo de *Belminus*, *B. rugulosus* Stal, ainda examinada por Neiva quando visitou o Museu Zoológico de Berlim (Neiva, 1913), parece que se perdeu, segundo se depreende da seguinte informação, que me foi comunicada por carta de 11 de março de 1939 do Dr. Hans Sachtleben do Deutsches Entomologisches Institut: "We have searched for it in vain in the collection of the Zoological Museum of the University of Berlin".

- do pronotum com 2 longos espinhos, ou 2 tubérculos cônicos disciais, ou mesmo sem estes **Eratyrus**
- 5' Ângulos postero-laterais do pronotum arredondados ou obtusos; parte anterior do pronotum geralmente sem espinhos ou tubérculos disciais, às vezes, porém, com tubérculos cônicos; antenas, dobradas na articulação do 1° com o 2° segmento, não excedendo o ápice do scutellum 6
- 6(5) Tubérculos anteníferos implantados imediatamente adiante dos olhos; distância do ponto de inserção da antena ao limite anterior do olho menor que a deste ponto ao limite posterior; distância entre o limite externo dos olhos (vista a cabeça de cima) sempre maior que o comprimento da parte antecular (tomado do limite anterior do olho ao ápice do tylus); 2° segmento do rostrum tendo menos de 2 vezes o comprimento do 1° ou basal (fig. 369, pg. 172) 7
- 6' Tubérculos anteníferos mais afastados dos olhos; distância do ponto de inserção da antena ao limite anterior do olho maior que a deste ponto ao limite posterior; distância entre o limite externo dos olhos, quasi sempre, menor que a parte antecular da cabeça 8
- 7(6) Corium com as nervuras visíveis; prosternum com sulco estridulatório distinto; fêmures com dentículos ou espinhos em baixo **Panstrongylus**
- 7' Corium sem nervuras; prosternum desprovido de sulco estridulatório distinto; fêmures míticos **Cavernícola**
- 8(6') 2° segmento do rostrum tão longo ou pouco mais curto que o 3° **Neotriatoma**
- 8' 2° segmento do rostrum sempre mais longo que o 3° 9
- 9(8') 2° segmento do rostrum tendo 2 ou mais vezes o comprimento do 1° (fig. 374) **Triatoma (Eutriatoma)**
- 9' 2° segmento do rostrum tendo menos de 2 vezes o comprimento do 1°. 10
- 10(9') Olhos (vista a cabeça de cima) muito afastados; espaço entre eles 3 vezes maior que a altura de um olho **Triatoma (Paratriatoma)**
- 10' Olhos mais aproximados; espaço entre eles sempre inferior a 3 vezes a altura de um olho (fig. 373) **Triatoma (Triatoma)**

Gênero **Psammolestes** Bergroth, 1911

317. **Espécies que o constituem.** - O gênero *Psammolestes* compreende apenas duas espécies.

P. coreodes Bergroth, 1911, descrito de exemplares encontrados na Argentina, foi por mim assinalado no Brasil de exemplares colhidos pelo Dr. J. C. N. PENIDO em ninho de *Phacelodomus rufifrons* (Wied.) em 1934 e ulteriormente estudada por LENT (1935) e por PINTO e LENT (1935).




Fig. 371 - Cabeça de *Triatoma* (vista de cima).

Fig. 372 - Cabeça de *Triatoma* (vista de perfil).

Trata-se de uma espécie hematófaga, que normalmente suga sangue de aves das famílias Dendrocolaptidae e Psittacidae (MAZZA e BASSO, 1936), recusando sugar sangue de mamíferos, a não ser após prolongado jejum (LENT, 1935).

P. arthuri Pinto, 1926, descrito por PINTO, de exemplares da Venezuela, como espécie de *Eutriatoma*, foi depois, por ele e por LENT (1926), classificado no gênero *Psammolestes*. É uma espécie extremamente próxima de *P. coreodes*, dela, porém, diferindo, principalmente, por

apresentar os ângulos pronotais anteriores agudos e as partes mais salientes da cabeça e do pronotum, polidas, brilhantes.

Experimentalmente ambos se infestam pelo *Schizotrypanum cruzi*, segundo verificaram TORREALBA (1937) com o *P. arthuri*, na Venezuela e EMANUEL DIAS (*apud* PINTO, 1938), em Manguinhos (Rio de Janeiro), com o *P. coreodes*.




Fig. 373 - Cabeça de *Eutriatoma* (vista de cima).
Fig. 374 - Cabeça de *Eutriatoma* (vista de perfil).

O aspecto geral destes insetos, a coloração, a forma da cabeça, o tamanho relativamente curto das antenas e a presença de tubérculos setíferos na cabeça parecem indicar estreit as afinidades das espécies deste gênero com as de alguns gêneros de Stenopodinae.

Gênero **Belminus** Stal, 1859

318. **Espécie única.** - A espécie única deste gênero é o *B. rugulosus* Stal, 1859, pequeno Triatomineo (10 mm. de comprimento) encontrado na Colômbia, na Costa Rica e na Venezuela, porem, de hábitos mal conhecidos.

PICADO (1913) referiu ter CALVERT encontrado, em Costa Rica, uma ninfa desta espécie numa Bromeliácea.

Conquanto este inseto pareça diferente de *Bolboder* *scabrosa* Brunner & Fracker, 1926, também muito pequeno (8 a 9 mm. de comprimento), representante único do gê-





Fig. 375 - Cabeça de *Rhodnius* (vista de cima).
 Fig. 376 - Cabeça de *Rhodnius* (vista de perfil).

nero *Bolboder* Brunner & Fracker, 1926, suspeito que este último gênero, como *Marlianus* Distant, 1902, terá de ser incluído na sinonímia de *Belminus* Stal (v. a nota 54, à



figs. 377-378 - *Psammolestes coreódes* Begroth, 1911 (Triatominae); macho à esquerda (377) e fêmea à direita (378) (X 1,4) (De Lent, 1935, fig. 1).

pág. 187); sobre a identidade de *Belminus rugulosus* Stal e *Marlianus diminutus* Walker, 1873 (DISTANT, 1902), v. trabalho de NEIVA (1913).

Gênero **Rhodnius** Stal, 1859319. **Chave** (em parte segundo Larrousse (1927)).

- 1 Cabeça pouco mais longa que o pronotum; connexivum excedendo amplamente os hemelitos, daí serem perfeitamente visíveis as manchas que possui. *domesticus* Neiva & Pinto, 1923; Minas Gerais e Rio de Janeiro.
- 1' Cabeça distintamente mais longa que o torax 2
- 2(1') Connexivum negro, com máculas vermelhas *brethesi* da Matta, 1919 (- *prolixus* Neiva & Pinto, 1923, non Stal); Amazonia.
- 2' Connexivum de cor amarelada ou testácea, mais ou menos escura, com manchas pardas ou enegrecidas 3
- 3(2') Tíbias, além da parte apical enegrecida, com anel negro perto do meio *pictipes* Stal, 1872; Brasil (Amazônia), Colômbia, Guiana Francesa, G. inglesa, Venezuela.
- 3' Tíbias enegrecidas no ápice, porém, sem anel negro perto do meio 4
- 4(3') 2º segmento do rostrum com menos de 3 vezes o comprimento do 1º; connexivum com manchas oblongas negras; 21 mm. de comprimento *prolixus* Stal, 1859; Colômbia, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, S. Salvador, Venezuela; provavelmente encontrado também no Brasil e no Panamá.
- 4' 2º segmento do rostrum com mais de 3 vezes o comprimento do 1º 5
- 5(4') Cor geral testácea escura; e espécie grande (21-22 mm.); 2º artículo do rostrum 5 vezes o comprimento do 1º ou do último, que são subiguais; 1º e 2º segmentos antenais de cor negra uniforme; pernas de cor castanha, tíbias e tarsos negros no ápice *robustus* Larrousse, 1927; Brasil; G. Francesa.
- 5' Cor geral testácea clara; 2º artículo do rostrum com menos de 5 vezes o comprimento do 1º ou do último, que são subiguais; 1º segmento antenal castanho claro ou testáceo pálido, 2º da mesma cor, porém, mais escuro para o ápice 6

- 6(5') Espécie pequena (13-14 mm.); pernas de cor uniforme, castanha clara, apenas as tíbias enegrecidas no ápice..
 *nasutus*
 Stal, 1859 e *brumpti* Pinto, 1925, ambos do Nordeste, aquele do Ceará e este do Rio Grande do Norte⁵⁵.
- 6' Espécie grande (20-32 mm.), de cor geral testácea-pálida; pernas com fêmures e tíbias sarapintados de pardo *pallescens*
 Barber, 1932 (= *dunni* Pinto, 1932); Panamá.

As espécies deste gênero são também hematófagas.

Transmitem o *Schizotrypanum cruzi*: *Rhodnius prolixus*, segundo BRUMPT & GONZALEZ-LUGO (1913) (transmissão experimental) e TEJERA (1919) (infestação natural); *Rhodnius brumpti*, no Norte do Brasil, segundo PINTO (1925), *Rhodnius pallescens*, no Panamá, segundo DUNN e *Rhodnius pictipes* Stal, 1872, segundo CASTRO FERREIRA e DEANE (1938): (1938):

"O *Rhodnius brethesi*, descrito por Alfredo da Matta em 1919, no Amazona.s, (região de Barcelos) foi encontrado na palmeira *Leopoldina piassaba*; voando ataca os trabalhadores que dormem em redes próximas dos piassabais, alimenta-se também do sangue de aves, além do de mamíferos atraídos pelas macegas, ausência de lua e certo ambiente de calor que as citadas palmeiras lhe fornecem conforme o próprio Dr. Matta, informou recentemente ao Dr. Neiva. Já foi verificado, aliás, que os *Rhodnius* em cativeiro podem alimentar-se em aves" (Lent, 1935).

Recomendo a leitura do trabalho de LARROUSSE (1927), que contém dados interessantes sobre a biologia destes insetos.

Gênero *Eratyrus* Stal, 1859

320. **Caracteres, etc.** - De acordo com C. PINTO, acho que o gênero *Eratyrus* Stal, 1859, tal como o definiu o autor, deve compreender além de *E. mucronatus* Stal, 1859

⁵⁵ Com Larrousse, creio que *R. brumpti* seja idêntico a *R. nasutus*.

e de *E. cuspidatus* Stal, 1859, a espécie que DEL PONTE descreveu com o nome *Triatoma eratyrisiforme*, anteriormente incluída (in litt.) por este autor no gênero *Eratyrus*.

Vejo-me, porem, obrigado a modificar a definição de *Eratyrus* para a seguinte diagnose:

"Gênero com caracteres de *Triatoma*, porem, com os ângulos do lobo posterior do pronotum espinhosos ou agudos."

Sabendo-se, porem, como variam os espinhos pronotais nas espécies de *Spiniger* e até mesmo nos dois sexos de uma mesma espécie, como em *Spiniger fulvo-maculatus*, cujos machos têm os ângulos do lobo posterior do pronotum obtusos e as fêmeas os apresentam distintamente espinhosos, compreender-se-á que tal carater perde o valor, quando considerado exclusivamente para a constituição de um gênero.

O alongamento das antenas, assinalado por C. PINTO, não me parece que deva ser tomado em consideração na diagnose genérica, a menos que se exclua de *Eratyrus* a espécie de DEL PONTE, cujas antenas devem ser curtas como em *Triatoma*.

Eis a chave das espécies incluídas neste gênero:

- 1 Ângulos posteriores do pronoto prolongados em espinho dirigido para cima e um pouco para trás; parte anterior do pronoto com 2 longos espinhos discais, eretos, algo divergentes; scutellum prolongado em longo espinho, quasi ereto, inclinando para trás *mucronatus* Stal, 1859; Guiana Inglesa; Brasil.
- 1' Ângulos posteriores do pronoto em ponta aguda; lobo anterior do pronoto com 2 espinhos curtos e rombos ou mesmo sem espinhos 2
- 2(1') Parte antecular 1,5 vezes a largura da cabeça, entre o limite externo dos olhos (vista a cabeça de cima); antenas muito longas, com o ápice atingindo o meio do 4º urômero; 2º segmento antenal, tendo mais de 5 vezes o comprimento do 1º; scutellum terminando em longo espinho agudo *cuspidatus* Stal, 1872; Colômbia: Panamá; Uruguai.

- 2' Parte antecular tendo pouco mais de 1 vez a largura da cabeça, entre o limite externo dos olhos; antenas provavelmente curtas, como em *Triatoma*; 2° segmento antenal tendo cerca de 4 vezes o comprimento do 1°; scutellum terminando em espinho rombo
 *eratyrisiforme*
 (Del Ponte, 1929); Rep. Argentina.

Segundo PINTO (1938), TEJERA verificou que *E. cuspidatus* transmite o *Schizotrypanum cruzi*.

DUNN (1934), no Panamá, encontrou *Eratyrus cuspidatus* naturalmente infectado pelo *Schizotrypanum*.

Gênero **Panstrongylus** Berg, 1879

321. **Chave.**

- 1 Distância entre o limite externo dos olhos (vista a cabeça de cima) quasi igual ou pouco maior que a parte antecular da cabeça; cor geral negra; connexivum com pequenas máculas triangulares, te stáceo-avermelhadas, sobre os ângulos póstero-laterais dos segmentos. *chinai* (Del Ponte, 1929); Perú.
 Esta espécie foi incluída por Pinto neste gênero; todavia, pelo aspecto da cabeça, lembra o *Triatoma rubrofasciata*, que tem também a parte antecular relativamente curta. Somente a posição dos tubérculos anteníferos é que justifica a inclusão em *Panstrongylus*.
- 1' Distância entre o limite externo dos olhos (vista a cabeça de cima) bem maior que a parte antecular da cabeça; aspecto do connexivum diferente do referido em (1) 2
- 2(1') Lobo anterior do pronotum com tubérculos cônicos laterais e distais, estes tão salientes quanto os tubérculos pronotais anteriores; processo e scutelar curto mais curto que o scutellum, de ponta romba, com um tubérculo em cima; tubérculos anteníferos sem saliência dentiforme apical; fêmures apenas com um par de tubérculos setíferos, em baixo e perto do ápice, aliás pouco desenvolvidos 3

- (Ao meu ver **Mestor** deveria ser mantido, como subgênero, para as espécies deste grupo).
- 2' Lobo anterior do pronotum sem tubérculos laterais ou com estes quasi invisíveis; os discais pouco desenvolvidos; processo escutelar, espiniforme, tão longo ou quasi tão longo quanto o scutellum; tubérculo antenífero com saliência dentiforme perto do ápice; fêmures anteriores e médios tendo, em baixo, alem de um par de tubérculos setiferos distais bem desenvolvidos. outros menores para dentro 5
- 3(2) Cor geral parda clara; pronoto com 5 faixas negras longitudinais relativamente estreitas; scutellum tambem com faixas negras; corium com estrias negras irregulares; membrana com partes claras e escuras; máculas negras do connexivum, nos ângulos ântero-laterais, triangulares *lignarius* (Walker, 1873)⁵⁶; Guiana Inglesa; Brasil (Pará).
- 3' Outro aspecto 4
- 4(3') Espécie grande (27-32 mm.), com máculas no lobo posterior do pronoto e no connexivum de cor vermelha; fêmures unicolores, negros (págs. 380 e 381) *megistus* (Burmeister, 1835) (= *gigas* Burmeister, 1861, *nec* Fabricius; *porrigens* Walker, 1873; *wernickei* Del Ponte., 1923; *conorrhinus* Hoffmann, 1923); Guiana Inglesa; Brasil; Paraguai.
- 4' Espécie menor (25 mm.), com máculas na cabeça, no torax, no connexivum e nos fêmures, de cor avermelhada ou ocrácea-avermelhada *rufotuberculatus* (Champion, 1899); Panamá.
- 5(2') Pronotum de cor parda escura quasi uniforme; lobo anterior, em cima, apresentando duas bo ssas contiguas; faixas escuras do connexivum mais ou menos distintas *guentheri* Berg, 1879; Argentina e *larroussei* (Pinto, 1925)⁵⁷; Argentina.
- 5' Pronotum com outro aspecto e connexivum com máculas negras, bem nítidas, nos ângulos ântero-laterais 6

⁵⁶ Esta espécie só era conhecida da Guiana Inglesa. Em fins de dezembro de 1938, determinei um exemplar, que mefoi entregue pelo Dr. Evandro Chagas, apanhado em Piratuba (Pará). Ulteriormente cedi este exemplar ao Dr. Cezar Pinto, que o guardou na coleção em seu laboratório, no Instituto Oswaldo Cruz.

⁵⁷ Não sei distingui-las.

- 6(5') Cor geral oerácea ou amarelada; pronoto com faixa negra transversal, de mar gem anterior mais ou menos ondulada, acompanhando o bordo posterior *geniculatus* (Latreille, 1811) (= *lutulentus* Erichson, 1848; *corticis* Walker, 1873; *fluminensis* Neiva & Pinto, 1923); Argentina; Brasil e *tenuis* (Neiva, 1914); Brasil⁵⁸.
- 6' Cor geral testácea ou parda, mais ou menos escura; lobo anterior do pronotum muito escuro, quasi negro; tubérculos disciais do lobo anterior, 2 grandes áreas medianas prescutelares e 2 laterais, no lobo posterior, de cor testácea; scutellum (exceto a ponta), hemelitos (exceto o clavus, uma mácula basal e uma preapical, de cor testácea), enfoscados ou enegrecidos
..... *lutzi* (Neiva & Pinto, 1923); Brasil.
- 6" Cor geral testácea avermelhada exceto o pronotum e scutellum que são quasi totalmente negros; neste a ponta e naquele a parte posterior do lobo anterior, 2 carenas divergentes do lobo posterior e os ângulos posteriores são t, a mbem de cor testácea-avermelhada.
..... *seai* (Del Ponte, 1929); Argentina.
Não conheço esta espécie, que, não obstante menor (fêmea 23,5 mm.) que *lutzi* (fêmea 27,5 mm.), deve ser extremamente próxima.

Como espécies mais importantes deste gênero devo citar, em primeiro lugar, *Panstrongylus megistus*, Triatomineo de hábitos domiciliares e um dos principais transmissores do *Schizotrypanum cruzi*.

Foi CHAGAS O primeiro a demonstrar (1909) o papel importante deste inseto em parasitologia, como transmissor do agente etiológico da "doença de Chagas" (*Schizotrypanum cruzi*), tripanosomose americana que trás o nome do descobridor.

A etologia do *P. megistus* foi estudada por NEIVA (1910).

Alem de *P. megistus*, tambem transmite aquele tripanosoma o *P. geniculatus*, encontrado em buracos de tatús (CHAGAS, 1912) e que, segundo NEIVA, PINTO e TRAVASSOS, frequenta domicílios.

Tambem no Panamá esta última espécie é um dos transmissores do *Schizotrypanum*, segundo CLARK & DUNN (1932).

⁵⁸ Não sei distinguir esta espécie de *geniculatus*.

Gênero **Triatoma** subgen. **Eutriatoma**⁵⁹

322. **Espécies que o constituem.** - Deste gênero ha apenas duas espécies descritas. *N. circummaculata* (Stal, 1859), da Argentina e Uruguai e *N. limai* (Del Ponte, 1929), do Brasil, que, pelas descrições, não sei exatamente como distinguir da espécie descrita por STAL.

Gênero **Triatoma** subgên. **Eutriatoma**⁵⁹323. **Chave.**

- | | | |
|-------|--|--|
| 1 | 2° segmento do rostrum com mais de 3 vezes o comprimento do 1°. | 2 |
| 1' | 2° segmento do rostrum, no máximo, com 3 vezes o comprimento do 1°. | 3 |
| 2(1) | 2° segmento do rostrum cerca de 4 vezes o comprimento do 1°; antenas inseridas para trás do meio da região antecular, esta tão alongada quanto a distância entre o limite externo dos olhos | <i>venosa</i>
(Stal, 1874); Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador e Panamá. |
| 2' | 2° segmento do rostrum com cerca de 3,5 vezes o comprimento do 1°; antenas inseridas no meio da região antecular, esta igual a 1,5 vezes a distância entre o limite externo dos olhos | <i>nigromaculata</i>
(Stal, 1874) (= <i>variegatus</i> Stal, 1859; Venezuela. |
| 3(1') | Espécies de cor geral testácea ou pardacenta | 4 |
| 3' | Espécies de cor geral negra ou quasi negra | 5 |
| 4(3) | Lobo anterior do pronotum com tubérculos laterais; tubérculos discais muito salientes; scutellum, em cima, com 2 tubérculos espiniformes perto da base e com a ponta voltada para diante; connexivum com faixas escuras ou negras, relativamente largas, ocupando a metade anterior de cada segmento | <i>flavida</i>
Neiva, 1911; Cuba. |
| 4' | Lobo anterior do pronotum sem tubérculos laterais; tubérculos discais indistintos; scutellum sem os tubérculos referidos em (4); connexivum com linhas negras | |

⁵⁹ *Eutriatoma* pode ser conservado, apenas como subgênero.

- ocupando o bordo de cada segmento, externamente dilatadas em mácula, lembrando o aspecto de notas musicais (fig. 382) *sordida* (Stal, 1859); Argentina, Bolívia, Brasil, Uruguai.
- 5(3') Áreas claras do connexivum, como as demais do corpo, de cor alaranjada, ocupando as partes adjacentes de cada sutura intersegmental, isto é, a parte anterior de cada segmento e a posterior do que fica imediatamente adiante; 2° segmento do rostrum com 3 vezes o comprimento do 1°. *carrioni* Larrousse, 1926; Equador.
- 5' Áreas claras do connexivum ocupando o meio de cada segmento, às vezes aproximadas do bordo posterior, porém sem atingí-lo; as suturas intersegmentais ficam, pois, incluídas nas áreas negras; 2° segmento do rostrum com menos de 3 vezes o comprimento do 1° 6
- 6(5') 3° e 4° segmentos antenais, todas as tíbias (exceto a parte apical), bordos laterais, parte mediante do bordo posterior e 2 linhas divergentes sobre o disco do pronoto, máculas arredondadas nos ângulos póstero-laterais dos segmentos do connexivum e grandes faixas alongadas no corium, de cor testácea-rósca; o resto do corpo de cor negra (fig. 383) *tibia-maculata* Pinto, 1926; Brasil.
- 6' Outro aspecto 7
- 7(6') Pronotum de cor negra uniforme 8
- 7' Pronotum com áreas claras, testáceo amareladas ou avermelhadas 10
- 8(7) Manchas claras do connexivum de cor avermelhada *oswaldoi* Neiva & Pinto, 1923; (= *sordelli* Dios e Zuccarini, 1925); Argentina; Brasil; Perú.
- 8' Manchas claras do connexivum de cor amarelada 9
- 9(8') Hemelitros muito escuros, com uma mácula amarelada na base do corium e outra menor perto do ápice; comprimento da cabeça igual à distância do bordo anterior do pronoto ao meio do scutellum *patagonica* Del Ponte, 1929; Argentina.
- 9 Hemelitros escuros, com 2 manchas negras no meio do corium; este, na parte interna da base, de cor mais clara; comprimento da cabeça "levemente maior que o pronotum" (Lent) *gomesi* Neiva & Pinto, 1923; Sul do Brasil.

- 10(7) Parte antecular, vista a cabeça de cima, igual ou mesmo um pouco mais curta que o espaço entre o limite externo dos olhos; lobo posterior do pronotum apresentando 6 ou 4 (quando as 2 externas confluem) máculas amareladas ou alaranjadas, em relação com o bordo posterior *maculata* (Erichson, 1848) ; Brasil; Guianas.
- 10' Parte antecular consideravelmente mais longa que o espaço entre o limite externo dos olhos 11
- 11 (10') 1º segmento antenal muito curto), o ápice não excedendo o meio da distância do ápice do tubérculo antenífero ao ápice do tylus; 2º mais curto que a parte antecular da cabeça; pronotum com algumas faixas amareladas em relação com o bordo posterior *petrochii* Pinto e Barreto, 1925; Argentina; Brasil (Rio Grande do Norte).
- 11' 1º segmento antenal de tamanho normal, com o ápice quasi atingindo o ápice do tylus; 2º mais longo que a parte antecular; pronotum apresentando somente 2 distintas áreas claras perto dos ângulos posteriores 12
- 12(11') Áreas claras do pronotum e do connexivum de cor avermelhada; hemelitos escuros, com áreas avermelhadas na base e no ápice do corium *rubrovaria* (Blanchard, 1843) (= *phyllosoma* Herrich-Schaeffer, 1848, *nec* Burmeister; *rubroniger* Stal, 1859); Argentina; Brasil; Uruguai e Java.
- 12 Áreas claras do pronotum e do connexivum de cor amarelada; hemelitos uniformemente amarelados *oliveirai* Neiva, Pinto & Lent, 1939; Brasil (Rio Grande do Sul).

Triatoma (Eutriatoma) flavida transmite experimentalmente o *Schizotrypanum cruzi*, segundo HOFFMANN.

Triatoma (Eutriatoma) maculata, segundo EMANUEL DIAS e J. F. TORREALBA (1936), na Venezuela, infesta-se natural e experimentalmente pelo *Schizotrypanum cruzi*. Este *Trypanosoma* pode ser também transmitido pelo *Triatoma (Eutriatoma) oswaldoi*, segundo MAZZA (1936) e pelo *Triatoma (Eutriatoma) rubrovaria*, segundo GAMINARA (1923).

Esta última espécie, segundo PINTO (1938),

"vive nos muros e pedras e fre quente os currais, sugando os ovinos caprinos, canídeos e o homem no Rio Grande do Sul".

Triatoma (Eutriatoma) nigromaculata, não somente foi encontrado infectado na natureza, como também é capaz de transmitir, experimentalmente, o *S. cruzi*, conforme verificaram LENT e PIFANO (1939).

CARINI e MACÍEL encontraram, na natureza, *Triatoma (Eutriatoma) sordida* infestado pelo *Schizotrypanum*.



Fig. 379 - *Rhodnius prolixus*
Stal, 1859 (Triatominae)
(X 1,6).



Fig. 380 - *Panstrongylus megistus*
(Burmeister, 1835) (Triatominae).
(X 1,16).

Gênero **Triatoma** subgên. **Triatoma**

324. **Chave.**

- 1 Anel submediano dos fêmures e parte apical das tíbias de cor amarela *brasiliensis* Neiva, 1911; Brasil.
- 1' Femur e tíbias de cor uniforme, negra ou picea 2
- 2 (1') Connexivum de cor uniforme 3
- 2' Connexivum com partes claras (amareladas, alaranjadas ou avermelhadas) e escuras (geralmente negras) 5
- 3 (2) Connexivum de cor clara 4
- 3' Connexivum negro *mazzae* Jörg, 1937; Argentina.

- 4(3) Connexivum testáceo-amarelado; distância entre o limite externo dos olhos quasi igual (pouco menor) a da tomada da reta tangenciando o limite anterior dos olhos a ponta da cabeça (parte antecular) *breyeri* Del Ponte, 1929; Argentina.
- 4' Connexivum rubro; distância entre o limite externo dos olhos igual a 2/3 da tomada da reta tangenciando o bordo anterior dos olhos a ponta da cabeça. *spinolai*⁶⁰ Porter, 1933; Chile.
- 5(2') Margem do connexivum flavo-testácea ou testácea-avermelhada, as partes negras não atingindo o bordo
- 5' Margem do connexivum negra com máculas claras de cor testácea, alaranjada ou avermelhada 7
- 6(5) Margens laterais do pronotum de cor testácea-alaranjada ou avermelhada, continuando-se, em linha da mesma

⁶⁰ Quasi simultaneamente, Mazz, Tobar e Jörg (20 de março de 1940 e Neiva & Lent (13 de abril de 1940) descreveram 2 novos gêneros sul-americanos de Triatominae, ambos monobásicos, tendo, por tipos, barbeiros chilenos.

Os tres primeiros autores criaram *Mepraia* n. gên. para *Triatoma spinolai* Porter, 1933, por terem chegado à conclusão de, nesta espécie, as fêmeas serem totalmente ápteras, confirmando, assim, a observação anteriormente feita por Tobar (1939) de que as fêmeas adultas de *spinolai* são apteras.

Neiva e Lent, tendo recebido de Porter 5 formas adultas, micrópteras (3 machos e 2 fêmeas), apanhadas em Coquimbo por Tobar, e 1 macho de *Triatoma spinolai* (alado) concluíram que Tobar, dizendo ter observado que as fêmeas de *T. spinolai* não possuem asas e apresentam o conexivo desdobrado em duas folhas, provavelmente teve em mãos duas espécies: a descrita por Porter (*spinolai*) e a que descrevem com o nome de *Triatomaptera Porteri* n. sp., do novo género *Triatomaptera* Neiva e Lent, caracterizado "pela ausência de asas nos dois sexos, pela forma do pronoto e o aspecto do escutelo e pelas dimensões proporcionais dos artículos do rostro, bem como pela disposição do conexivo, em duas folhas, que faz lembrar o recente género *Dipetalogaster* Usinger, 1939".

Graças à gentileza de Lent, que me mostrou o material referido no trabalho publicado em colaboração com Neiva, pude, pela primeira vez, ver um exemplar de *Triatoma spinolai* (macho, alado) e compará-lo com os machos e fêmeas de *Triatomaptera porteri*. Tal cotejo me fez logo suspeitar que todas as formas examinadas deviam ser de uma só espécie, ocorrendo, pois, em *spinolai*, precisamente o que Jeannel refere para *Paredocla* Jeannel, 1914, género africano de Reduviinae, pelo menos com a espécie *Paredocla decorsei* Jeannel, 1914, representada por fêmeas ápteras e machos de 2 tipos, alados e ápteros, estes absolutamente semelhantes àquelas.

Imediatamente comuniquei a minha impressão, não somente a Neiva e Lent, como a Mazza, na carta em que lhe agradei a oferta do exemplar do seu trabalho.

Certamente, a questão será devidamente estudada pelos autores de *Mepraia* e de *Triatomaptera*, de modo a se poder concluir si se trata realmente de uma só espécie - como tudo parece indicar - ou se de espécies diferentes.

- cor, sobre a parte proximal do corium; superfície do torax granulada; ápice do scutellum não refletido
 *rubrofasciata* (De Geer, 1773);
 (= *variegatus* Drury, 1773; *gigas* Fabr. 1775; *claviger* Gmelin, 1788; *erythrozonias* Gmelin, 1788; *giganti* Klug, 1834; *stalii* Signoret, 1860); vários países da África, América, Ásia e Oceania. No Brasil foi assinalada em Belem, Baía, Rio de Janeiro e Santos.
- 6' Lobo posterior do pronotum fusco-testáceo; superfície do torax não granulada; espinho apical do scutellum um pouco refletido *recurva* (Stal, 1868); Brasil.
- 7(5') Margens laterais do pronotum de cor testácea-alaranjada ou avermelhada *sanguisuga* (Leconte, 1855) (= *lecticularius* Stal, 1859; *lateralis* Stal, 1859; *lenticularius* Stal, 1868) (Panamá, Estados Unidos) e *pintoi* Larrousse, 1926; Florida (Estados Unidos)⁶¹.
- 7' Margens laterais do pronotum de cor idêntica a do disco 8
- 8(7') Cada segmento do connexivum apresenta a mácula negra na base e a clara no ápice; assim, adiante de cada sutura intersegmental, a cor é clara e atrás é negra 9
- 8' Cada segmento do connexivum apresenta uma mácula clara entre duas partes negras, a posterior é, às vezes, relativamente estreita, porem, sempre separando a mácula clara da sutura intersegmental, que, nestas condições, fica sempre incluída na parte negra 10
- 9(8) Hemelitros claros, exceto a membrana, a parte basal do c lavus, o ápice e um ponto negro do corium, que são de cor negra *dimidiata* (Latreille, 1811): América Central, Venezuela.
- 9' Hemelitros claros, exceto a membrana, o clavus em sua maior extensão, o ápice e uma faixa transversa do corium *maculipennis* (Stal, 1859)⁶²; México e Nicaragua.
- 10(8') Pronotum de cor uniforme, negra ou parda escura 11
- 10' Pronotum com áreas claras 12

⁶¹ *T. pintoi*, segundo Larrousse, distingue-se de *T. sanguisuga* por ser menor e mais delgado e por ter o torax menos dilatado atrás.

⁶² Segundo Neiva (1914), provavelmente uma variedade de *dimidiata*.

- 11(10) Áreas claras do connexivum pouco extensas, estranguladas ou interrompidas; corpo revestido de densa pilosidade dourada; pernas sem áreas claras
 *platensis* Neiva, 1913; Argentina e *rosenbuschi* Mazza, 1936, Argentina⁶³.
- 11' Áreas claras do corium mais extensas; corpo não tomentoso; trocanteres e base dos fêmures de cor amarela (fig.384) *infestans* (Klug. 1834); (= *renggeri* Herrick-Schaeffer, 1848; *sextuberculatus* Spinola, 1852; *paulseni* Philippi 1860; *gracilipes* Philippi, 1860; *octotuberculatus* Philippi, 1860; *nigrovarius* Railliet 1893); Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Perú e Uruguai.
- 12(10') Cabeça completamente negra; pronotum apresentando apenas 2 máculas, claras, pequenas no lobo posterior
melanocephala Neiva & Pinto, 1923: Norte do Brasil.
- 12' Cabeça com faixa clara em cima, mais ou menos visível, pronotum com várias faixas ou máculas claras no lobo posterior. *vitticeps* Stal, 1859 (a meu ver *chagasi* Brumpt & Gomes, 1914 em nada difere desta espécie).

PINTO afirma que *Triatoma (Triatoma) dimidiata* transmite o *Schizotrypanum*, segundo SEGOVIA & HURTADO. LENT (1939), porém, cita REICHENOW (1934) como sendo o autor da verificação da infestação natural do inseto pelo *Schizotrypanum*.

Também LENT (1939) refere à CHAGAS e MACHADO, in CHAGAS, 1912, a observação da infestação experimental de *T. infestans* pelo *Schizotrypanum*, quando PINTO (1930) informa que o citado "barbeiro" transmite-o segundo A. NEIVA, CARINI & JESUINO MACIEL.

Podem também transmitir o *Schizotrypanum cruzi*:

Triatoma. (Triatoma) platensis, segundo MAZZA e SCHREIBER (1938); *Triatoma (Triatoma) rosenbuschi*, segundo MAZZA (1936); *Triatoma (Triatoma) rubrofasciata*, segundo

⁶³ Mazza (1936), distingue *T. rosenbuschi* de *T. platensis*, principalmente, pela ausência da pilosidade tão característica desta espécie. Neiva e Lent (1936), porém, consideram-no idêntico a *platensis*. Mazza, em publicação ulterior, do mesmo ano, chama a atenção para as diferenças entre *platensis* e *rosenbuschi*.

NEIVA, *Triatoma (Triatoma) spinolai* Porter, 1933, segundo GAJARDO TOBAR (1939) e *Triatoma (Triatoma) vitticeps*, segundo NEIVA (1914) e BRUMPT & GOMES (1914).




Fig. 381 - *Panstrongylus megistus* (Burmeister, 1835), fêmea (Triatomidae) (X 3,5).

A biologia do *Triatoma brasiliensis*, segundo NEIVA encontrado em domicílios, nas locas de mocós (*Cerodon rupestris*) e nos chiqueiros, foi estudada por C. PINTO (1924), que antes (1923) já o encontrara infestado na natureza.



Fig. 382 - *Triatoma* (*Eutriatoma*) *sordida* (Stal, 1859) (Triatominae) (x 2,5).



Fig. 383 - *Triatoma* (*Eutriatoma*) *tibiamaculata* (Pinto, 1926) (Triatominae) (X 1,6).

Subfamília SPHAERIDOPINAE⁶⁴

(*Sphaeridopidae*)

325. **Caracteres e espécies que a constituem.** - Pequena subfamília constituída exclusivamente por espécies da região neotrópica, relativamente robustas, que lembram os Saliavatineos pelo aspecto da cabeça não prolongada adiante dos olhos. Todavia, nos insetos desta subfamília, os segmentos abdominais não são lateralmente espinhosos, o rostrum é curto, reto e muito fino e os olhos são grandes, globulosos, salientes, pouco afastados em cima e quasi se tocando em baixo.

⁶⁴ Gr. *sphaira*, esfera; ops, olho.

Das poucas espécies que constituem esta subfamília citarei apenas: *Sphaeridops amaenus* Le Pelletier & Serville, 1825 (= *S. pallescens*, Walker, 1873); *Veseris rugosicollis* (Stal, 1858) (= *Sphaeridops inermis*, Mayr, 1865 e *Limaia ruber* Pinto, 1927), do Brasil e *Volesus nigripennis* Champion, 1899, da Costa Rica.

Subfamília REDUVIINAE

(*Spongípedes*, partim; *Acanthaspididae*⁶⁵, pro parte;
Reduviini)

326. **Caracteres e espécies mais interessantes.** - Espécies, em geral, de porte médio (às vezes, porem, com alguns milímetros de comprimento) e de forma oval mais ou menos alongada.

Cabeça com impressão transversal ou constrição anular atrás dos olhos; antenas com o 1ª segmento mais curto que o 2ª, rostrum mais ou menos robusto e, em repouso, formando um ângulo, curvilíneo com o perfil inferior da cabeça; scutellum geralmente terminando em processo ou espinho mais ou menos alongado; hemelitros, quando bem desenvolvidos, deixando visível o connexivum em toda a sua extensão. Espécies exclusivamente predadoras.

A região neotrópica, conquanto não seja tão rica em gêneros e espécies de Reduviíneos como outras regiões faunísticas, possui, entretanto, alguns gêneros que lhe são exclusivos, como *Spiniger* Burmeister, 1835, com perto de 100 espécies, algumas bem interessantes por mimetizarem vespas do gênero *Pepsis* (Fam. Psammocharidae).

Dentre as espécies mais interessantes deste gênero devo mencionar às pertencentes ao subgênero *Opisthacidius* Berg.

Spiniger (*Opisthacidius*) *domesticus* Pinto, 1927, segundo observação de CEZAR PINTO (1927) feita em Mato

⁶⁵ Gr. *acantha*, espinho; *aspis*, escudo.

Grosso, encontra-se nas frestas das paredes de barro de ranchos situados na região do pantanal e aí vive sugando baratas (*Periplaneta americana*).

L. TRAVASSOS observou, em Angra dos Reis (E. do Rio), idênticos hábitos predadores do *Spiniger* (*Opisthacidius*) *rubropictus* (Herrich-Schäffer, 1848).



Fig. 384 - *Triatoma* (*Triatoma*) *infestans* (Klug. 1834) (de Jörg, 1937, fig. 1) (Cerca de X 3).

Tive o ensejo de determinar formas jovens e adultas de *Spiniger steini*, encontradas em São Paulo pelo Dr. LAURO TRAVASSOS e pelo Eng. Agr. ARISTOTELES SILVA, dentro de cupinzeiros de *Cornitermes* sp.

O gênero *Leogorrus* Stal, 1859, com um menor número de espécies, possui, entretanto, algumas, como *L. litura* (Fabr., 1787) e *L. formicarius* (Fabr., 1803), frequentemente encontrados em nosso país.




Fig. 385 - *Sphaeridops amaenus* (Le Pelletier & Serville, 1825) (Sphaeridopinae); 1, cabeça, pronotum e scutellum; 2, cabeça de perfil (De Pinto, 1927).

Outros gêneros de menor importância, sob o ponto de vista numérico das espécies que os constituem, apresentam caracteres os mais díspares, verificando-se com eles o que disse JEANNEL. (1919), relativamente às afinidades destes insetos:

"Le groupe des Reduviini est extrêmement complexe et les affinités de chaque genre s'exercent toujours dans plusieurs directions avec plusieurs genres à la fois."

Pertencem a esta subfamília o gênero *Microlestria* Stal, 1872 com espécies de pequeno porte (algumas, como *M.*

fuscicollis (Stal, 1858), com cerca de 5 mm. de comprimento) e o gênero *Aradomorpha*, extremamente curioso, pois as espécies que o formam, além de apresentar o fácies de Aradidae, diferem dos demais Reduviídeos por terem, em todos os tarsos, apenas dois artículos. Numa pequena coleção de Reduviídeos do Sul do Brasil, tive o ensejo de encontrar um representante de *Aradomorpha*, diferente, entretanto, de *Aradomorpha crassipes* Champion, 1899, espécie tipo do gênero, encontrada no Panamá. Descrevi-a com o nome *Aradomorpha Chinai*.




Fig. 386 - *Telenomus fariai* (Lima, 1928), fêmea (Hym., Scelionidae) (X 45).

Subfamília CETHERINAE⁶⁶

(*Cetherini*)

327. **Caracteres e representantes.** - Pequena subfamília com representantes na África e na América, de aspecto característico, por apresentarem cabeça transversal, olhos pedunculados e fronte escavada entre eles (fig. 390).

⁶⁶ Hebr. *cether*, diadema.

As espécies americanas pertencem ao gênero (*Caridomma* Bergroth, 1891 (= *Macrophthalmus* Laporte, 1832, *Macrops* Burm., 1845. ambos nomes preocupados; *Sorglana* Kir-Kaldy, 1900).




Fig. 387. - *Vescia spicula* Stal, 1872, parte anterior do corpo, vista de cima e de perfil (X 12).

Subfamília SALYAVATINAE ⁶⁷

328. **Caracteres e representantes.** - Esta subfamília, na América, é exclusivamente representada pelo gênero *Salyavata* Amyot & Serville, 1843, com duas espécies: *S. variegata* Amyot & Serville, 1843 e *S. nigrofasciata* Costa Lima, 1935 (fig. 391).

Em ambas os tubérculos anteníferos apresentam-se mais ou menos salientes adiante dos olhos; estes são relativamente grandes, globulosos, porem, não tão grandes como nas espécies de Sphaeridopinae, as quais, aliás, não têm os tarsos anteriores dímeros como em Salyavatinae.

⁶⁷ Sanser. *salya*, porco-espinho; *vata*, como.

Subfamília VESCIINAE

329. **Espécies que a constituem.** - Esta subfamília foi proposta por FRACKER e BRUNER (1924) para *Vescia spicula* Stal, 1872, colocada por STAL em Reduviinae (= *Acanthaspidae*) (fig. 387).

Alem da espécie genotipo, encontrada no Brasil e no Perú, FRACKER e BRUNER (1924) estudaram mais uma espécie - *Vescia mínima*, de Tefé (Amazonas) e HAVILAND (1931), descreveu *V. adamant*, da Guiana Inglesa.



Fig. 388 - *Spiniger (Spiniger) femoralis* Stal, 1854 (X 2,2) Reduviinae.

Subfamília PIRATINAE⁶⁸

(*Spongipèdes*, partim; *Piratidae*)

330. **Caracteres e espécies mais interessantes.** - Os Reduvidos desta subfamília distinguem-se dos demais por

⁶⁸ Gr. *peirates*, pirata. O gênero tipo desta subfamília é *Peirates* Serville, 1831, nome cuja grafia foi reformada em 1835, por Burmeister, para *Pirates*

terem a constrição interlobular (sulco transversal do pronotum), mais aproximada da borda posterior que da anterior (figs. 392 e 393).

As espécies mais frequentemente encontradas em nosso meio pertencem aos gêneros *Melanolestes* Stal, 1866, *Rasahus* Amyot & Serville, 1843 e *Sirthenea* Spinola, 1840.



Fig. 389 - *Spiniger* (*Opisthacidius*) *rubropictus* Herrich-Schaeffer) (X 2,2)
(Reduviinae).

Ao primeiro pertence *Melanolestes picipes* (Herrich-Schäffer, 1818). Reduviídeo todo negro, de vasta distribuição geográfica e bem conhecido pela forte dor de suas picadas.

Do gênero *Rasahus* a espécie mais conhecida, de Flórida a Argentina, é o *R. hamatus* (Fabr., 1781).

Outra espécie, não menos frequentemente observada em quasi toda a América do Sul, é *Sirthenea stria* (Fabr., 1794).

Na fig. 393 reproduzo a figura de *Rasahus limai* Pinto, 1935, da República Argentina.

Recentemente TAUEBER (1934) descreveu *Eldmannia attaphila* n. gen., n. sp., encontrado na Bolívia, dentro de um formigueiro de sauva.



Fig. 390 - *Caridoma pallens* (Laporte, 1832) (Cetherinae) (X 2,8)

Subfamília ECTRICHODIINAE⁶⁹

(*Ectrichodidae*)

331. **Caracteres e principais representantes.** - Os Reduviídeos desta subfamília, que, como os da subfamília seguinte, apresentam escutelo bífido ou trífido no ápice, ou, como diz STAL, com o ápice emarginado ou truncado e lateralmente mucronado, são, em geral, insetos de corpo robusto e glabro, cujas antenas, quando têm mais de quatro segmentos (6, 7, 8), é porque apresentam o 3° ou o 4° segmentos, subdivididos (fig. 394).

Subfamília de vasta distribuição geográfica com muitos representantes em todas as regiões tropicais, alguns deles

⁶⁹ Gr. *ec*, de; *trix*, pelo.

com fêmeas ápteras e sem ocelos, outros, porém, com machos e fêmeas ápteras.

No Brasil as espécies mais frequentemente encontradas pertencem aos gêneros *Pothea* Amyot & Serville, 1843, *Brontostoma* Kirkaldy, 1904 (= *Mindarus* Stal, 1859) e *Rhiginia* Stal, 1859 (= *Ectrichodia* Stal, 1872).



Fig. 391 - *Salyacata nigrofasciata*
Lima, 1935 (Salyavatinae) (X 4).



Fig. 392 - *Melanolestes picipes*
(Herrich-Schaeffer, 1848)
(Piratinae); cabeça, pronotum
e scutellum (X 8).

Subfamília MICROTOMINAE⁷⁰

(*Hammaloceridae*⁷¹; *Hammatocerinae*; *Hammacerinae*)

332. **Caracteres e representantes.** - Subfamília bem característica pelo aspecto das antenas, que apresentam o 2º segmento subdividido em oito ou cerca de 40 pequenos artí-

⁷⁰ Gr. *micros*, pequeno; *tome*, segmento.

⁷¹ Gr. *hamma*, nó; *keras*, corno (antena).

culos, como nas antenas de uma barata, e pelo scutellum bífido no ápice. É exclusivamente representada por espécies americanas distribuídas em dois gêneros: *Microtomus* Illiger, 1807 (= *Hammacerus* Laporte, 1832; *Hammatocerus*




Fig. 393 - *Rasahus limai* Pinto, 1935 Piratinae (De Pinto, 1935).

Burmeister, 1835), com o segundo segmento subdividido em cerca de 40 artículos e *Homalocoris* Perty, 1834, ambos com poucas espécies (figs. 395 e 396).

Para o estudo de *Microtomus*, ver COSTA LIMA (1935).

Subfamília APIOMERINAE⁷²*(Apiomeridae)*

333. **Caracteres e espécies mais interessantes.** - Nas espécies desta subfamília os ocelos ficam atrás dos olhos, porem muito afastados um do outro. Os tarsos anteriores, como os demais, muito pequenos, são recebidos numa chanfradura ou foveola situada no ápice das tíbias, que são relativamente longas e arqueadas. Geralmente as pernas e o corpo são revestidos de pilosidade abundante, que dá a estes insetos um aspecto aveludado (figs. 397 e 398).




Fig. 394 - Scutellum de *Brontostoma rubrum* (Amyot & Serville 1843) (Ectrichodiinae) (X 10).

No Brasil os gêneros mais importantes da subfamília, pelo número de espécies que possuem, são *Apiomerus* Hahn, 1831 e *Heniartes* Spinola, 1840.

As espécies de *Apiomerus* (*A. picipes*, (Fabr., 1803), *A. lanipes* (Fabr., 1803), são, em geral, Reduviídeos relativamente robustos.

Um são predadoras de insetos pragas, como *Apiomerus flavipennis* Herrich-Schaeffer, 1848, que, segundo observação de CARLOS REINIGER é um eficiente predador de *Mormidea poecila* no Rio Grande do Sul. Outras tornam-se nocivas por atacarem espécies úteis. Eis o caso de *Apiomerus nigrilobus* Stal, 1872, segundo RONNA, um sério inimigo da abelha *Apis mellifica* L.

URIBE conseguiu infestar experimentalmente *Apiomerus pilipes* pelo *Schizstrypanum cruzi*.

⁷² Gr. *apios*, longa; *meros*, coxa.

Subfamília ZELINAE

(*Reduviina*; *Harpactoridae*⁷³; *Harpactorinae*; *Zelidae*)

334. **Caracteres e espécies mais interessantes.** - É esta a maior subfamília de Reduviidae, pois que a constituem mais de 800 espécies, em grande parte habitantes da região neotrópica.

Quasi todas apresentam o 1º segmento antenal muito mais longo que a cabeça e as garras tarsais com apêndice ou dente mais ou menos visível.




Fig. 395 - Antena de *Microtomus Pintoi* Costa Lima, 1935 (Microtominae)

Alguns Zelineos têm alguma importância econômica, por atacarem especialmente insetos pragas das plantas cultivadas.

Dentre as espécies mais frequentemente encontradas, ha a citar:

Zelus (Diplocodus) armillatus (Lepeletier & Serville, 1825), *Zelus (Diplocodus) leucogrammus* (Perty, 1834), ambas da tribo Zelini (figs. 399 e 400) e *Heza insignis* Stal, 1859, da tribo Harpactorini (fig. 401). Desta tribo são bem interessantes as espécies de *Arilus* Burmeister, 1835 (*A. carinatus* (Forster, 1771) (= *serratus* Fabr., 1775), que são

⁷³ Gr. *arpacter*, predador.

bastante robustas e exibem uma crista conspícua, vertical, no lobo posterior do pronotum, com número de dentes variável nas espécies⁷⁴ (fig. 403).

Não menos curiosas são as espécies de *Notocyrtus* Burmeister, 1835 (= *Saccoderes* Spinola, 1840)⁷⁵, pela dilatação vesiculosa, mais ou menos conspícua, do lobo posterior do pronotum. Em Sava Amyot & Serville a dilatação, torácica prolonga-se até perto da extremidade do abdomen; em *Notocyrtus* estende-se tanto para trás, sobre o escutelo, como para diante, sobre o bordo anterior (fig. 402).




Fig. 396 - Scutellum de *Microtomus conspicillaris* (Drury, 1782) (Microtominae) (X 10).

Devo finalmente citar os gêneros *Hiranetis* Spinola, 1840 e *Graptocleptes* Stal, 1866, ambos exclusivos da região neotropical e interessantes porque as respectivas espécies mimetizam Himenopteros da superfamília Ichneumonoidea.

335. Bibliografia.

AUTUORI, M.

1932 - Contribuição para o estudo biológico de *Eutriatoma flavida* (Neiva).

Rev. Ent. 2:269-275, 6 figs.

⁷⁴ Daí o nome *Prionotus* dado por Laporte a estes insetos (de *prion*, serra. o *notos*, dorso).

⁷⁵ Gr. *saccos*, saco; *dere*, colo.

BARBER, H. G.

- 1930 - Essay on the subfamily Stenopodinae of the New World.
Entomol. Amer. 10 (n. s.):149-238.
- 1937 - A new bat-cave bug from Panama (Hemiptera Heteroptera: Reduviidae).
Proc. Ent. Soc. Wash., 39:60-63, 1 fig.
- 1938 - A new genus and species of the subfamily Triatominae Reduviidae: Hemiptera).
Proc. Ent. Soc. Wash. 40:104-105.

BARRETO, A. L. DE BARROS

- 1922 - Notas entomológicas, I.
Brasil Médico, A. 33(21):161-162.
- 1922 - Notas entomológicas, II.
Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 15:127-130, ests 8-12.

BEQUAERT, J.

- 1926 - Medical and economic entomology.
In Medical Report of the Hamilton Rice 7 th Expedition to the Amazon.
Contr. Harvard. Inst. Trop. Biol. e Med. 4:157-257, c/figs.

BERGROTH, E.

- 1911 - A new genus of Reduviidae.
Psyche,18:144-145 ...

BRUMPT, E.

- Précis de Parasitologie.

BRUMPT, E. & GOMES, J. F.

- 1914 - Descrição de uma nova espécie de Triatoma (T. Chagasi) hospedeiro primitivo do Trypanosoma cruzi.
Ann. Paul. Med. Cirur. 3:73-77, 1 fig.

BRUMPT, E. & GONZALEZ-LUGO.

- 1913 - Presentation d'un Réduvide du Vénézeuela, le Rhodnius prolixus, chez lequel evolue Trypanosoma cruzi.
Bull. Soc. Path. Exot. 6:382-383.

BRUNER, S. C.

- 1926 - Sinópsis de los Reduidos de Cuba (Hemiptera Heteroptera).
Mem. Soc. Cub. Hist. Nat. 7:65-82, 1 fig.

BRUNER, S. C. & FRACKER, S. B.

1926 - Notes on Cuban Reduviidae.

Ann. Ent. Soc. Amer. 19:247-251, 1 fig.

BUXTON, P. A.

1930 - The biology of a blood-suckingbug *Rhodnius prolixus*.

Trans. Ent. Soc. London; 227-236, 1 fig.




Fig. 397 - *Apiomerus lanipes* (Fabr., 1803) (Apiomerinae) (X 2,8).

CARINI, A. & MACIEL, J.

1914 - Distribution des Triatomas dans l'État de São Paulo.

Bull. Soc. Path. Exot. 7:292-295, 1 mapa.

1915 - Sobre o hematofagismo do *Apiomerus nigrilobus* Stal.

Bras. Med. 29 (12) :89-90.

CHAGAS, C.

- 1909 - Nova tripanosomiase humana, Estudo sobre a morfologia e o ciclo evolutivo do *Schizotrypanum cruzi* n. gen., n. sp., agente etiológico de nova entidade mórbida do homem.
Mem. Inst. Osw. Cruz 1:159-218, figs 1-10, ests. 9-13.
- 1912 - Sobre um tripanosoma do tatú (*Tatusia novemcincta*) transmitido) pela *Triatoma geniculata* (Latr, 1811).
Possibilidade de ser o tatú um depositário do *Trypanosoma cruzi* no mundo exterior (Nota prévia).
Bras. Med. 26(30):305-306.

CLARK, N.

- 1935 - The effect of temperature and humidity upon the eggs of the bug *Rhodnius prolixus* (Heteroptera, Reduviidae).
Jour. Animal. Ecol. 4:82-87, 2 figs.

DIAS, E.

- 1938 - Criação de Triatomídeos no laboratório.
Mem. Inst. Osw. Cruz, 33 :407-412, 4 ests.

DIAS, & TORREALBA, J. F.

- 1936 - Breve nota acerca del *Triatoma* ou *Eutriatoma maculata* (Erichson 1848) Pinto, 1931. Comprobación de su infestación en la naturaleza por *Schizotrypanum cruzi*.
Gac. Med. Caracas 43:377-379.
- 1938 - Infecção natural do *Eutriatoma maculata* pelo *Schizotrypanum cruzi* no Brasil e na Venezuela.
Mem. Inst. Osw. Cruz, 33:249-252, 1 est., 1 fig.

DISTANT.

- 1902 - Rhynchotal notes. - Vários artigos publicados em
Ann. Mag. Nat. Hist. 10.

DUNN, L. H.

- 1933 - A natural infection of *Trypanosoma cruzi* Chagas found in *Rhodnius pallescens* Barber in Panama.
Amer. Jour. Trop. Med. 13:471-473.
- 1934 - Notes on the Reduviid bug, *Eratyrus cuspidatus* Stal, naturally infested with *Trypanosoma cruzi* Chagas form in Panama.
Amer. Jour. Trop. Med. 14:291-292.

FERREIRA, L. de CASTRO & DEANE, L.

- 1938 - Infecção experimental de *Rhodnius pictipes* Stal, 1871 pelo *Schizotrypanum cruzi* (Chagas, 1909).
Bras. Med. 52(49): 1093, 1 fig.

FRACKER, P. P.

- 1912 - A sytematic outline of the Reduviidae of North America.
Proc. Iowa Acad. Sci. 19:217-252.



Fig. 398 - Tarso anterior de *Apiomerus lanipes*
(*Apiomerinae*) (X 15).

FRACKER, S. B. & BRUNER, S. C.

- 1924 - Notes on some Neotropical Reduviidae.
Ann. Ent. Soc. Amer. 17:163-174, 1 fig.

GALLIARD, H.

- 1934 - Rôle de la mue embryonnaire des Réduvidés hématophages dans le processus d'éclosion.
Ann. Parasit. Hum. Comp. 12:345-349, 2 figs.
1935 - Recherches sur les Reduvidés hematophages *Rhodnius* et *Triatoma*.
Ann. Parasit. Hum. Comp. 13:289-306, 9 figs.;
401-423. 15 figs.

GAMINARA, A.

- 1933 - Estudio experimental sobre *Schizotrypanum cruzi* y enfermedad de Chagas en el Uruguay.
An. fac. Med. Montevideo, 8:311-359, ests 1-9.

GILLETT, J. D.

- 1935 - The genital sterna of the immature stages of *Rhodnius prolixus* (Hemiptera) .
Trans. Roy Ent. Soc. Lond. 83:1-5, 2 figs.

HASE, A.

- 1932 - Beobachtungen an venezolanischen *Triatoma* Arten, sowie zur allgemeinen Kenntnis der Familie der

Triatomidae (Hemipt.-Heteropt.).

Zeits. f. Parasitek. 4:585-652, 1 est., 26 figs.

- 1932 - Ueber Starrezustände bei blutsaugenden Wanzen I. Mitteilung betr. *Pan strongylus* (*Triatoma*).
Naturwissenschaften, 20:907-971, 7 figs.
- 1933 - Ueber die Lauterzeugung sowie deren mutmassliche Bedeutung bei der Wanze *Panstrongylus* (Hemiptera- U. Familie Triatomidae).
Biol. Zbl. 53: 607-614, 2 figs.



Fig. 399 - *Zelus* (*Diplocodus*)
leucogrammus (Perty, 1834)
(Zelinae) (X 2).




Fig. 400 - Ovos de *Zelus* (*Diplocodus*)
leucogrammus. Alguns dos ovos ainda
estão arolhados. Ao lado da postura,
vê-se, em maior aumento, o aspecto de
um operculo (a parte que fica ex-
posta, a chava-se um tanto deprimida,
normalmente, porém, é como se ve na
postura, isto é, lembrando, a rolha de
uma garrafa) (X 8).

- 1933 - Ueber Starrezustände bei blutsaugenden Insekten,
insbesondere bei Wanzen. II Mitteilung. betr. *Pan-
strongylus* (*Triatoma*) *geniculatus* Pinto, 1931 (Hem).
Zeits. f. Parasitenk. 5:708-723, 8 figs,

- 1933 - Zur Fortpflanzungsphysiologie der blutsaugenden Wanze *Rhodnius pictipes* (Hemiptera. Heteropt., Beiträge zur experimentellen Parasitologie. Zeits. f. Parasitenk. 6:129-144, 5 figs.

HAVILAND, M. D.

- 1931 - The Reduviidae of Kartabo, Bartica District, British Guiana. Zoologica (N. Y.) 7:129-154, 2 ests.

HOFFMANN, W. H.

- 1936 - Die Brutflege bei den Wazen. Arb. physiol. angew. Ent. Berlin-Dahlem, 3:286-288, 2 figs.

HUSSEY, R. F.

- 1922 - A bibliographical notice on the Reduviid genus *Triatoma* (Hemip.). Psyche, 22 :109-123.

IRAGORRY, L. B.

- 1934 - Contribución al estudio morfológico de los huevos de alguns Reduvidos. Bol. Soc. Venez. Cien. Nat. 18:397-400, 1 est.

JEANNEL, R.

- 1913 - Henicocephlidae et Reduviidae, in Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique Occidentale (1911-1912). Result. Scient.-Insectes Hémiptères III :131-314, 30 figs. no texto e ests. 5-12. Paris: L. Lhomme.

JÖRG, M. E.

- 1937 - *Triatoma mazzae* nova espécie de Triatomidae (Hemiptera Heteropt., Reduvidae), de Argentina. Mis. Estud. Patol. Reg. Argent. Jujuy, 33:33-47, 15 figs.

LARROUSSE, F.

- 1927 - Étude biologique et systématique du genre *Rhodnius* Stal (Hémiptère, Reduviidae). Ann. Parasit. 5:63-88, 9 figs.

LENT H.

- 1935 - Sobre a biologia, sistemática e distribuição geográfica do *Psammolestes coreodes* Bergroth, 1911, encontrado em ninhos de aves no Brasil (Hem. Triatomidae).
Rev. Ent. 5:381-396, 3 figs.

LENT H. & PIFANO, F.

- 1939 - *Eutriatoma nigromaculata* (Stal, 1872), n. comb., espécie venezuelana encontrada infestada pelo *Schizotrypanum cruzi* (Chagas, 1909) (Nota prévia).
Bras. Med., 53:685-686, 1 fig.

LENT, H.

- 1939 - Sobre o hematofagismo da *Clerada apicicornis* e outros artrópodos; sua importância na transmissão da doença de Chagas.
Mem. Inst. Osw. Cruz, 34:583-606, 4 figs.

LENT H. & PIFANO, F.

- 1939 - Dados experimentais sobre a infestação do *Eutriatoma nigromaculata* (Stal, 1872), pelo *Schizotrypanum cruzi* (Chagas, 1909) e sua redescoberta.
Mem. Inst. Osw. Cruz, 34 :627-635, 2 figs.

LIMA A. da COSTA

- 1928 - Notas sobre a biologia do *Telenomus fariai* Lima, parasito dos ovos de *Triatoma*.
Mem. Inst. Osw. Cruz, 21:201-218, 3 ests.
- 1934 - Sur l'existence, au Brésil, du *Psammolestes corcodes* Bergr. (Hemiptera-Reduviidae).
C. R. Soc. Biol. 116:1155-1156, 2 figs.
- 1935 - Not as Hemipterológicas.
Rev. Ent. 5:23-25, 2 figs.
- 1935 - Gênero *Microtomus* Illiger, 1807 (Reduviidae: Microtominae).
Ann. Acad. Bras. Sci. 7 :315-322, 1 est.
- 1940 - Sobre as espécies de Spiniger.
Mem. Inst. Osw. Cruz, 35:1-124, 17 figs. e 10 ests.
- 1940 - Sobre uma espécie brasileira de *Aradomorpha* Champion, 1899 (Reduviidae-Reduviinae).
Ann. Acad. Bras. Sci. 12:59-64. 5 figs.

Mc ATEE, W. L. & MALLOCH, J. R.

- 1923 - Notes on American Bactrodinae and Saicinae (Heteroptera : Reduviidae).
Ann. Ent. Soc. Amer. 16:247-253, 1 est.

MATTA, A. da

- 1919 - Notas para o estudo da Biologia do *Rhodnius brethesi* n. sp.
Amaz. Med. 2:104-107 e Bull. Soc. Path. Exot. 12:611.
- 1922 - Sobre o gênero *Rhodnius* no Amazonas.
Amaz. Med. 4(13-16) :161-162.

MAZZA, S.

- 1936 - Infestacion de *Triatoma* por *Schizotrypanum cruzi* y hallazgo de animales domésticos portadores del mismo en el sur de la República (Rio Negro y provincia de Buenos Aires). Nueva especie de *Triatoma* determinada en Rio Negro.
Mis. Estud. Patol. Reg. Argent. Jujuy, 26:1-19, 12 figs.
- 1936 - Ratificación de la identidad de *Triatoma rosenbuschi* Mazza, 1936.
Mis. Estud. Patol. Reg. Argent. Jujuy, 29:3-17, 9 figs.

MAZZA, S., BASSO, G. & BASSO, R.

- 1936 - Hallazgo de *T. platensis* en nidos de *Dendrocoletidae* de las provincias de Cordoba y Mendoza. Demonstración experimental de la capacidad de transmitir *S. cruzi* de esta especie de *Triatomideo*.
Mis. Estud. Patol. Reg. Argent. Jujuy, 29:18-21.

MAZZA, S. & JÖRG, M. E.

- 1937 - Posicion sistematica de *Eutriatoma* (*Triatoma*) *patagonica* (Del Ponte, 1929) nov. comb.
Mis. Estud. Patol. Reg. Argent. Jujuy, 30: 5-29, 20 figs.
- 1938 - Terceira nota sobre *Triatomidae* (Hemiptera Het. Reduvidae) argentinos.
Mis. Estud. Patol. Reg. Argent. Jujuy, 36:26-58, 21 figs. 6 ests.

MAZZA, S., TOBAR, R. GAJARDO & JÖRG, M. E.

- 1940 - Investigaciones sobre Triatomidae. *Mepraia novum* genus de Triatomidae. *Mepraia spinolai* (Porter) 1933, nov. comb., redescrición de macho y descripción de hembra.
Mis. Estud. Patol. Reg. Argent. Jujuy, 44:3-30, 27 figs.

MELLANBY, H.

- 1935 - The early embrionic development of *Rhodnius prolixus* (Hemiptera - Heteroptera).
Quart. Jour. Micr. Sci. (N. S.) 78:71-90, 1 est., 11 figs.

NEIVA, A.

- 1910 - Informações sobre a biologia do *Conorhinus megistus*.
Mem. Inst. Osw. Cruz, 2:206-212.
- 1911 - Contribuição ao estudo dos hematófagos brasileiros e descrição de uma nova espécie de *Triatoma*.
Bras. Med. 25 (46) :461-462.
- 1913 - Da transmissão do *Trypanosoma cruzi* pelo *Triatoma sordida* Stal.
Bras. Med. 27:498.
- 1913 - Informações sobre a biologia do vinchuca, *Triatoma infestans* Klug.
Mem. Inst. Osw. Cruz, 5:24-30.
- 1913 - Notas hemipterológicas.
Mem. Inst. Osw. Cruz 5:74-77.
- 1914 - Contribuição para o estudo dos reduvidos hematófagos da Baía com a descrição de uma nova espécie.
Mem. Inst. Osw. Cruz, 6:355.
- 1914 - Revisão do gênero *Triatoma* Lap. Trabalho original, especialmente elaborado e apresentado junto a outros títulos e publicações, etc.
Rio de Janeiro, 80 pp.

NEIVA, A. & PINTO, C.

- 1922 - Um novo hemíptero hematófago brasileiro (*Triatoma fluminensis* sp. n.).
Bras. Med. 36 (2) 51:402-403.
- 1923 - Estado atual dos conhecimentos sobre o gênero *Rhodnius* tal como a descrição de uma nova espécie.
Bras. Med. 37(1)4:20-24.

- 1923 - Dos Reduvidos hematófagos encontrados no Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro, com a descrição de uma nova espécie.
Bras. Med. 37(1)4:45.
- 1923 - Dos Hemípteros hematófagos do Norte do Brasil, com a descrição de duas espécies.
Bras. Med. 37(1)6:73.



Fig. 401 - *Heza insignis* Stal, 1898 (Zelinae) (X 2).

- 1923 - Representantes dos gêneros *Triatoma* Lap. e *Rhodnius* Stal encontrados no Brasil Central e Sul; observações biológicas e descrição de uma nova espécie.
Bras. Med. 37(1)7:84.
- 1923 - Chave dos reduvidos hematófagos brasileiros; hábitos, sinonimias e distribuição.
Bras. Med. 37(1)8:98.

NEIVA, A.

- 1928 - Sobre la presencia en Salta del *Spiniger domesticus* Cesar Pinto, Reduido insectivoro frequentemente encontrado en los domicilios.
Bol. Inst. Clin. Quirurg. 4:657-659, 1 est.

NEIVA, A. & LENT, H.

- 1936 - Notas e comentários sobre Triatomídeos. Lista de espécies e suas distribuição geográfica.
Rev. Ent. 6:153-190.

NEIVA, A. PINTO, C. & LENT, A.

- 1939 - Notas sobre triatomídeos do Rio Grande do Sul e descrição de uma nova espécie.
Mem. Inst. Osw. Cruz, 34:607-610, 2 figs.

NEIVA, A. & LENT, H.

- 1940 - Sobre um novo triatomídeo chileno: *Triatomaptera porteri*. Nota prévia.
Bras. Med. 54(15):265-267.

NIÑO, T. L.

- 1927 - Breve noticia sobre el *Triatoma infestans* en la República Argentina.
Rev. Soc. Ent. Argent., 2(4) :55-64, 3 ests.

PICADO, C.

- 1943 - Les Broméliacées épiphytes considérées comme milieu biologique.
Bull. Sci. Fr. Belg. 47:215-360.

PINTO, G.

- 1923 - O *Triatoma brasiliensis* Neiva transmite o *Trypanosoma cruzi* Chagas.
Bras. Med. 37 (6) :73,
- 1924 - Sobre um Reduviídeo transmissor do *Trypanosoma cruzi*.
Sci. Med. 2(8) :426-427, 1 fig.
- 1924 - Biologia do *Triatoma brasiliensis* Neiva.
Sci. Med. 2(10) :541, figs.
- 1925 - Uma nova espécie de barbeiro da Argentina (*Triatoma larroussei*).
Sci. Med. 3(7) :454.
- 1925 - Ensaio monográfico dos Reduviídeos hematofagos ou "barbeiros" (tese).
Publ. do Inst. Osw. Cruz, Rio de Janeiro, VII, 118 pp., 58 figs.
Publicado também em Sci. Med. 3: nos. 10, 11, 12 (de outubro, novembro e dezembro de 1925), p. 598, 688 e 748.

PINTO, C. & BARRETO, J. de BARROS

- 1925 - Uma nova espécie de barbeiro do Brasil (*Triatoma petrochii* n. sp.).
Sci. Med. 3(12) :769-770.

PINTO, C.

- 1926 - Hypopygio dos Triatomídeos (Hemípteros-Heteropteros hematófagos) e do gênero *Apiomerus*.
Bol. Biol. São Paulo, 2:27-33, 7 figs.
- 1926 - Triatomídeos da Venezuela, com a descrição de uma nova espécie do gênero *Eutriatoma* (*Eutriatoma*) *Arthuri* n. sp.
An. Fac. Med. São Paulo, 1:3p e Folha Médica, 1:85-87.
- 1926 - Sobre a presença do *Triatoma geniculata* na ilha de Trindade.
Sci. Med. 4(3) :133-136, 5 figs.
- 1926 - Classificação dos Triatomídeos (Hemíptera-Heteroptera hematófagos).
Sci. Med. 4(9) :485-490, 2 ests.
- 1926 - *Eutriatoma tibia-maculata* novo gênero e nova espécie; forma intermediária entre *Rhodnius* e *Triatoma*.
Sci. Med. 4(3):133-136, 5 figs.
- 1927 - *Sphaeridopidae*, nova família de Hemíptera Reduviídea, com a descrição de um gênero e uma espécie nova.
Bol. Biol. São Paulo, 6:43-51, figs., A-D.
- 1927 - *Crithidia spinigeri* n. sp. parasita do aparelho digestivo de *Spiniger domesticus* (Hemíptero Reduviídae).
Bol. Biol., 7:86-87, 1 fig.
- 1927 - Classification de genres d'Hémiptères de la famille Triatomidae (Reduviídea).
Bol. Biol. São Paulo, 8:103-114. 13 figs.
- 1927 - *Otiodyctylus signatus*, nouveau genre et nouvelle espèce d'Hémiptère suceur d'Insectes (Famille des Reduviídae, sous-famille des Reduviinae).
C. R. Soc. Biol., 97:846-848.
- 1927 - Nouveau genre et, nouvelle espèce d'Hémiptère suceurs d'insecte (Famille des Reduviídae, sous-famille des Reduviinae).
C. R. Soc. Biol. Paris, 97:846-848.

- 1931 - Triatomídeos, *in* Artrópodes parasitos e transmissores de doença, 1:173-234, (cit. 1ª tomo).
- 1931 - Valor do rostro e antenas na caracterização dos gêneros de Triatomídeos (Hemíptera. Reduvióidea).
Bol. Biol. São Paulo, 19:45-136, 70 figs., 1 quadro.
- 1935 - Hemípteros predadores de insetos, provenientes do Brasil e da Argentina.
Ann. Acad. Bras. Sci., 7:277-282, 4 figs.




Fig. 402 - *Notocyrtus inflatus* (Perty, 1834) (zelinae) (X 7).

PINTO, C. & LENT, H.

- 1935 - Sobre as espécies do gênero *Psammolestes* (Bergr, 1911) (Hemíptera-Triatomidae).
Ann. Acad. Bras. Sci., 7:333-337. 1 est., 5 figs.

PINTO, C.

- 1938 - Triatomídeos, *in* Zoo-parasitos de interesse médico e veterinário, 89-96 (cit. 1º tomo).

PONTE, E. DEL

- 1930 - Catálogo descriptivo de los géneros *Triatoma* Lap.), *Rhodnius* Stal y *Eratyrus* Stal.

Rev. Inst. Bact. Dept. Nac. Hig. Buenos Aires,
5:853-935, 25 figs. ests. 41-53.

- 1931 - Catálogo de los generos *Triatoma*, *Rhodnius*, *Eratyrus*.
Arch. Soc. Biol. Montevideo Suppl., 5:1308-1313.

PORTER, E. C.

- 1934 - Una *Triatoma* nueva chilena.
Rev. Chil. Hist. Nat. 37 (1933):192-193.
- 1939 - Notas de para sitologia.
Rev. Chil. Hist. Nat. 42(1938):122-124. ests 8.




Fig. 403 - *Arilus carinatus* (Fab., 1775) (Zelinae) (X 2.5).

READIO, P. A.

- 1926 - Studies on the eggs of some Reduviidae (Heteroptera).
Univ. Kansas, Sci. Bull., 16:157-179, ests. 9-11.
- 1927 - Studies on the Biology of the Reduviidae of America, North of Mexico.
Univ. Kansas Sci. Bull., 17:5-291.

SCHUMACHER, F.

- 1924 - Zwei überschene Hemipteren-Gattungen.
Deuts. Ent. Zeits., :336.

SEITZ.

- 1890 - Die Schmetterlingswelt des Monte Corcovado.
Ent. Zeits. Stett., 51:258-266.

STAL, C.

- 1850 - Monographie der Gattung Conorhinus und Verwandten.
Berl. Ent. Zeits., 3:99-117, ests. 6, figs. 1-4.
- 1866 - Bidrag till Reduviidernas Kannedom.
Oefv. Vet.-Ak. Förh., 23(9):235-302.

STICHEL, W.

- 1926 - Die Gattung Microtomus Illiger (Hem., Het., Reduv.)
Deuts. Ent. Zeits. :179-190, 5 figs. 1 est.

TAUEBER, H. W.

- 1934 - Ein neue attaphile Reduviide aus Südamerika.
Zool. Anz. 106:187-189.

TOBAR, R. GAJARDO

- 1939 - El Schizotrypanum cruzi y sus agentes vectores en Chile.
Rev. Chil. Hist. Nat. 42(1938) :132-137.

TODD, J. N.

- 1937 - Life history of the wheel bug (Arilus critatus (L.).
Ent. News., 48:226-228.

URIBE, C.

- 1926 - A new invertebrate host of Trypanosoma cruzi Chagas.
Jour. Parasit., 13:129-136, est. 7.
- 1927 - On the biology and life history of Rhodnius prolixus Stal.
Jour. Parasit., 13 :124-136, ests. 7.

USINGER, R. L.

- 1939 - Descriptions of new Triatominae with a key to genera (Hemiptera, Reduviidae).
Univ. Calif. Publ. Ent. 7(3):33-35, 1 est.
(Não pude consultar este trabalho.)

Família N A B I D A E⁷⁶*(Nabidae)*

336. **Caracteres.** - A família Nabidae compreende Hemípteros terrestres, de porte pequeno ou médio, corpo oblongo ou em oval alongada, que muito se assemelham aos da família Reduviidae, porem, deles se distinguindo facilmente por terem quatro segmentos no rostrum e não apresentarem no prosternum um sulco transversalmente estriado (*sulco estridulatório*).




Fig. 404 - *Aphelonotus simplex* Uhler, 1894 (Nabidae) (cerca de X 7).

Cabeça robusta, porem, mais curta que o pronotum; ocelos aproximados, grandes (Nabinae) ou muito pequenos (Prostemminae) às vezes, porem, ausentes em *Carthasis* Champion, 1900, *Neogorpis* Barber, *Pachynomus* Klug, 1830 e mesmo em algumas espécies de *Nabis*; rostrum curto e

⁷⁶ Lat. *nabis*, cordeiro selvagem.

robusto, de quatro segmentos, sendo o 1º muito curto, raramente de tres; antenas de quatro (Nabinae) ou cinco segmentos (Prostemminae).

Torax - Pronoto trapezoidal com constrição transversal dividindo-o em dois lobos, anterior e posterior, às vezes o lobo anterior apresenta uma outra constrição a alguma distância da margem anterior (Nabinae); hemelitos mais longos ou mais curtos que o abdomen. Algumas espécies são dimórficas quanto ao desenvolvimento dos hemelitos, possuindo formas macrópteras e micrópteras; naquelas o hemelito apresenta corium, clavus, membrana e algumas vezes embolium; membrana apresentando geralmente algumas nervuras longitudinais, às vezes formando tres longas células, das quais partem nervuras curtas e divergentes para a margem, limitando entre si várias células marginais; em alguns gêneros, porem, não ha nervuras distintas na membrana (v. fig. 405).




Fig. 405 - Asa de *Arachnocoris alboannulatus* Lima, 1927 (Nabidae) (X 18).

Pernas anteriores geralmente raptorais, com fêmures um tanto ou consideravelmente mais dilatados que nas outras pernas; tíbias providas de cerdas ou espinhos curtos; estas, em muitas espécies, apresentando larga fossa esponjosa no ápice; tarsos de tres artículos (em *Carthasis* os tarsos são uniarticulados)⁷⁷.

337. Hábitos, classificação e espécies mais interessantes.

- Os Nabideos são hemipteros predadores; sugam a hemo-

⁷⁷ Blatchley criou para este gênero uma nova subfamília - *Carthasinae* - incluindo-a em Reduviidae. Harris (1928), porem, demonstrou tratar-se de mais um grupo de Nabidae.

338. **Bibliografia.**

HARRIS, H. M.

- 1926 - Distributional notes on some neotropical bugs of the family Nabidae, with descriptions of a new species.
Proc. U. S. Nat. Mus. 69(2), n. 2.647, 4 ps.
- 1928 - A monographic study of the Hemipterous family Nabidae as it occurs in North America.
Ent. Amer. 9:1-90, 4 ests.
- 1928 - Anent Blatchley's Manual of Heteroptera with description of a new Nabid therefrom.
Bull. Brookl. Ent. Soc. 23:143-146.
- 1930 - Notes on some South American Nabidae, with descriptions of new species.
Ann. Carneg. Mus. 19:241-248
- 1931 - *Aphelonotus* (Hemiptera, Nabidae).
Bull. Brookl. Ent. Soc. 26:13-20, 1 est.
- 1931 - Nabidae from the State of Paraná.
Ann. Mus. Zool. pol. 9:179-185.
- 1939 - Miscelânea sobre Nabidae sudamericanus (Hemiptera).
Not. Mus. La Plata, 4 (Zool., 26) :367-377.

LIMA, A. da COSTA

- 1927 - Nota sobre as espécies do gênero *Arachnocoris* (Hemiptera, Nabidae).
Sci. Med., Rio de Janeiro, 5:541-544.

MEYERS, J. G.

- 1925 - Biological notes on *Arachnocoris albomaculatus* Scott (Hemiptera-Nabidae).
Jour. New York Ent. Soc. 33:136-146. 2 ests.

REUTER, O. M.

- 1873 - Nabidae novae et minus cognitae.
Oefv. K. Vet. Akad. Förh. 29:79-96.
- 1908 - Bemerkungen über Nabiden.
Mem. Soc. Ent. Belg. 15:87-130.

REUTER, O. M. & POPPIUS, B.

- 1909 - Monographia Nabidarum orbis terrestris.
Acta Soc. Sci. Fenn. 37(2):1-62.

Superfamília **POLYCTENOIDEA**⁷⁸

Família POLYCTENIDAE

339. **Caracteres e espécies mais interessantes.** - Família representada por insetos de alguns milímetros de comprimento, que se encontram no pelo de certos morcegos. Os exemplares mais desenvolvidos fazem lembrar, à primeira vista, outros ectoparasitos de morcegos, especialmente as espécies do gênero *Strebla* (Diptera: Streblidae), deles, porém, se distinguindo por terem um haustellum segmentado. Dos demais hemípteros os Polictenideos se diferenciam, sobretudo, pela presença de etenideos cefálicos e pela ausência de olhos e ocelos. Como nos Cimicideos, os adultos desta família apresentam o corpo achatado e hemelítrios reduzidos a um par de escamas, que mal encobrem a base do abdomen. Pernas anteriores curtas e relativamente robustas; médias e posteriores geralmente alongadas; tarsos trímeros, porém, aparentemente quadriarticulados, por ter o segmento intermediário uma pseudo articulação na parte basal.

A cabeça apresenta o clipeo bem desenvolvido, no qual se articula um labro grande, em forma de aba. Rostrum ou haustellum de quatro segmentos, porém, aparentemente constituído por tres segmentos subiguais, porque o segmento basal é extremamente curto.

As fêmeas dos Polictenideos são vivíparas e as formas imaturas que delas se originam, ao nascerem, apresentam-se em estágio bem adiantado de desenvolvimento.

Ha descritas cerca de 16 espécies de Polictenidae, distribuídas em cinco gêneros, dos quais *Hesperoctenes* Kir-kaldy, 1906 é o único constituído por espécies americanas.

No Brasil, além de *Hesperoctenes fumarius* (Westwood, 1874), encontra-se *H. impressus* Horvath, 1910 (? = *H.*

⁷⁸ Gr. *polys*, numerosos; *cteis*, pente.

fumarius, Costa Lima, 1920, ectoparasito de *Molossus perotis* (Wied).




Fig. 406 - *Hesperoctenes* sp; 1, labium; 2, foramen antenal; 3, ctenidio genal; 4, fosseta tentorial posterior; 5, região hipostomal; 6, ctenidio hipostomal; 7, condilo occipital; 8, prosternum; 9, apofise prosternal; 10, pronotum; 11, espiráculo; 12, mesosternum; 13, trocantino; 14, apofise mesosternal; 15, pleurito; 16, trocantino; 17, apofise metasternal; 18, metasternum; 19, 2° urosternito; 20, labrum; 21, clypeus; 22, sutura genal; 23, músculos faringígeos; 24, ctenideo occipital; 25, pronotum; 26, mesopleura; 27, espiráculo; 28, metapleura; 29, quadril II; 30, metanotum; 31, fragma; 32, 2° urotergito 33, 2° urotergito (De Ferris e Usinger, 1939, fig. 1).

340. Bibliografia.

FERRIS, G. F.

1919 - Some records of Polyctenidae (Hemiptera).

Jour. New York Ent. Soc. 27:261-263, est. 24, A-D.




Fig. 407 - *Hesperoctenes imprresus* Horvath, 1910, fêmea (Polyctenidae)
 1, região hipostomal; 2, região prosternal (De Ferris e Usinger, 1939, fig. 21).

FERRIS, G. F. & USINGER, R. L.

- 1939 - The family Polycytenidae (Hemiptera: Heteroptera)
Microentomology, 4(1):1-50, figs. 1-50.

HAGAN, H. R.

- 1931 - The embriogeny of the Polycytenid, *Hesperoctenes fumarius* Westwood, with references to viviparity in insects.
Jour. Morph. and Physiol., 51:3-118, 13 ests.

HORVATH, G.

- 1911 - Les Polycyténides et leur adaptation à la vie parasitaire.
Mém. Congr. Inter. Ent., Bruxelles, 1:249-256, est. 18.

JORDAN, K.

- 1912 - Contribution to our knowledge of the morphology and systematics of the Polycytenidae, a family of Rhynchota parasitic on bats.
Novit. Zool. 18:555-579, ests. 12-14.
1914 - On viviparity in Polycytenidae.
Trans. 2nd. Internat. Congr. Enton., 2:342-350.
1922 - The American Polycytenidae.
Ectoparasites, 1:204-215, figs. 199-208.

LIMA, A. da COSTA

- 1920 - Contribuição para o conhecimento dos insetos da família Polycytenidae (Hemíptera).
Arch. Esc. Sup. Agric. Med. Vet. 4:61-76, est. 17.

SCHWENK, J.

- 1935 - Descrição de um *Hesperoctenes* (fam. Polycytenidae).
Ann. Fac. Med. Univ. S. Paulo, 11:37-42, 2 figs.

SPEISER, P.

- 1909 - The Hemipterous family Polycytenidae.
Rec. Ind. Mus. 3:271-274.

Superfamília CIMICOIDEA

341. **Caracteres, etc.** - Os Hemípteros desta superfamília distinguem-se dos demais por terem hemelítrios providos de cuneus e, quasi sempre, de embolium; a membrana, ora se apresenta sem nervuras, ora com poucas nervuras, em

geral livres ou formando, na base, uma ou duas células desiguais.

Não apresentam tal conjunto de caracteres os representantes da família Cimicidae, que alguns autores consideram como verdadeiros e exclusivos representantes da superfamília Cimicoidea, constituindo as espécies aladas acima referidas, uma superfamília à parte - **Miroideae** Kirkaldy, 1906.

Antenas mais longas que a cabeça, de quatro segmentos, sendo os dois últimos setiformes e vilosos, às vezes, porem, distintamente espessados; ocelos presentes (Anthocoridae, Isometopidae e Microphysidae), ou ausentes (Teratophylidae e Miridae); rostrum geralmente de quatro segmentos (de tres em Anthocoridae); scutellum distinto, triangular, pequeno, às vezes, porem, em alguns (Isometopideos), estendendo-se até o meio do abdomen; hemelitos das formas macrópteras (figs. 223 e 225), apresentando cuneus e embolium, este, porem, nem sempre distinto; membrana sem nervuras, ou com poucas nervuras, livres ou formando uma ou duas células basais desiguais; tarsos geralmente trímeros (dímeros em Microphysidae) e, excetuando Miridae, desprovidos de arólio; nas fêmeas os últimos segmentos ventrais apresentam-se com fenda longitudinal, na qual se aloja o ovipositor.

342. **Classificação.** - Esta superfamília, depois de Scutelleroidea, é a maior na ordem Hemiptera, compreendendo cerca de 4.500 espécies, distribuidas nas seguintes famílias: **Velocipedidae, Cimicidae, Anthocoridae, Isometopidae, Microphysidae, Teratophylidae e Miridae.**

A família Velocipedidae é constituída por algumas espécies do gênero *Velocipeda* Bergr., habitantes da região Indomalaia.

As famílias Teratophylidae, Microphysidae e Isometopidae são também formadas por um pequeno número, de espécies, das quais muito poucas vivem na América.

Assim, apenas nos interessam Cimicidae, Anthocoridae e Miridae, que se distinguem pelos caracteres mencionados na chave seguinte:

- 1 Insetos de corpo ovalar, achatado, com os hemelitos rudimentares, sob a forma de escamas, apresentando um tylus robusto, oblongo, alargado na parte apical; percevejos de cama e outras espécies hematófagas encontradas em ninhos de morcego e de aves **Cimicidae**
- 1' Insetos com outros caracteres 2
- 2(1') Ocelos presentes; rostrum de 3 segmentos **Anthocoridae**
- 2' Ocelos ausentes; rostrum de 4 segmentos **Miridae**

Família **CIMICIDAE**

(*Lecticolae*⁷⁹; *Acanthiidae*⁸⁰; *Cacodmidae*⁸¹;
Clinocoridae)⁸²

343. **Caracteres.** - Família dos chamados "percevejos de cama" e de outras espécies hematófagas que habitam ninhos de morcegos e de aves.

Corpo achatado, em oval arredondado, revestido de cerdas, mais ou menos abundantes.

Cabeça grande, apresentando um tylus relativamente robusto e alargado para diante; olhos bem salientes, quasi pedunculados; ocelos ausentes; antenas relativamente curtas, de quatro segmentos; rostrum, na maioria das espécies, curto, robusto, de tres segmentos.

Protorax transversal, lateralmente expandido em bordos arredondados e na margem anterior mais ou menos profundamente escavado; scutellum largo, em triângulo obtuso.

Hemelitos rudimentares, com o aspecto de duas escamas; sem asas; tarsos de tres artículos; garras tarsais sem arolia.

⁷⁹ Lat. *lectum*, leito; *colo*, habito.

⁸⁰ Gr. *acanthia*, espinho.

⁸¹ Gr. *cacodmos*, que cheira mal.

⁸² Gr. *kline*, leito; *coris*, percevejo.

Abdomen arredondado; a face ventral, nas fêmeas, apresenta uma fenda (*orgão de Ribaga*) no bordo posterior do 5° esternito, na maioria das espécies situada no lado direito da linha mediana, em algumas, porém (*Cimex limai* Pinto e *Haemosiphon inodora* (Dugès), na linha mediana.

344. **Orgãos de Ribaga e de Berlese.** - O órgão copulador penetra através da fenda há pouco citada, que se acha em relação com um corpo arredondado, chamado "bolsa" ou "orgão de Berlese", que funciona como bolsa copuladora, recebendo os espermatozoides por ocasião do coito.

Eis como PATTON e EVANS (1929) (v. indicação, no 1° tomo: 32) descrevem os fenômenos que se passam durante e após a cópula em *Cimex*, segundo as pesquisas realizadas por CRAGG:

"Os espermatozóides de *Cimex* são extremamente longos, medindo cerca de 800 micra (o diâmetro do órgão de Berlese). São depositados pelo macho no órgão através de uma abertura especial chamada órgão de Ribaga. O órgão de Berlese está situado no hemocele, no lado direito do abdome da fêmea de *Cimex*, na região do 4° e 5° esternitos. O órgão é esférico e mede cerca de 0,8-1 mm., variando o tamanho de acordo com o número de espermatozoides contidos no interior. Acha-se preso à parede ventral do abdome pelo órgão de Ribaga, uma estrutura ectodérmica constituído por células quitinógenas extraordinariamente modificadas, cada uma delas na extremidade livre formando um longo processo. Provavelmente os espermatozóides atingem a substância do órgão de Berlese passando através de cerdas longitudinalmente perfuradas. O órgão de Berlese é uma glândula sem canais excretores, cuja secreção passa para o hemocele quando os espermatozóides o atravessam dirigindo-se para as espermatecas. Tal órgão não se acha em relação com o sistema reprodutor. Os espermatozóides, em sua maioria, deixam o órgão passando através da parede no primeiro dia após a cópula encontrando-se no hemocele quatro horas depois deste ato.

Uma vez livres na haemolínfa, reúnem-se em pequenos feixes (v. fig. 307 B) facilmente reconhecíveis a olho nú. Passam depois para a extremidade posterior do abdome, agrupando-se em volta da parede de junção dos oviductos e

espermatecas. Não ha canal algum comunicando as espermatecas com o órgão de Berlese. As massas de espermatozoides aderentes às paredes das espermatecas atravessam-nas, penetrando nas paredes dos oviductos. O progresso último dos espermatozoides é inteiramente inter ou intracelular; não entrando no lumen do oviducto, sobem, passando em feixes através do epitélio.

Eventualment e atingem, no pedicelo do ovário, a massa protoplasmática que aí se encontra. Ulteriormente, quando esta foi utilizada na extensão do epitélio coriógeno em volta do ovo em crescimento, e quando este epitélio já se acha achatado, envolvendo o ovo quasi maduro, dirigem-se para a massa protoplasmática situada abaixo do ovo seguinte. Neste percurso, não mostram qualquer sinal de degeneração.

Terminam aqueles autores, transcrevendo as seguintes conclusões de CRAGG:

"Though Berlese's theory of hypergamosis has been shown to be found on error, the necessity of accounting for the enormous excess of spermatozoa which penetrate eventually into the ovariole remains. The spermatozoa have been traced to a mass of protoplasm containing free nuclei which are in an unstable condition. The enormous mass of protoplasm received by the female during the successive acts of copulation, in the form of spermatozoa, leads one to doubt, whether the latter have not some function other than that of fertilisation of the eggs."

345. **Classificação.** - A família compreende perto de 40 espécies, distribuidas em duas subfamílias: **Cimicinae** e **Haematosiphoninae**. Esta é representada pelo gênero *Haematosiphon* Champion, 1900, com espécie única *H. inodora* (Dugès, 1892), cujo rostrum se estende alem das ancas médias, encontrada em galinheiros, no México e nos Estados Unidos.

A subfamília **Cimicinae** é representada pelas demais espécies cujo rostrum atinge apenas os quadris anteriores, distribuidas pelo mundo em vários gêneros, dos quais ape-

nas *Cimex* L., 1758 e *Ornithocoris* Pinto, 1927 têm representantes no Brasil, com as seguintes espécies:

Cimex lectularius L., 1758 e *Cimex hemipterus* (Fabr., 1803), ambos cosmopolitas, *Cimex foedus* (Stal, 1854) e *Cimex limai* Pinto, 1927, este, encontrado em Pernambuco, sugando morcegos, foi também observado no Pará em domicílios, sugando sangue humano (LENT e PROENÇA). *Cimex foedus*, além do Brasil, encontra-se também na Colômbia e nas Filipinas, onde vive nos domicílios, sugando sangue humano.

A espécie tipo de *Ornithocoris*, *O. toledo* Pinto, 1927, foi encontrada em São Paulo, em galinheiros, sugando sangue de *Gallus domesticus*. MORAES (1939) encontrou-a também em Viçosa (Minas Gerais) (figs. 412 e 413).

CORDERO e VOGELANG (1928), no Uruguai, descreveram uma outra espécie deste gênero (*Ornithocoris furnarii*), que vive nos ninhos de "João de Barro" (*Furnarius rufus*), e *Cimex passerinus*, que suga sangue de *Passer domesticus*.

346. ***Cimex lectularius*** e ***C. hemipterus*** (figs. 408 e 409). - No Brasil, como disse, encontram-se duas espécies cosmopolitas de *Cimex*, *Cimex lectularius* (L., 1758) (= *Acanthia lectularia* (L.), *Clinocoris lectularius* (L.)) e *Cimex hemipterus* (Fabr., 1803) (= *Acanthia hemiptera* Fabr., 1803; *Acanthia rotundata* Sign., 1852; *Cimex rotundatus* (Sign.)). Todavia, é a segunda espécie a que mais frequentemente se vê, mesmo nos centros mais populosos. Na cidade de São Paulo, porém, talvez devido à intensa imigração européia, parece ser mais abundante o *Cimex lectularius*. BLATCHLEY, num dos seus livros (1934), a ele se referiu, descrevendo o que observou ao passar por aquela cidade.

Ambas estas espécies têm hábitos noturnos; de dia encontram-se nas fendas e orifícios dos muros e móveis, principalmente nas camas; à noite saem dos esconderijos para sugar o sangue das pessoas em repouso.

É fácil distinguir-se as duas espécies, não somente pela configuração do protorax, sobretudo pela reintrância do bordo anterior, como pelo aspecto das cerdas que nele se inserem e nos hemelitos. Em *lectularius* tais cerdas apresentam rebarbas num dos bordos; em *hemipterus* ambos os bordos das cerdas são lisos (fig. 410).

347. Cópula. Postura. Desenvolvimento embrionário. - Os percevejos de cama copulam 24 a 48 horas depois de atingida a fase adulta, começando as posturas uma semana depois. Estas, no caso do *Cimex hemipterus* e segundo as observações feitas por DUNN (1924) no Panamá, se efetuam nos lugares em que os percevejos se escondem, observando-se os primeiros ovos do 3° ao 6° dia de vida adulta.

Os ovos (fig. 411), aliás muito semelhantes nas duas espécies de *Cimex*, têm cerca de 1 mm. de comprimento por 0,5 de largura.

A princípio de um branco-pérola, pouco a pouco mudam de tonalidade, até adquirirem a cor branca-amarelada. Apresentam o cório distintamente reticulado e o opérculo um pouco voltado para o lado.

Podem aderir aos objetos em que são postos mediante a secreção das glândulas coletéricas emitida na postura.

Um percevejo de cama, em toda a vida, põe de 75 a 200 ovos, em posturas parceladas, de um, dois, tres ou mais ovos por dia.

CRAGG verificou que uma fêmea, acompanhada do macho, pôs 174 ovos em 105 dias, só interrompendo as posturas com a aproximação do inverno. TITSCHACK (1930) teve o ensejo de observar uma fêmea que pôs 541 ovos.

Com o *Cimex lectularius*, segundo DUNN (1924), o período de postura varia de 40 a 94 dias, pondo o inseto, nesse período, 89 ovos no mínimo e 439 no máximo. Em 24 horas, porem, expele quasi sempre de seis a oito ovos, podendo o número ascender a 10.

O desenvolvimento embrionário (incubação), dependendo principalmente da temperatura, realiza-se de quatro a 10 dias.

DUNN, no Panamá, com o *C. hemipterus*, observou um período de incubação de cinco a seis dias.



Fig. 408 - *Cimex lectularius* L., 1758, macho (Cimicidae) (X 14)
(Fot. J. Pinto).

348. Desenvolvimento post-embrionário. Duração da vida.
- Em *Cimex lectularius* o desenvolvimento post-embrionário, de ovo a adulto, efetua-se mediante cinco ecdises ou mudas, durando, segundo as experiências de JONES (1930) (efetuadas em temperatura de 27°C. e com humidade relativa de 75%), cerca de 30 a 40 dias.

Eis os dados colhidos:

	Duração em dias	Número de repastos sanguíneos
1º estágio, 1ª forma jovem ou larva	4 a 8	1 ou 2
2º estágio, 2ª forma jovem ou 1ª ninfa	cerca de 1 semana	3 a 4
3º estágio, 3ª forma jovem ou 2ª ninfa	5 a 9	2 a 4
4º estágio, 1ª forma jovem ou 3ª ninfa	5 a 8	3 a 4
5º estágio, 5ª forma jovem ou 4ª ninfa	7 a 12	3 a 4

Relativamente ao *Cimex hemipterus* foram as seguintes as observações feitas por DUNN:

	Duração em dias	Número do repastos sanguíneos
1º estágio, 1ª forma jovem ou larva	3 a 5	2
2º estágio, 2ª forma jovem ou 1ª ninfa	3 a 5	2 a 3
3º estágio, 3ª forma jovem ou 2ª ninfa	3 a 5	2 a 3
4º estágio, 4ª forma jovem ou 3ª ninfa	5 a 8	1 a 3
5º estágio, 5ª forma jovem ou 4ª ninfa	5 a 8	3 a 5

O período post-embrionário pode prolongar-se principalmente devido ao abaixamento da temperatura e à deficiência de alimentação.

Quanto à duração da vida dos percevejos de cama:

A do *Cimex hemipterus* varia de tres a oito meses. Em condições experimentais, DUNN verificou que as fêmeas du-

ram de 23 a 167 dias, sugando sangue, no mínimo 22 vezes e no máximo 168; quanto aos machos, vivendo de 94 a 189 dias, fazem 78 a 168 repastos sanguíneos.

A sucção de sangue, nas fêmeas, dura de quatro a 12 minutos e, no macho, de tres a oito minutos.




Fig. 409 - *Cimex hemipterus* (Fabr., 1803), fêmea (Cimicidae) (X 19
(Fot. J. Pinto).

Conquanto os percevejos de cama possam suportar longos períodos sem se alimentar (BACOT verificou que, numa temperatura de 15° a 16°C, podem viver, sem sugar sangue, cerca de 130 dias), nem sempre sobrevivem nos domicílios

ha muito tempo desabilitados, devido a essa resistência. Provavelmente, em tal emergência, sugam sangue de aves, ratos, morcegos e outros mamíferos que aí se encontram.

349. **Importância médica.** - Os percevejos de cama, além dos danos que causam pelas picadas (v. trabalho de HASE, 1930), têm sido incriminados como capazes de transmitir germes de várias doenças infecciosas. Entretanto, se está verificado que, em condições experimentais, podem transmitir, mediante as fezes, o bacilo da peste, o *Schizotrypanum cruzi*, agente etiológico da doença de Chagas, e outros




Fig. 410 - Parte lateral do elitro de *Cimex lectularius* L., (fêmea), para se apreciar o aspecto característico das cerdas, serardas no bordo convexo (X 300) (de Pinto, 1930, *Arthropodos parasitos etc.* fig. 80) (Federman foto.).




Fig. 411 - Ovo de *Cimex hemipterus*, a pós a eclosão da forma joven (De Imms, *Textbook of Entom.*, fig 663).

germes, ainda não ha dados precisos que nos levem a concluir que, normalmente, desempenhem papel preponderante na transmissão, das doenças infecciosas, nem mesmo daquelas cujos agentes etiológicos se acham frequentemente no sangue periférico.

350. **Meios de combate.** - Os locais infestados pelos Cimicideos devem ser expurgados pelo anídrido sulfuroso, resultante da queima de enxofre ao ar livre (ao qual se

adiciona um pouco de salitre, para facilitar a combustão), à razão de 50 a 100 grs. por m³, durante uma hora pelo menos, pelo gás Clayton (SO² + O), resultante da queima de enxofre em aparelho Clayton, ou pela aplicação de gás cianídrico, segundo as técnicas indicadas nos manuais de expurgo.



Figs. 412 e 413 - *Ornithocoris toledo*, Pinto, 1937, macho, (Cimicidae (X 19) Aspectos dorsal e ventral. (De Pinto, 1927).

Os percevejos, que se escondem nos móveis ou em quaisquer objetos, podem ser facilmente destruídos pelo emprego de querosene, de piretro ou dos preparados inseticidas do comércio, especialmente indicados para o combate a estes insetos.

Quando possível, o emprego de água numa temperatura próxima da ebulição deve ser o método indicado na destruição destes percevejos.

Tambem, sendo possível e econômico manter-se os compartimentos infestados numa temperatura de 50°, durante seis horas, deve preferir-se este meio de combate a outro qualquer, pois dele resultará uma destruição, dos percevejos nos vários períodos do desenvolvimento.

Nas habitações, como medida preventiva no combate aos percevejos de cama, as paredes devem ser pintadas ou caiadas, visto como as revestidas de papeis pintados constituem um meio favoravel para a proliferação destes insetos.

351. **Bibliografia.**

ABRAHAM, R.

- 1934 - Das Verhalten der Spermien in der weiblichen Bettwanze (*Cimex lectularius* L.) und der Verbleib der überschüssig Spermamasse.
Zeits. Parasitenk. 6:559-591, 17 figs.

BARBER, H. G.

- 1934 - The first type fixation for *Cimex* Linnaeus.
Bull. Brookl. Ent. Soc. 29:106.

BLATCHLEY, W. S.

- 1934 - South America as I saw it.
The observations of a naturalist on the living conditions of its commum people; its topography and products, its animals and plants.
391 ps. Indianapolis: The Nature Publishing Co.

BUCHNER, P.

- 1921 - Ueber ein neues symb iontisches Organ der Bettwanze,
Biol. Centralbl. 41:570-574.

CHINA, W. E. & MYERS, J. G.

- 1929 - A reconsideration of the classification of the Cimicoid families, with the description of two new spider-web bugs.
Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 3:97-125, 5 figs.

CORDERO, E. H. & VOGELSANG, E. G.

- 1928 - Dos nuevas especies del género *Cimex* parásitos de aves.
Cuarta Reun. Soc. Argent. Patol. Reg. Norte: 671-673, 4 figs.

CORNWALL, J. W.

- 1823 - Note on the salivary gland and sucking apparatus of *Cimex rotundatus*.
Ind. Jour. Med. Res. 10:687-691, 4 ests.

GRAGG, F. W.

- 1915 - A preliminary note on fertilization in *Cimex*.
Ind. Jour. Med. Res. 2:698-705, est. 87, figs. 1 e 2.
- 1920 - Further observations ou the reproductive system of *Cimex* with especial reference to the behaviour of the spermatozoa.
Ind. Jour. Med. Res. 8:32-79; ests. 5-12, 50 figs.
- 1923 - Observations on the bionomics of the bed bug *Cimex lectularius* L. with special reference to the relations of the sexes.
Ind. Jour. Med. Res. 11:449-473.
- 1925 - Observations on the reproductive system of *Cimex*: impregnation.
Ind. Jour. Med. Res. 12:451-455.

DUNN, L. H.

- 1924 - Life history of the tropical bed bug *Cimex rotundatus* in Panamá.
Amer. Jour. Trop. Med. 4:77-83.

GIRAULT, A. A.

- 1907 - A bibliography of the bed bug *C. lectularius* L.
Zool. Ann. 2:143-201.
- 1908 - Notes on the feeding habits of *C. lectularius* L.
Psyche, 14:85-87.
- 1910-1914 - Preliminary studies on the biology of the bed bug *Cimex lectularius* Linnaeus.
Jour. Econ. Biol. 5:8-9; 7:163-188; 9:25-45.

HARNED, R. W. & ALLEN, H. W.

- 1925 - Controlling bed bug in steam heated rooms.
Jour. Econ. Ent. 18:320-329.

HASE, A.

- 1917 - Die Bettwanze (*Cimex lectularius* L.). ihr Leben und ihre Bekämpfung.
Monogr. Zeits. angew. Entom. 1.
- 1918 - Beobachtungen über den Kopulationsvorgang bei den Bettwanzen (*Cimex lectularius*).
Sitzber. Ges. naturforsch. Freunde, Berlin.
- 1919 - Neue Beobachtungen und Versuche über die Lebensfähigkeit der Kleiderläuse und ihrer Eier.
Centralbl. Bakt. 1 Abt. Orig. 82(6):461-468.
- 1930 - Weitere Versuche zur Kenntnis der Bettwanzen *Cimex lectularius* L. und *Cimex rotundatus* Sign. Beiträge zur experimentellen Parasitologie.
Zeits. Parasitenk. 2:368-418.

HORVATH, G. von

- 1912 - Revision of the American Cimicidae.
Ann. Mus. Nat. Hung. 10:257-262.
- 1914 - La distribution géographique des Cimicides et l'origine de la punaise des lits.
Congr. Internat. Zool. Monaco 9:294-299.

HUTCHINSON, C. M.

- 1925 - Microanatomy of *Cimex* with special reference to the technique of insect histology.
Ind. Jour. Med. Res. 12:487-498, 1 est.

JANISCH, E.

- 1933 - Beobachtungen über die Aufzucht von Bettwanzen I. Ueber das Verhalten von Populationen bei verschiedenen Zuchtbedingungen.
Zeits. Parasitenk. 5:460-514, 23 figs.
- 1935 - Ueber die Vermehrung der Bettwanze *Cimex lectularius* in verschiedenen Temperaturen. (Beobachtungen bei der Aufzucht von Bettwanzen, II).
Zeits. Parasitenk. 7:408-439, 18 figs.

JENSEN-HAARUP, A. C.

- 1920 - Hemipterological notes and descriptions. I.
Ent. Meddel, 13:209-224.

JONES, R. M.

- 1930 - Some effects of temperature and humidity as factors in the biology of the bed bug (*Cimex lectularius* L.).
Ann. Ent. Soc. Amer. 23:105-119.

JORDAN, K.

- 1922 - Notes on the distribution of the organ of Berlese in *Clinocoris*.
Ectoparasites, 1:284-286 5 figs. 276-280.

JORDAN, K. & ROTHSCHILD, N. C.

- 1912 - Notes on Clinocoridae.
Nov. Zool. 19:352.

KEMPER, H.

- 1928 - Die Tracheenanordnung bei der Bettwanze (*Cimex lectularius* L.).
Zool. Anz. 78:90-93, 3 figs.
- 1929 - Beiträge zur Kenntnis der Stinkapparats von *Cimex lectularius* L.
Zeits. Morph. Oekol. Tiere 15:524-545, 9 figs.
- 1930 - Beiträge zur Biologie der Bettwanze (*Cimex lectularius* L.) I - Ueber den Einfluss der Nahrungsmangels.
Zeits. Morph. Oekol. Tiere, 19:160-183, 4 figs.
- 1931 - Beiträge zur Biologie der Bettwanze (*Cimex lectularius* L.) II -- Ueber die Häutung.
Zeits. Morph. Oekol. Tiere, 22:53-109, 9 figs.
- 1932 - Beiträge zur Biologie der Bettwanze (*Cimex lectularius* L.) III - Ueber den Mechanismus des Stechsaugactes.
Zeits. Morph. Oekol. Tiere, 24:491-518.

KIRKALDY, G. W.

- 1906 - Notes on the classification and nomenclature of the hemipterous superfamily Miroidea.
Canad. Entom., 38:369-376.

LENT, H. & PROENÇA, M.

- 1937 - *Cimex limai* Pinto, 1927, parasito de morcego no Brasil.
Mem. Inst. Osw. Cruz, 32:211-215, 2 figs.

LEON, N.

- 1924 - Sur l'appareil buccal de la punaise des lits (*Cimex lectularius*) :
Ann. Parasit. Hum. Comp. 2:71-73, 2 figs.

LIST, G. M.

- 1925 - Three new genera and three new species of Cimicidae from North America.
Proc. Biol. Soc. Wash. 38:103-110.

MELLANBY, H.

- 1935 - A comparison of the physiology of the two species of bed bugs which attack man.
Parasitology, 27:111-122, 3 figs.

MORAES, R. G.

- 1939 - Breve nota sobre o *Ornithocoris toledo* Pinto, 1927.
Rev. Med.-Cicur. Brasil, 47(2):250-255, 4 figs.

MURRAY, C. A.

- 1915 - Notes on the anatomy of the bed bug (*Acanthia lectularia* L.).
Parasitology, 7:278-321, ests. 22 e 23.

OMORI, N.

- 1939 - Experimental studies on the cohabitation and crossing of two species of bed-bugs (*Cimex lectularius* L. and *C. hemipterus* F.) and on the effects of interchanging of males of one species for the other, every alternate days, upon the fecundity and longevity of females of each species.
Acta Japon. Med. Trop. 1:127-154.

ORFILA, R. N.

- 1937 - Los insectos del hojas. La chinche.
Pampa Argentina, março: 12.

PATTON, W. S.

- 1908 - *Cimex rotundatus* Signoret.
Rec. Ind. Mus. 2(2):153-155, 1 est.

PINTO, C.

- 1927 - *Cimex limai* n.sp. parasito de morcegos do Brasil.
Bol. Biol. 10:186-187, figs. 1-4.
- 1927 - *Ornithocoris toledo* nov. gen. e n.sp. de percevejo de ave.
Rev. Soc. Biol. Hig. S. Paulo, 1:17-22.
- 1928 - Sobre a presença do *Cimex foedus* (Stal, 1854) no Brasil.
Bol. Biol. 13:85-91, 7 figs.
Ver também o capítulo Cimicídeos, deste autor no seu livro "Arthropodos parasitos, etc." (1930) (v. 1º tomo, pág. 32).

PURI, T. M.

- 1924 - Studies on the anatomy of *Cimex lectularius*. I e II.
Parasitology, 16:89-97; 269-278; 1 est. 18 figs.

RAYMOND, G.

- 1915 - Étude et reproduction par la microphotographie des organes buccaux de la punaise des lits (*Cimex lectularius* L.).
Riviera Scientifique 2(4) :52-54.

REUTER, O. M.

- 1913 - Die Familie der Bett-oder Hauswanzen Cimicidae), ihre Phylogenie, Systematik, Oekologie und Verbreitung.
Zeits. wiss. Insektenbiol. 9:251-255; 303-306; 325-329; 360-364.

RIBAGA, C.

- 1877 - Sopra un organo particolare delle cimice dei letti (*Cimex lectularius* L.).
Riv. Patol. Veget. 5:343-353, 4 figs., 1 est.

RIVNAY, E.

- 1930 - Host selection and cannibalism in the bed bug *Cimex lectularius* L.
Ann. Ent. Soc. Amer. 23:758-764.
- 1932 - Studies in tropisms of the bed bug *Cimex lectularius* L.
Parasitology, 24 :121-136, 9 figs.

SIOLI, H.

- 1937 - Thermotaxis und Perzeption von Wärmestrahlen bei der Bettwanze (*Cimex lectularius* L.).
Zool. Jahrb. Allg. Zool. 58:284-296, 2 figs.

STEPÁNEK, O.

- 1927 - Beiträge zur heteropterologischen Teratologie.
Zeits. wiss. Insektenbiol. 22:199-203, 29 figs.

TITSCHACK, E.

- 1930 - Untersuchungen über das Wachstum, den Nahrungsverbrauch und die Eierzeugung III. *Cimex lectularius* L.
Zeits. Morph. Oekol. Tier. 17:471-551, 5 figs.

Família ANTHOCORIDAE⁸³

352. **Caracteres, etc.** - Hemípteros pequenos, de alguns milímetros de comprimento, cor castanha mais ou menos escura e corpo geralmente achatado.

Cabeça quasi tão longa quanto o torax, geralmente saliente adiante da inserção das antenas; estas de quatro segmentos; ocelos presentes; bucculae ausentes; rostrum de tres segmentos.

Pronotum trapezoidal, de ângulos posteriores não, salientes, scutellum pequeno, triangular; hemelítrios, quando bem desenvolvidos, com cuneus e embolium distintos e a membrana provida de poucas nervuras longitudinais, ou mesmo sem elas. Na classificação destes insetos importa saber se ha ou não, nas asas posteriores, *hamus*, curta nervura, às vezes ponteaguda, dirigida para dentro da célula dessas asas.

Tarsos de tres artículos. Garras sem arólia.

353. **Hábitos.** - Os Antocorídeos geralmente são vistos nas partes epígeas das plantas, sendo mais frequentemente encontrados nas flores e sobre caules infestados por pulgões ou cochonilhas, ou neles escondidos sob a casca destacada

⁸³ Gr. *anthos*, flor; *coris*, percevejo.

ou dentro da bainha das folhas. Aí atacam os pequenos insetos que acham (alem dos já citados, trips, etc.) para lhes sugar a hemolinfa. São, pois, predadores.

Ha, entretanto, espécies hematófagas, que habitam ninhos de aves e algumas mesmo já observadas sugando sangue humano. No Brasil a espécie mais frequentemente observada em ninhos de aves (fig. 411) muito se assemelha a *Calliodis picturata* Reuter, 1871 (fig. 414).

Em outros países foram estudadas algumas espécies que causam, pelas picadas, danos às plantas cultivadas.

354. **Classificação.** - Ha conhecidas, em todas as partes do mundo, cerca de 300 espécies, distribuídas em tres subfamílias: **Anthocorinae**, **Lyctocorinae** e **Dufouriellinae**.

Algumas espécies, observadas no Brasil, como *Lyctocoris campestris* (Fabr., 1794) e *Triphleps insidiosus* (Say, 1831), são hoje cosmopolitas.

355. **Bibliografia.**

REUTER, O. M.

1885 - Monographia Anthocoridarum orbis terre stris.
Act. Soc. Sci. Fenn. 14:555-758.

POPPIUS, B.

1909 - Beiträge zur Kenntnis der Anthocoriden.
Act. Soc. Sci. Fenn., 37(9), 43 pp.

Família **MIRIDAE**⁸⁴

(*Capsidae*)⁸⁵

356. **Caracteres, anatomia externa.** - Compreende esta grande família Hemípteros geralmente pequenos, exibindo alguns cores vivas em desenhos variados, quasi todos, porém, com tegumento pouco esclerosado; apresentam heme-

⁸⁴ Etimologia desconhecida.

⁸⁵ ? Lat. *capsus*, cofre.

litros geralmente bem desenvolvidos, providos de cuneus mais ou menos destacado do ápice do corium e membrana com uma ou duas nervuras na base, curvas, formando uma ou duas células (*aréolas*) desiguais.

Ha espécies que mimetizam, de modo perfeito, formigas, microimenópteros da superfamília Ichneumonoidea ou mesmo outros Hemípteros.




Fig. 414 - *Calliodis picturata* Reuter, 1871 (Anthocoridae) (cerca X 20).




Fig. 415 - Mirideo, visto de cima: vêm-se a porção anterior estreitada do pronotum (*coleira*), a sutura transversa que separa o cuneus do coriu (*fratura*) e, na membrana, apenas uma grande auréola (X 8).

Cabeça distinta; antenas de quatro segmentos, o basal, em muitas espécies, consideravelmente dilatado; olhos salientes; sem ocelos; rostrum de quatro segmentos; scutellum pequeno, triangular.

Hemelitros e asas relativamente grandes, aqueles tendo, em algumas espécies, além de cuneus, um embolium, aliás não claramente separado do corium como em Anthocoridae.

Os Mirídeos, em sua maioria, apresentam a parte distal dos hemelítrios dobrada para baixo, geralmente ao nível da base do cuneus (fig. 416).

Em vários Mirídeos observam-se formas braquípteras e apteras, sendo o macho geralmente macróptero. Em alguns, porém, o macho também apresenta asas mais ou menos atrofiadas.

Tarsos de três artículos (exceto em *Peritropis* Uhler, 1891, cujos tarsos são dímeros), apresentando o último, entre garras divaricadas, um par de apêndices (*arolia*), ora setiformes, ora pulviliformes, cujo aspecto, combinado com o da terminalia do macho, é aproveitado, não somente para a distinção das subfamílias, como para averiguação das relações filogenéticas existentes entre elas. Para dentro da base das garras observa-se, em muitas espécies, outro par de apêndices mais ou menos desenvolvidos (*pseudarolia*).




Fig. 416 - Mirídeo, o mesmo da fig. 415 de perfil, para se ver o dobramento característico do hemelítrio ao nível da fratura.

As fêmeas possuem, alojada numa fenda longitudinal aberta nos três últimos urosternitos, um ovipositor, que serve para cortar os tecidos das plantas, para neles introduzir os ovos.

357. Hábitos e importância econômica. - Os Mirídeos, em geral, são muito ativos; há mesmo algumas espécies que saltam muito bem.

Vivem sobre Gramíneas e outras plantas herbáceas, alimentando-se de seiva. Muitos, entretanto, se encontram sobre arbustos e árvores.

Ha algumas espécies predadoras, que atacam pequenos insetos (como Afídeos) ou que lhes destroem os ovos. Como exemplo deste último caso citarei *Cyrtorrhinus mundulus* (Breddin), Mirídeo da Austrália, Java, Filipinas e Fiji, introduzido nas ilhas de Hawaii para realizar o combate biológico da cigarrinha *Perkinsiella saccharicida*; sugando-lhe os ovos é atualmente o agente que mais eficientemente controla a proliferação desta praga da cana de açúcar.

Ha também alguns Mirídeos que, facultativamente, se tornam hematófagos.

O fato tem sido observado por vários autores em outros países e ainda ha pouco tempo ESAKI (1934) a ele se referiu, tratando especialmente do Mirídeo asiático *Cyrtorrhinus lividipennis* Reuter, 1884.

Relativamente à natureza das lesões produzidas nas plantas pelas picadas dos Mirídeos ("stigmonose" e formação de "litífase" ou "pedras" nos tecidos picados), ha uma série de trabalhos sobre espécies observadas no estrangeiro. Do exame das conclusões nos mesmos apresentadas, depreende-se que, se os Mirídeos podem representar um papel saliente na transmissão de virus ou de germes microbianos, as lesões até agora observadas não parecem de uma doença transmissível e sim de substâncias, normalmente neles presentes, dotadas de ação mais ou menos tóxica para as plantas que infestam. Convem ler, a respeito, os trabalhos de SMITH (1920), PAINTER (1930), ROBERTS (1930), KING & COOK (1932), CARTER (1939) e STOREY (1939), estes dois últimos trabalhos já citados na bibliografia de Hemípteros.

358. Classificação e espécies mais importantes. - A família Miridae, sob o ponto de vista da quantidade de espécies que a formam, é das mais importantes na ordem Hemiptera, pois, atualmente, compreende mais de 4.000 espécies,

havendo muitas ainda por descrever. Segundo KINIGTH (in BRITTON, 1923 - Hemiptera of Connecticut) as espécies de Miridae se distribuem nas seguintes subfamílias: **Phylinae**, **Dicyphinae**, **Bryocorinae**, **Cylapinae**, **Clivineminae**, **Deraeocorinae**, **Orthotylinae**, **Mirinae** e **Capsinae**.




Fig. 417 - *Engytatus notatus* (Distant, 1893) (Miridae) (De Moreira, 1925) (cerca de X 10).

Em quasi todos os paises, existem vários Mirideos mais ou menos daninhos a certas culturas; basta citar o *Lygus pratensis* (L., 1758), o assás conhecido, "tarnished plant bug" dos norte-americanos. Na região neatrópica, entretanto - aliás uma das mais ricas em espécies desta família - bem poucas espécies foram até agora estudadas sob esse ponto de vista econômico.

Linhas a seguir referirei o que de mais interessante se escreveu sobre estes insetos em nosso País.

359. **Espécies de maior importância:**

Subfamília DIGYPHINAE

Engytatus notatus (Distant, 1893) (fig. 417).

Neoproba notata Distant, 1893.

Engytatus geniculatus (Reuter, 1876) (fig. 418).

Neoproba varians Distant, 1884;

Cyrtopeltis varians (Dist., 1884).

Eis o que MOREIRA escreveu sobre estes dois Mirídeos:

"Os hemípteros capsídeos *Engytatus notatus* (Dist.) e *Engytatus geniculatus* Reut., 86 são dos mais nocivos insetos que infestam o fumo, *Nicotiana tabacum* L., no Brasil vivem em grande número nas folhas desta planta, picando-as e sugando-as, causam alterações nos tecidos, produzindo as manchas que Woods denominou stigmonose, juntam-se principalmente na face inferior das folhas, manchando-as e sinão inutilizando-as completamente, depreciam-nas grandemente.

Estes pequenos insetos têm vida curta, vivem apenas uns vinte dias, mas as gerações sucedem-se ininterruptamente, de modo que em pouco tempo, grande número infesta a plantação. A espécie menor *Engytatus notatus* (Dist.) é um inseto de, cabeça preta com área triangular amarela na parte posterior interna de cada olho; os olhos são castanho-vermelhos, as antenas fuliginosas, com as extremidades do segundo artigo e a extremidade distal do terceiro segmento amarelos, o pronotum é amarelo esverdeado com a face dorsal mais ou menos fuliginosa, as margens laterais e posterior, negras, o escutelum é esverdeado tem uma faixa longitudinal central e o vértice pretos; o abdomen é amarelo esverdeado, na parte dorsal, nas extremidades tem pelos, é castanho-negro, as pernas são amarelo-esverdeadas, têm pelos e cerdas, as tíbias e tarsos são ligeiramente fuliginosas; as asas ante-

⁸⁶ Este inseto foi descrito por Distant sol a designação de *Neoproba notata*, e Uhler descreveu-o e denominou-o *Dicyphus minimus*, mas realmente é uma espécie do género *Engytatus* e seu nome deve ser *Engytatus notatus* (Distant) de acordo com a opinião abalizada de Horvath a quem devo a determinação das duas espécies de percevejos do fumo. Champion prefere manter a designação genérica de Distant como subgénero: *Engytatus (Neoproba) notatus* (Distant).

flores são amarelas, levemente fuliginosas, principalmente a membrana, têm uma mancha preta na extremidade do cuneus e outra próxima da extremidade do corium, as asas posteriores são hialinas com reflexos irrisados e a tromba é verde e clara. O abdomen do macho é cilíndrico e o inseto curva os últimos segmentos ligeiramente para baixo. O inseto tem




Fig. 418 - *Engytatus geniculatus* Reuter, 1876 (Miridae) (cerca de X 16).
(De Moreira, 1925).

de comprimento da frente a extremidade do abdomen, 2,^{mm}4. A fêmea tem o mesmo colorido do macho, tendo o abdomen mais grosso na altura do sexto segmento a que se articula o ovipositor; é ligeiramente maior do que o macho, tem de comprimento da frente à extremidade do abdomen, 2,^{mm}5. As asas de ambos os sexos excedem o comprimento do abdomen.

OVO E POSTURA

O ovo deste hemíptero ainda no ovário prestes a ser posto, tem $0,^{mm}67$ de comprimento e $0,^{mm}06$, na maior grossura é levemente curvo, fusiformes com uma extremidade truncada e guarnecida de cerdas. O ovo posto é branco com a casca finamente reticulada, tem $0,^{mm}7$ de comprimento e de grossura a meio $0,^{mm}22$ e na extremidade mais fina, $0,^{mm}11$, é curvo com a parte em que fica o opérculo por onde se dá a eclosão, truncada sem as cerdas que o ovo antes da postura apresenta. A fêmea para proceder à postura abre o ovipositor de traz para diante e enterra-o na nervura central da face inferior da folha, contrae o abdomen em visível esforço e põe o ovo, que corre pelo ovipositor e penetra na fenda feita por este no tecido da nervura da folha. O ovo fica inclinado com a extremidade truncada fixa à epiderme da nervura.

Dentro de 12 horas, depois da fecundação a fêmea começa a pôr; põe dois a tres ovos muito espaçadamente, com umas 12 horas de intervalo. A postura dura pelo menos um minuto, tempo em que o inseto fêmea mantém o ovipositor enterrado na nervura da folha.

A postura não pode ser feita sinão na nervura central, ou nas grossas nervuras laterais, porque só estas podem alojar o ovo na posição em que é posto; o ovo inclinado na posição conveniente precisa de tecidos da folha de $0,^{mm}35$ de espessura que só se encontram na nervura mediana, ou em grossas nervuras secundárias, o limbo da folha entre nervuras tem de espessura, $0,^{mm}1$ e a nervura central de uma folha pequena tem 1 a 2 milímetros e meio de espessura. O inseto procura por isto, instintivamente a nervura mediana, ou as grossas nervuras secundárias, porque somente nestas pode alojar o ovo. A fêmea morre uns 5 dias depois da postura do último ovo e o macho dentro de uns 4 dias depois que fecundou a fêmea.

ECLOSÃO E METAMORFOSE DO INSETO

Sete dias depois de posto o ovo, dá-se a eclosão da larva, ou jovem, que é aptero, nasce com $0,^{mm}35$ de comprimento amarelo, ingerindo alimento, seu abdomen que é mais claro, torna-se escuro seus olhos são castanho-avermelhados, depois da primeira muda começaram a nascer os rudimentos de asa que se desenvolvem até a segunda muda que se dá

depois de tres dias e toma depois desta, a forma alada de imago.

Quatro dias depois de chegada a fase de imago, depois da última muda o inseto está apto para a reprodução. O macho excita a fêmea por assaltos rápidos a esta, depois unem-se e permanecem assim juntos mais de 20 minutos.

Doze horas depois começa a postura, a incubação dura sete dias e da eclosão á última muda, à imago, de correm pelo menos nove dias, sendo a vida da imago de nove dias, a vida do inseto desde a eclosão é de 18 dias. A temperatura oscilou de 26 ° a 32°C durante o tempo que fiz estas observações da biologia deste inseto.


ESTRAGOS PRODUZIDOS

Este pequeno hemíptero, sendo as condições climáticas favoráveis, de seca e calor, desenvolve-se consideravelmente e aglomerando-se na face inferior das folhas e picando-as produzem alterações nos tecidos, modificando a clorofila e o amarelecimento das folhas que secam prematuramente, podendo tambem o inseto com suas picadas e voando de umas para outras plantas transmitir as moléstias que ocorrem no tabaco. Alem destes danos, o *Engytatus notatus* defecando sobre as folhas cobre-as de pintas pretas que lhe dão mau aspecto, prejudicando sua qualidade.

Só tenho conhecimento da existência deste nocivo inseto no México, no Brasil e nos Estados Unidos da América do Norte em plantações de fumo, na Florida, na Carolina do Sul em New México e na Califórnia. Tambem é encontrado em tomateiros.

Alem desta espécie de hemíptero capsídeo, ha uma outra um pouco maior, do mesmo gênero que produz os mesmos danos, é o *Engytatus geniculatus* Reuter, de cabeça amarela com um colar castanho escuro na parte posterior, seus olhos são castanho-negros, as antenas têm o primeiro artículo fuliginoso e a extremidade amarelo-clara, os segmentos seguintes são fuliginosos com pelos e cerdas, estas mais escuras, do que aqueles, a tromba tem o segmento da base amarelo e os terminais fuliginosos, as asas são amarelas, as superiores com a membrana iridescente e as inferiores são hialinas, as pernas são amarelo-claras os tarsos fuliginosos e corpo amarelo esverdeado. Os dois sexos têm o mesmo colorido e têm tres milímetros de comprimento.

A biologia desta espécie é semelhante a do *Engytatus notatus*, difere em pôr sete a oito ovos do mesmo tipo que os da espécie menor um pouco mais alongados e curvos, com um milímetro de comprimento e 0,^{mm}4 na maior grossura. Esta espécie é mais ágil e rápida na fuga do que a menor. Tem sido encontrada em plantas de fumo no Brasil e nos Estados Unidos da América do Norte, na Califórnia, Texas e Florida.



Figs. 419 e 420 - *Menalonia xanthophilum* (Walker, 1873), (Miridae);

Estes capsídeos do fumo desenvolvem-se consideravelmente durante a época mais quente e mais seca do ano, diminuindo à proporção que baixa a temperatura e as chuvas são mais abundantes, mas naquela época prejudicam tanto as plantas que devem ser tomadas medidas eficazes contra seu excessivo desenvolvimento.

Os viveiros de plantas de tabaco devem ser feitos ao abrigo de gaiolas guarnecidas de tela de arame de um milímetro, ou de gase e mesmo depois de transplantadas as mudas devem ser protegidas até que alcancem uns 30 centímetros

de altura, sendo então tratadas com pulverizações de emulsão de sabão e querozene e nicotina.

A emulsão deve ser bem preparada de modo que o querozene fique completamente emulsionado com o sabão e nunca deve ter mais de dois por cento de querozene. Emulsões com maior quantidade de querozene podem não ser bastante estáveis e em um momento dado, parte do querozene separando-se da emulsão queima e inutiliza as folhas do tabaco e isto deve ser evitado, pela dose baixa do petróleo, ou querozene e sua perfeita emulsão.

Prepara-se a emulsão da seguinte forma:

Em qualquer vasilha que possa ir ao fogo deita-se um litro d'água e oitocentas gramas de sabão duro ordinário comum, cortado em pequenos pedaços, leva-se ao fogo e mexe-se até completa solução de sabão, retira-se a vasilha do fogo e ao líquido ainda quente junta-se um litro de querozene ou petróleo e bate-se na própria vasilha ou em um aparelho próprio até produzir perfeita e completa emulsão e dissolve-se em cinquenta litros d'água. Pode-se conservar a emulsão, que esfriando fica em massa como sabão, e dissolver na ocasião de empregar. Neste caso dissolve-se em água quente ou a fogo e deixa-se esfriar.

EXTRATO DE TABACO

Prepara-se o extrato da seguinte forma: toma-se um quilo de fumo, preto bem úmido de rolo, corta-se em pequenos pedaços e ferve-se em uns dois a tres litros d'água até extrair toda a nicotina dos pedaços de tabaco, retiram-se estes do líquido, expremem-se e reduz-se o líquido pela evaporação a fogo lento, ou a banho-maria a um litro; com o fumo em rolo úmido comum, de boa qualidade um extrato preparado deste modo deve ter 0,82% (por 100 cc.) de nicotina.

Este extrato de fumo pode ser preparado na própria plantação, de forma a ficar por um preço muito reduzido, juntam-se dois a tres litros deste extrato de fumo conforme seu preço aos 50 litros de emulsão de sabão de querozene. Com tres litros deste extrato de tabaco fica a emulsão com 2% de querozene e uns 0,05% de nicotina. Acidulando com 10cc de ácido sulfúrico a água em que se deita o fumo para ferver, obtem-se um extrato mais rico com sulfato de nicotina.

Aplica-se com pulverizador de pressão abundantemente, procurando alcançar a face inferior das folhas, onde se juntam os percevejos. Pelas experiências que fiz com o preparador de entomologia sr. Dario Mendes, verificamos que uns 70 % de insetos alcançados pelo inseticida morrem e verificamos que as formas aladas são mortas mais facilmente do que os jovens, ou larvas, porque a emulsão molha as asas e o inseticida fica entre estas atuando sobre o inseto, ao passo que os jovens embora mais tenros são molhados, pelo inseticida que corre pelo corpo do inseto sem estagnar, libertando-se o mesmo rapidamente da ação do inseticida.

As plantas tratadas pela emulsão de sabão depois de alguns dias, mormente sobrevivendo chuva não têm cheiro algum de querosene ou sabão, por isto creio que este tratamento não deve prejudicar a qualidade do fumo, mas isto, só na prática corrente poderá provar.

De nove em nove dias nascem insetos alados na planta infestada e sendo estes mais vulneráveis pelo inseticida, o tratamento deve ser repetido de dez em dez dias de modo a atingir as formas aladas que vão nascendo, até extinção da praga".

No meu "1º Catálogo sistemático dos insetos que vivem nas plantas do Brasil", publicado no vol. VI (1922) dos Archivos da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, vem assinalada, na família Miridae, uma espécie que ataca as folhas de fumo no Distrito Federal.

O conhecimento que tive da mesma devo ao Dr. ARSÈNE PUTTEMANS, que me entregou, para determinar, alguns espécimens do inseto por ele colhidos em Deodoro sobre folhas de fumo.

Nessa ocasião verifiquei que os mesmos pertenciam a espécie *Neoproba notata* Distant, 1893. Ora, as espécies do gênero *Neoproba* Dislant, 1804, segundo VAN DUZEE, devem ser incluídas no gênero *Engytatus* Reuter, 1876, daí concluir-se que o nome do inseto em questão deve ser *Engytatus notatus* (Distant). Aliás é sob essa denominação que este se encontra no referido Catálogo.

Ha, porem, um outro Mirideo cuja biologia se pode ler descrita em trabalhos estrangeiros (QUAINTANCE, Bull. 48,

Flórida Agric. Exp. Sta., 1898; HOWARD, L. O The principal insects affecting the tabaco plant, Yearbook of the U. S. Depart of Agric., for 1898-1899, pp. 134-136; MORGAN, A. C. Insects enemies of the tabacco in the United States, Yearbook of the U. S. Depart. for 1910-1911, pp. 294, etc.) e no artigo do Dr. Gustavo D'Utra, indicado na "Bibliografia entomológica do meu 3º Catálogo dos insetos que vivem nas plantas do Brasil", no n. 399. Quero referir-me ao *Dicyphus minimus* Uhler, 1899, considerado por MOREIRA sinônimo de *E. notatus*.

Ora, os caracteres dos especimens que foram entregues pelo Dr. PUTTEMANS, perfeitamente de acordo com a descrição de DISTANT para *Neoproba notata*, não combinam exatamente com a diagnose de UHLER para o *Dicyphus minimus*. Aliás, poder-se-á verificar, lendo as descrições originais de *Dicyphus minimus* e de *Engytatus notatus*, respectivamente no Entom. News, vol. X, p. 59 e na Biologia Centrali Americana, Hem. Heteroptera, vol. I, p. 432, que não correspondem a um mesmo inseto, e se a figura do *Dicyphus minimus* (da qual ha uma cópia no citado trabalho de d'Utra) em muitos pontos se parece com o que se vê em *Engytatus notatus*, não me parece razoavel concluir-se pela identidade das duas espécies sem, pelo menos, se examinar o tipo de UHLER, para se verificar se realmente o inseto por ele descrito oferece ou não os mesmos caracteres assinalados para a *Neoproba notata* Distant. A ser provada tal identidade o nome do inseto será então o seguinte: *Engytatus notatus* (Distant, 1893) (sin.: *Neoproba notata* Distant, 1893; *Dicyphus minimus* Uhler, 1899).

Subfamília MIRINAE

360. **Monalonion xantliophilum** (Walker, 1873). - É bem conhecido na zona cacaeira da Baía, onde, ha muitos anos, é designado "chupança do cacau" (figs. 419 e 420).

Trata-se de um Hemíptero da família Miridae, que ataca as partes epigeas do cacaeiro, produzindo nos frutos lesões que caracterizam a chamada "bexiga do cacau".

ZEHNTNER em colaboração com TORREND (1917) e BONDAR (1924, 1937), em interessantes comunicações, ocuparam-se especialmente do inseto e das lesões por ele produzidas.

ZEHNTNER, que anteriormente estudara os hábitos de Mirídeos do gênero *Helopeltis*, pragas do cacauero em Java e Ceilão, não tendo podido determinar a espécie brasileira, designou-a provisoriamente *Mosquilla vastatrix*.

Com exemplares do inseto remetidos por ZEHNTNER pude, na ocasião, verificar que pertenciam a uma espécie de *Monalonion*.

Ultimamente BONDAR, retomando o estudo destes Hemípteros, enviou-me para determinação as espécies que tem observado na região cacauera.




Fig. 421 - Asa de *Monalonion xanthophilum* (Walker, 1873) (Miridae) (X 13).

No material recebido encontrei, além de *Monalonion xanthophilum* (Walker, 1873), *Monalonion atratum* Distant, 1883 e mais duas outras espécies: *Monalonion Bondari* Costa Lima e *Monalonion parviventre bahiense* Costa Lima.

Na Baía, segundo Bondar, *M. atratum* cria-se em embauba (*Cecropia* sp.) e *M. parviventre bahiense*, além do cacauero, ataca a Rubiácea *Hamelia patens*.

Sobre estas espécies BONDAR escreveu recentemente novo artigo (1939). Enquanto não reexaminar o material que

anteriormente me enviou, nada poderei dizer a respeito. Pretendo, porem, fazê-lo, logo que possa, dizendo então sobre *Monalonion flavosignatum* Knight, 1939 e *Monalonion knighti* Bondar, 1939.

A seguir transcrevo o que ZEHNTNER (1917) e BONDAR (1937), escreveram sobre o *Monalonion xanthophilum*.

1. A MOSQUILLA

(*Mosquilla vastatrix* Torrend & Zehntner, in litteris)

"A *mosquilla*, inseto *hemíptero*, uma espécie de "*percevejo do mato*", ataca os frutos de vários tamanhos como também as pontas ainda verdes dos galhos. Estes insetos são munidos de órgãos bucais em forma de estilete que se introduzem nos tecidos das plantas para sugarem a selva que lhes serve de nutrição. Como consequência dessas lesões ou picadelas, os tecidos tocados morrem. Nos *frutos*, vê-se aparecer pequenas manchas ou pintas arredondadas, pretas de dois a tres milímetros de diâmetro e até dois milímetros de profundidade.

As *larvas* da mosquilha atacam os frutos do mesmo modo que o fazem os insetos adultos, com a diferença que as pintas pretas por elas produzidas são menores, e de diversos tamanhos, conforme a idade que possuem.

Nas picadelas dos frutos a casca fica muito dura, derramando-se delas, às vezes, quando novas, um líquido que, depois de seco, deixa um pó esbranquiçado, cristalino de natureza calcárea

É curioso notar-se a rapidez com que as manchas produzidas pelas picadelas surgem nos lugares lesados; em poucos segundos depois de perfurados, os tecidos tocados tomam uma cor verde-escura, que se estende visivelmente, tornando-se mais carregada, enquanto o inseto se acha na ação de sugar, parecendo até que os insetos segregam uma substância venenosa que injetam no momento de introduzir os estiletos da tromba, análoga à que se observa no caso das murissocas.

Si ha grande número desses insetos, os frutos atacados aparecem em pouco tempo densamente pintados de preto, terminando as pintas por confluírem e os referidos frutos tomarem a cor preta mais unida. Isto se dá, principalmente e em primeiro lugar na parte apical, sucedendo que, às vezes, a cor preta estende-se sobre toda a superfície. Os frutos

quando novos, secam em pouco tempo; os de mais ou menos 10 centímetros de comprimento em diante, resistem mais e, quando não morrem, ficam deformados e não, têm grande valor para a colheita. Nos casos em que as pintas confluem, a camada lesada da casca endurece e não podendo acompanhar o crescimento das partes sãs, racha em sentido transversal.



Fig. 422 - Frutos de cacaueteiro com lesões produzidas por *Monalonion bondari* Costa Lima, 1938 (Fot. Bondar).

As vezes, a casca, morta cai em pedaços, cicatrizando a parte ainda viva; e em outras ocasiões as rechaduras aprofundam-se até o centro do fruto, produzindo o secamento destes. Entretanto, si os frutos atingem o tamanho definitivo, sofrem relativamente pouco e fornecem amêndoas aproveitáveis.

Muito mais sério é o ataque aos *renovos* isto é, às pontas ainda verdes dos galhos, às pontas dos ramos, onde as picadelas dos insetos provocam manchas maiores e menos arredondadas, e m número reduzido. As picadelas acham-se também nos pecíolos das folhas mas não se encontram no

limbo destas. Em consequência do ataque, ainda que moderado, as folhas e pontas verdes dos galhos murcham e secam dentro de poucos dias, ficando aquelas ainda aderentes por algum tempo, não conseguindo assim as árvores atingidas pelo mal, desenvolver folhas novas, apresentando o aspecto de haverem sido tocadas pelo fogo ou "*queimadas*" donde se deriva a denominação de "*queima*" para o fenómeno.

Finalmente as folhas caem, ao passo que as pontas dos galhos persistem no estado de completa secura e triste nudez.

Os renovos menos tenros não fenecem pelo ataque, mas apresentam as cicatrizes nos lugares das antigas picadelas, ficando mais ou menos deformados e sem vigor.

Semanas ou meses depois de um tal ataque surgem outros renovos, menores de que os primeiros, em maior número, implantados pouco, abaixo da extremidade morta dos galhos, que podem ser atacados por sua vez, e si os ataques se repetem, as árvores perdem galhos mais compridos e podem morrer, finalmente, por completo esgotamento. Apresso-me em dizer que, até agora, isso não se deu entre nós no entanto, em vista dos enormes estragos ocasionados nas Índias Orientais por um inseto muito semelhante ao de que tratamos o *Helopeltis*, é bem possível que também a mosquilha seja capaz de matar os cacauzeiros desta zona, caso que a praga continue, o que é de recear.

Os insetos perfeitos têm sete a oito milímetros de comprimento, quando do sexo masculino, e nove a 10 milímetros, quando do sexo feminino, incluindo-se as asas. São de forma alongada e têm as pernas e antenas compridas; sua cor é um tanto variável, sendo as fêmeas de cor mais viva, e de um vermelho alaranjado, e os machos amarelos com umas pintas pretas no lado do torax. As asas são fuliginosas, tendo as anteriores duas pequenas manchas estreitas, amareladas, na margem lateral; as pernas são amareladas e às vezes, em parte, castanhas; as antenas são pretas e a face superior do torax é de um vermelho-alaranjado.

Nos insetos *machos* observam-se, quasi sempre, duas estrias castanhas, longitudinais, que ocupam às vezes quasi todo o torax e que são também encontradas em algumas do sexo feminino.

Pelo aspecto geral esses insetos fazem lembrar certas mu-rissocas grandes do mato, razão por que receberam a denominação de "*mosquilha*", que vem do *Equador* onde uma espécie aparentada causa semelhantes estragos, com a que estudamos,

havendo eu e o Revmo. Pe. Torrend combinado com tal denominação, por já ter sido aceita em tratados modernos sobre a cultura do cacauero.



Fig. 423 - Fragmentos de caule de *Cecropia adenopus* com lesões resultantes das posturas de *Monalonion Knighti* Bondar, 1939 (Foto Bondar).

As mosquitas perfeitas são bastante ágeis, principalmente quando o tempo é quente. Embora não voem muito bem, são em todo o caso capazes de transportarem-se de uma plantação a outra, sendo este o modo principal da propagação da praga que se estende e alastra. As fêmeas poem os ovos dentro da casca dos frutos e nas pontas verdes dos ramos,

no número de cerca de 30 cada uma. Os lugares onde são postos os ovos são marcados do um ponto escuro cada um; olhando de lado percebem-se dois ca belinhos esbranquiçados que saem da casca e que são na verdade dois pequenos tubos muito finos. dando acesso ao ar e garantindo assim a respiração dos ovos, aliás completa e hermeticamente fechados dentro da casca mucilaginosa.

Cousa semelhante observa-se no caso do *Helopeltis*, onde os dois cabelinhos são de comprimento diferente entre si, ao passo que são de igual comprimento nos ovos da mosquilha.

Com espaço de 12 a 14 dias da postura saem as larvas que começam a sugar a seiva e com desenvolvimento bastante apreciável no crescer, mudando cinco vezes de pele, completando-se todo o desenvolvimento do ovo até o inseto alado, em cerca de 30 dias. De um e meio milímetros de comprimento que têm as larvas logo depois de nascidas, alcançam até seis à sete milímetros no estado de ninfa, possuindo pernas e antenas compridas e são de cor amarela, marcadas de vermelho-alaranjado na cabeça, no torax, na base do abdomen (face superior) e nos cantos laterais do corpo inteiro, sendo as antenas e pernas de cor parda avermelhada. Elas podem ser facilmente observadas nos frutos embora sejam habéis em esconderem-se quando inquietadas. E para serem encontradas convem que sejam examinadas primeiramente os frutos, quando as suas pintas estão frescas, e ainda não tomaram a cor preto-escura.

Quando as larvas andam, conservam a extremidade posterior do corpo voltada para cima.

As mosquilhas mantêm-se de preferência nos frutos, porque estes lhes oferecem melhores condições de vida do que os renovos, sendo necessário notar-se que a casca succulenta de um fruto, quando grande, suporta muitas centenas de picadelas, sendo a mesma quantidade suficiente para matar grande parte dos renovos de uma árvore visto que seis à oito picadelas bastam para fazer secar um renovo com todas as suas folhas.

Por esta razão, nas plantações velhas, com abundância de frutos, a praga espalha-se relativamente pouco, podendo ela manter-se durante anos no mesmo grupo de árvores. quasi sem ofender os renovos, encontrando-se destes focos talvez em todas as plantações de uma certa extensão.

Nas plantações novas, de quatro à oito anos, havendo menos frutos, as mosquilhas, especialmente as de asas transportam-se mais de pressa para os galhos e renovos, donde se

espalham para as árvores vizinhas, continuando as duas devastações, razão por que as plantações novas sofrem muito mais, disseminando-se a praga por áreas maiores, atacando plantações inteiras e tanto nos frutos quanto nos renovos. É então que o quadro da zona flagelada oferece ao agricultor um aspecto mais triste, mesmo desolador, podendo-se verificar que a praga já existe há anos. Assim pode concluir-se do estado dos galhos finos, da intensidade do mal que produziu a perda das pontas primitivas dos ramos, resultando outras novas, atacadas por sua vez e que apresentam cicatrizes de antigas picadelas. Nas plantas protegidas por árvores de boa sombra, o ataque é sempre muito menos violento e o cacau da variedade "comum" é menos atacado do que as variedades "Pará" e "Maranhão".

Conforme já disse no meu livro sobre o cacauzeiro da Baía, anteriormente citado, verifiquei a praga da mosquilha em 1909, nos dois municípios de Ilhéus e Itabuna, ainda em pequeno número e atacando exclusivamente os frutos. Em 1911, os insetos já se tinham muito multiplicado e atacavam também os galhos novos. Desde esta época a praga alastrou-se cada vez mais, embora não na proporção que eu receiava, em analogia ao desenvolvimento que observei nas Índias Orientais, com relação à praga da *Helopeltis*, que, quanto ao mais, se manifesta absolutamente como a da mosquilha.

Meios de combate. O meio mais simples de matar relativamente muitas mosquilhas é de esmagá-las passando-se as mãos contra os frutos ocupados por elas, as quais por serem tenras, morrem facilmente, não podendo ser praticado esse processo contra os frutos inacessíveis, por causa da inconveniência do torcimento dos pecíolos dos frutos na procura dos insetos, o que produz murchamento de muitos frutos e dá prejuízo talvez maior do que o causado pela mosquilha.

Como tenho provado com experiências realizadas em Java, os *Helopeltis* podem ser debelados com a *emulsão de querosene* aplicada por pulverizadores. Não há dúvida de que tal meio serviria também no caso da mosquilha, mas parece-me que as pulverizações não poderão ser aplicadas economicamente nas condições de nossa cultura e em razão da grande extensão atingida pelo mal.

O único método de fácil emprego e relativamente eficaz é o de destruir as mosquilhas nos frutos, *queimando-as ou flamejando-as com fachos*, podendo estes ser feitos como um gomo de bambú fino, de três a quatro centímetros de diâmetro.

Enche-se o bambú do combustível, que é o querosene ou o álcool, e fecha-se a extremidade por meio de uma torcida bem comprimida, que pode ser feita de um pedaço de aniagem, de seis a oito centímetros de comprimento. Convem que o facho produza grande chama, capaz de envolver os frutos em poucos instantes. No caso que não queime bem, vira-se o facho de cima para baixo a fim de untar a torcida, e sendo este bem colocado e firme, não deixará derramar o combustível. Na extremidade inferior, o bambú é cortado de modo a formar uma ponta que sirva para fincá-lo na terra, quando não se acha em uso. Além disso, o pedaço oco, situado em baixo do nó serve para colocar o facho numa vara, que lhe permite atingir os frutos dos galhos mais altos das árvores. Em Java verificou-se que um facho contendo tres a quatro decilitros de querosene, funciona bem, durante seis horas. Tomando-se portanto, isso por base, vê-se que com meio litro, um homem poderia trabalhar quasi o dia inteiro.



Fig. 424 - *Tenthecoris bicolor* Scott, 1886 (Miridae) (X 4,2).

O álcool flameja melhor do que o querosene; entretanto, é em geral mais caro e gasta-se quasi duas vezes mais do que no emprego do querosene.

Basta flamejar os frutos durante tres a quatro segundos, para dar em resultado a morte da maior parte dos insetos de um fruto, mesmo daqueles que ficarem com as antenas ou pernas chamuscadas que morrem pouco tempo depois.

Este processo serve principalmente nos casos em que a praga se limita ainda em grupos de árvores, isolados os quais podem ser tratados com todo o cuidado. Para o obter-se bom resultado, torna-se preciso o conhecimento de todos esses lugares, nas fazendas, e tratá-los com frequência

Somente assim será possível manter a praga dentro de limites suportáveis. Si, pelo contrário, o mal já se tiver estendido em plantações inteiras e até aos renovos, o combate por meios directos é difficilimo, sem resultados compensadores. Neste caso, deve-se recorrer aos meios indirectos, dos quais tratarei noutro capítulo.

Como curiosidade, menciono que encontrei um caso isolado em que uma mosquilha, com asas, foi atacada e morta por um *fungo*, cujo micélio branco se desenvolvia no corpo e aparecia na superfície, em todas as juntas do corpo e das pernas. Si tivesse esse fungo virulência suficiente para infeccionar com facilidade outras mosquilhas, provocando uma epidemia, poderia formar-se ótimo auxílio no combate contra a praga. Entretanto, não tenho muita esperança de que assim aconteça, e isso pelos resultados negativos ou incertos obtidos até agora com outros fungos semelhantes, observados em insetos, noutros países. Não obstante, vale a pena ter a atenção fixada para este caso." (ZEHNTNER).

Agora as observações de BONDAR:

"Por várias vezes e de diversas zonas durante estes últimos anos recebemos frutos de cacau doentes. Na maioria dos casos trata-se de doenças comuns a toda a zona cacau-eira, o cancro do fruto ou bexiga do cacau causado pelo inseto chupador e a ferrugem. Para divulgar os conhecimentos mais detalhados sobre o cancro dos frutos do cacau uma das doenças mais graves desse produto vegetal, publicámos estas linhas.

O inseto, que não é novo na literatura agrônômica até a data de nossas investigações não era conhecido pelo seu verdadeiro nome científico nem sua posição na escola entomológica.

Em 1914, o Dr. Zehntner, na sua obra "Le cacaoyer dans l'Etat de Bahia", sem ter o nome do inseto, escreve a respeito as seguintes previsões, comparando-o com a praga no oriente - *Helopeltis*.

"Si este flagelo toma extensão, como parece tencionar, ele pode ocasionar verdadeiro desastre para a cultura, pois ele não semente ameaça as safras, mas as plantações mesmas, as árvores não resistem aos ataques repetidos durante alguns anos seguidos, como foi provado no caso de *Helopeltis*. Tendo em vista as perdas enormes que os *Helopeltis* ocasionam no Oriente, seria bom ocupar-se dum modo ativo, a combater a praga e estudar os meios de destruição antes que seja tarde demais".

Em 1917, o Padre C. Torvend e o Dr. Leo Zehntner, no relatório sobre as moléstias do cacauero na Baía, tratam longamente do inseto, denominado-o *Mosquilla vastatrix*. Esta denominação não pode ser conservada, visto que a espécie tem seu nome anterior.

O inseto pertence à ordem dos Hemípteros-Heterópteros, família dos Capsídeos, género *Monalonion*. O género é americano, propagado na região tropical.

Na lavoura do Equador o cacauero é perseguido por duas espécies deste género: *Monalonion atratum* Dist. e *Monalonion dissimulatum* Dist. As duas são conhecidas com o nome comum de "Mosquilla" e ocasionam à lavoura notáveis prejuízos.

A nossa espécie, *Monalonion xanthophyllum*, Walk., é propagada em toda a zona cacauera da Baía. Tivemos ocasião de verificar a sua presença e os danos causador nos cacauais de Belmonte, Rio Pardo, Serra da Onça, em Itabuna e Ilhéus.

Não se pode admitir que o inseto foi importado junto com o cacauero. A espécie deve ser nossa, indígena, criando-se em plantas de nossa flora local. Quais são estas plantas? Depois de vários anos de investigações, de procura pelas matas, capoeiras e cacaueras finalmente descobrimos a planta natural da ceva deste inseto. É uma planta sub-arbustiva das nossas florestas, frequente nos cacauais, não tendo nome no vocabulário popular, e denomina-se *Gica*. Esperamos a época da floração e frutificação para identificação científica. Nesta ocasião daremos a descrição da planta para seu fácil reconhecimento pelos lavradores de cacau, visto a importância que a plantinha poderá, ter na defesa da lavoura cacauera contra um dos seus mais sérios inimigos. Esta planta, nas nossas observações em Água-Preta, raramente se encontra sã. Geralmente se acha muito perseguida, atrofiada pelo *Monalonion*. Nela, como no cacau, o inseto com as picadelas, provoca manchas, semelhantes a queimaduras. Os estragos também são feitos na haste, ainda herbácea, que, com as picadelas, forma cancos e nos pedúnculos foliaes que também racham, abrindo feridas cancerosas. É principalmente nas folhas que as larvas e os adultos se alimentam, provocando queimaduras e aniquilamento do limbo. Os pés têm sempre aparência doentia, atrofiada. As pontas das hastes e dos ramos cancerosos, frequentemente se apresentam mortos pela destruição das folhas novas. Nesta planta o inseto deposita ovos introduzindo-os na haste e nos gomos foliaes.

É curioso notar que onde existe este arbusto cheio de insetos, os cacaueros vizinhos têm frutas sadias. Evidentemente, enquanto o *Monalonion* tem a sua planta natural de ceva, ele profere esta. É provável que só na ocasião de limpas do cacau, quando se tiram estas plantinhas, o inseto

privado de sua alimentação natural, passa ao cacauero, no qual se adapta bem e continua a procriação.

Tirando o inseto da sua planta normal, e oferecendo-lhe o cacau, ele no primeiro dia se abstem de alimentação. Só no segundo dia, tanto as larvas como os adultos metem o rostro nos "frutos do cacau, provocando as queimaduras e os cancos. Estudando no cacauero a biologia do inseto, verificamos que as fêmeas depositam ovos tanto nas hastes tenras dos renovos, como, e principalmente, nos frutos verdes do cacau, introduzindo-os, um por um, no tecido da planta. A fêmea deposita em média 4-5 ovos por dia, e observamos posturas, iniciando este mister 3-4 dias após a cópula, prolongando-se a oviposição cinco a seis dias seguidos, depositando um total, nas condições de cativeiro de 18 a 40 ovos por fêmea.

O lugar de desova apresenta uma pequena elevação, sem queimadura do tecido, da qual sobresaem dois pequenos filamentos brancos com meio milímetro de comprimento, terminado cada filamento numa pequena cabecinha. São tubos respiratórios pelos quais o ovo, mergulhado dentro duma seiva mucilaginosa, se abastece de ar. O ovo mede 1,5^{mm}. de comprimento; é branco, translúcido, um tanto encurvado.

A larva nasce poucos dias depois; tem cerca de um milímetro de comprimento e começa a se alimentar, chupando a seiva do fruto do cacau. Cada muda aumenta o tamanho e os rudimentos das asas. Quando crescida, no estado de ninfa, mede 7^{mm}. de comprimento. O corpo da larva em todas as idades é amarelo-avermelhado. No lado dorsal da cabeça ha uma linha vermelha transversal, e entre os dois olhos. Antenas vermelhas. Uma faixa vermelha atravessa o mesotorax na margem anterior e continua para trás, colorindo os rudimentos das asas. No metatorax ha uma outra faixa vermelha, mais larga. Uma faixa vermelha atravessa o abdomen, que dos lados é também marginado de vermelho. As pontas distantes do femur de rodas as patas, vermelhas.

As larvas e ninfas têm movimentos bastante desembaraçados, são bastante ágeis e correm de um lugar para outro, procurando ponto mais favoravel para enfiar o rostro, chupando a seiva. Os adultos se formam no fim de cerca de um mês desde a postura do ovo. As larvas que se criam em sua planta natural são geralmente mais coloridas de vermelho, do que as que se criam em cacau.

Os insetos são bastante ágeis, voam facilmente evitando serem apanhados. Todavia, o vôo é um tanto lento, pegando-se estes, facilmente, com a mão, no vôo.

O inseto procria-se igualmente durante todo o ano.

O inseto adulto mede 8^{mm}. no comprimento do corpo; as asas ultrapassam o corpo de 2 a 3^{mm}. A cabeça é escura, olhos pretos, antenas escuras, avermelhadas na base. O protorax e o abdomen de cor vermelho-alaranjada. O meso e metatorax, amarelo-claros, do lado ventral. Asas fuliginosas; as anteriores têm duas manchas estreitas amareladas na margem lateral. Pernas amarelas; o par posterior com tífias na segunda metade e tarsos escuros.

As fêmeas diferem dos machos, principalmente pelo abdomen grosso, provido na metade posterior, de um ovopositor em forma de sabre, adjacente ao abdomen.

A cor vermelha da larva, discordando da casca verde de frutos de cacau, suscitou-nos certas reflexões. Geralmente os insetos moles, mal protegidos contra animais depredadores possuem a coloração mimética do ambiente em que vivem. O assunto ficou resolvido com a descoberta da planta natural de ceva do *Monalonia*. Esta planta, que chamaremos de Gica, tem manchas vermelhas nas folhas doentes, como também parcialmente são avermelhados os pecíolos e a nervura principal. A haste, na inserção das folhas também é vermelha, quando nova de modo que neste ambiente, o vermelho da larva constitui uma simulação protetora. É uma cor mimética, cor de proteção.

Nas plantações de cacau o inseto encontra-se esporadicamente, e evidentemente não tem tendência a generalizar-se. Encontramo-lo em várias fazendas do município de Belmonte, Canavieiras, Itabuna, Jequié, Boa Nova e Ilhéus, existindo mesmo nas plantações da Estação Geral de Experimentação. O inseto se manifesta num ou noutro pé ou grupos de pés geralmente nas roças desom breadas e nos aceiros, estragando uma ou todas as frutas, enquanto os pés vizinhos estão isento do mal. Numas fazendas é frequente, como na fazenda "Lombárdia", de Magnavita e na fazenda do Dr. Francisco de Paiva, em outras como nas fazendas do Coronel Hermelino de Assis e Dr. Paschoal Camelyer, o inseto não existia na ocasião das nossas visitas. Do mesmo modo, o inseto é esporádico no município de Jequié; é frequente e muito prejudicial numas fazendas, raro ou não existente em outras.

Os estragos causados por ele ao cacau são característicos. O inseto, larvas e adultos, chupam a seiva da fruta de cacau de preferência no lado mais exposto à luz. Introduzindo o rostro nos tecidos da planta, o bichinho, evidentemente injeta uma substância venenosa, pois os tecidos adjacentes à picada num instante enegrecem e morrem, formando no prazo de 21 horas uma ferida cancerosa, de 3 a 7^{mm} de diâmetro, com tecidos amortecidos na profundidade de 5 a 8^{mm}. Por causa destes cancos, o povo denominou esta doença de "bexiga de cacau". Cada indivíduo faz por dia, no cativeiro, cerca de 40 picadelas, provocando outras tantas feridas cancerosas. A larva quando pequena faz de 10 a 15 picadelas, aumentando o número à medida do crescimento. Poucas feridas destas bastam para abortar um bilro de cacau. Como numa fruta, geralmente, criam-se alguns indivíduos. No fim do desenvolvimento deles a fruta fica coberta deste cancro, seca externamente e racha. As amendoas não se desenvolvem, e a fruta fica completamente imprestável. As frutas atacadas depois de crescidas mais da metade resistem melhor e frequentemente, podem ser aproveitadas. Na falta das frutas, o inseto ataca os renovos, causando também estragos notáveis; algumas picadelas bastam para provocar a morte do renovo, interceptando-lhe a seiva pelos cancos formados na haste.

Tratamento - Nas condições atuais quando relativamente pouco conhecemos ainda a respeito desta praga, pode-se duvidar do resultado econômico de qualquer tratamento com pulverizações. A previsão do Dr. Zehntner, do alastramento da praga não se realizou e podemos esperar que não se realizará. O fato é que o cacau entre nós conta mais de cem anos de existência, a lavoura extensa existe já cerca de 50 anos, entretanto, o inseto até agora não tomou conta das plantações, mas, se encontra assaz raramente, prejudicando um ou outro cacaueiro desombreado. Qual é o motivo pela qual o *Monalonion* não se alastra mais, tendo a mesa largamente servida de vastos cacaueiros?

O inseto é do nosso meio biológico e tem seus inimigos naturais que o guardam dentro de limites razoáveis conservando sempre, certo equilíbrio. Uma vez que até agora, o inseto não tomou proporções assustadoras podemos ter a esperança de que ele não as tomará.

De certo, o lavrador tem interesse em reduzir o mal, tanto quanto possível, aproveitando todos os meios principalmente, protegendo pássaros insetivos. O tratamento direto poderá

ser eficaz contra as larvas, que não vôm. É facil, passando perto dos pés atacados, se passar a mão nas frutas cancelosas, com larvas na superfície, esmagando-as assim. As frutas no alto, poderão ser atingidas com emulsão de querosene, por meio de pulverizador. O Dr. Zehntner aconselha o emprego de chamas para queimar os bichinhos. Os adultos são insetos espertos ágeis e difficilmente podem ser combatidos. Porem, matando as larvas não haverá adultos.

Na Estação Geral de Experimentação no ano de 1935, fizemos experiências de tratamento contra o *Monalonia* com pulverizações repetidas de calda bordalesa. Recorremos a esta droga fungicida pela razão da sua adesão às frutas e folhas de cacaeiro, não sendo lavada pelas chuvas constantes da zona. Os inseticidas conhecidos são facilmente laváveis, de modo que a primeira chuva inutiliza o efeito preventivo da pulverização.

O resultado, como era de esperar, não foi, bem claro. É verdade que se diminuiu cerca de 50 por cento das frutas doentes, no lote tratado em comparação com o não tratado, porem depois de duas a tres pulverizações o inseto não foi destruido. As razões são as seguintes: os ovos dentro da fruta de cacau são difficilmente atingíveis. Os adultos facilmente vôm. Envez des larvas mortas, diretamente atingidas pela droga, surgem outras nascendo dos ovos. O inseto chupando o suco de dentro da fruta, não é sujeito a envenenamento pela alimentação.

Economicamente, este tratamento é caro, devido à necessidade de pulverizadores de drogas e de mão de obra. Poderá ser empregado apenas em alguns trechos de cacauais, pois dando sempre um pequeno resultado positivo contra o cancro, preserva tambem o fruto contra a podridão pelo cogumelo, *Phytophthora* e mesmo contra a ferrugem causada pelo Thrips.

Urn, problema de tratamento ainda não resolvido é o emprego das nossas plantas espontâneas que alimentam o bichinho. Si o *Monalonia* prefere plantas naturais de ceva, da nossa flora, ao cacau, então, devem-se plantar nos cacauais as plantas preferidas para atrair o inseto e destruí-lo. Si, pelo contrário ele deixa as plantas espontâneas para passar ao cacaeiro, entre será preciso extinguir estas plantas. A verificação mais apurada deste problema se acha em estudo na Estação Geral de Experimentação de Água-Preta, onde um trecho de cacaual é cultivado com a planta natural de ceva de *Monalonia*, intercalada no meio dos cacaueiros.

Medida preventiva - Si a planta denominada *gica* for a única em que o *Monalunion* se cria, além do cacaeiro, com o atualmente nos parece, seria facil ter as plantações livres da doença de cancro das frutas. Para isto, bastará destruir a plantinha um ano antes de instalar o cacau, para assim eliminar o inseto da zona de plantação e sendo as plantações de cacau livres da doença do cancro da fruta, fiscalizar para sempre eliminar a plantinha que cria o bicho. Nos trechos, porem, onde o *Monalunion* se manifestou, cultivar pelo contrário a plantinha que o inseto, parece, prefere ao cacau.

O Padre Torrend e o Dr. Zehntner consideram este inseto como uma das causas principais da doença chamada "queima". Para nós, parece, que os estragos produzidos pelo *Monalunion* são bem caracterizados pelos cancos nas frutas e nos renovos, e não devem ser confundidos com outros males que têm o nome coletivo de queima. Para denominar esta doença de cacau, propomos o nome mais exato, *mal de chupança*.

Nas plantações sombreadas com árvores altas, o inseto é muito raro ou não se encontra. Daquí a orientação para lavrador: *querendo leer os frutos livres de cancos, conserve as plantações de cacau sombreadas*".

361. **Collaria scenica** (Stal, 1876) (= *Trachelomiris scenicus* (Stal, 1876)).

Eis o que escreveu PUTTEMANS sobre este pequeno Mideio:

"Encontrei pela primeira vez o *Trachelomiris scenicus*, cuja determinação devo ao Dr. Costa Lima, no Jardim de Aclimação de S. Paulo, onde o inseto causava grandes danos aos capinzais (*Panicum numidianum*), que apresentavam o facies das doenças conhecidas entre nós por *queima*. Tantos os insetos adultos como as larvas, esvasiam as células parenquimatosas de um modo particular; depois de perfurarem a cutícula de uma célula epidérmica, dobram o rostro e furam as paredes celulares transversais, menos espessas, de uma série de células enfileiradas, esvasiando-as sucessivamente; repetem essa operação cinco ou seis vezes antes de se deslocarem deixando assim as folhas salpicadas de grupos de estrias descoradas, paralelas, de dois a tres milímetros, que são muito características.

Encontrei o mesmo inseto no Distrito Federal em várias gramíneas entre as quais milho e aveia.

Ensaio de criação em cativeiro no intuito de estudos e particularidades biológicas, não me deram resultados favoráveis, pois os insetos morrem no fim de poucos dias."

Subfamília CAPSINAE

362. **Horcias nobillelus** (Berg, 1884). - HAMBLETON (1938), chamou atenção para os estragos produzidos por este inseto nos algodoeiros de São Paulo, principalmente em capulhos e botões florais.

Encontra-se-o também em Malváceas silvestres, como sejam: "guaxuma branca" (*Sida cordifolia*), *Sida rhombifolia* "picão" (*Bidens pilosa*) e uma Leguminosa não determinada.

Subfamília BRYOCORINAE

363. **Tenthecoris bicolor** Scott, 1886 (= *Eccritotarsus orchidearum* Reuter, 1902) (fig. 421).

Causa nas orquídeas e fetos estragos análogos aos produzidos pelas espécies anteriormente estudadas

Sobre este inseto devem ser consultados os trabalhos de REUTER (1907), WEISS (1917) e MONTE (1932).

Apresenta a cabeça, o pronoto, o bordo externo do corium e grande parte do cuneus, de cor vermelha-alaranjada. O escutelo e a maior parte do cório são de um azul metálico muito escuro. Membrana quase totalmente enfuscada, exceto na ponta. Face inferior do corpo amarelada. Tibias enfuscadas. Antenas e olhos pretos.

Combate-se-o mediante aplicações de inseticidas externos: pulverizações de emulsão sabonosa de querosene, solução diluída de nicotina comercial ou decoto de folhas de tabaco.

364. **Bibliografia.**

ABRAHAM, R.

- 1937 - Beobachtungen tiber die Eiablage einiger Capsiden.
 Arb. phys. angew. Ent. Bul. 4:321-324, 2 figs.

ATKINSON, E. T.

- 1890 - Catalogue of the Capsidae, II. Catalogue of the
 Insecta. Order Rhynchota. Sub. order Hemiptera-
 Heteroptera. Fam. Capsidae.
 Jour. Asiatic. Soc. Bengal, 58 (1889), Suple-
 ment: 25-199.

AWATI, R. P.

- 1914 - Mechanism of suction in tile potato capsid bug
Lygus pabulinus.
 Proc. Zool. Soc. Lond, 685-733.

BERGROTH, E.

- 1922 - New neotropical Miridae (Hemiptera).
 Ark. Zool. Stockholm, 14, 21, 14 p.
 1922 - On some South American Miridae described by C.
 Stal.
 Ibidem, 22, 25 p.

BONDAR, G.

- 1937 - Cancro dos frutos do cacau, causado por *Monalio*
xanthophillum, Walk., "chupança do cacau"
 Rodriguesia, Rio de Janeiro, 3:179-186, 2 figs.,
 2 ests.
 1939 - Notas entomológicas da Baía, IV.
 Rev. Ent. 10:1-1.1, 5 figs.

BRUNER, S. C.

- 1934 - Notes on Cuban Dicyphinae (Hemiptera-Miridae).
 Mem. Soc. Cubana Hist. Nat. 8:35-49, 3 ests.

DISTANT, W. L.

- 1904 - Rhynchotal Notes XX - Heteroptera (On the Capsi-
 dae in the British Museum).
 Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:103-114.

HAMBLETON, E. J.

- 1938 - O percevejo *Horcius nobilellus* (Berg) como nova praga do algodoeiro em São Paulo. Observações preliminares.

Arq. Inst. Biol. 9:85-92, ests.12-14.

HUNTER, W. D.

- 1926 - The coilon hopper, or so called "cotton flea".

U. S. Dept. Agric., Dept. Circul. 361, 11 p. 4 figs.

KING, W. T. & COOK, W. S.

- 1932 - Feeding punctures of Mirids and other plant-sucking insects and their effect on cotton.

U. S. Dept. Agric., Tech. Bull. 296, 11 p., 3 ests.

KIRKALDY, G. W.

- 1906 - Notes on the classification and nomenclature of the hemipterous superfamily Miroidea.

Canad. Ent. 38:361-376.

KNIGHT, H. H.

- 1918 - Synoptical key to the subfamileis of Miridae (Hemiptera-Heteroptera).

Jour. New York Ent. Soc. 26:40-44, 1 est.

- 1939 - Monalonion Herrich-Scimeffer, descriptions of cacao species from Brasil (Miridae).

Rev. Ent. 10:226-230.

LIMA, A. DA COSTA.

- 1938 - Sobre os percevejos do gênero *Monalonion* (Hemíptera: Miridae).

Chat. Quint. 57:519-522, 3 figs.

MONTE, O.

- 1932 - A stigmonose das orquideas é causada pelo Hemíptero *Tenthecoris bicolor* Scott.

Chac. Quint. 46:561-562 2 figs.

MOREIRA, C.

- 1925 - Os percevejos capsídeos de fumo no Brasil.

Rio de Janeiro; publ. do Serviço de informação do Minist. Agric. Ind. Comér. 7 p., 4 figs.

PAINTER, R. H.

- 1930 - A study of the cotton flea hopper, *Psallus seriatus* Reut., with special reference to its effect on cotton plant tissues.
 Jour Agric. Res., 40:485-516, 7 figs.

PARSHLEY, H. M.

- 1915 - On the external anatomy of *Adelphocoris rapidus* Say, with reference to the taxonomy of the Miridae or Capsidae (Hemiptera).
 Ent. News, 26:208-213, ests. 7.

POPPIUS, B. & BERGROTH, E.

- 1921 - Beiträge zur Kenntnis der myrmecoiden Heteropteren.
 Ann. Mus. Hungar. 18:31-88, ests. 1 e 2.

REINHARD, H. J.

- 1926 - The cotton hopper.
 Texas Agric. Exp. Sta. Bull. 339, 39 p., 10 figs.

REUTER, O. M.

- 1907 - Capsidae in Brasilia collectae in Museo I. R. Vin-dobonensi asservatae.
 AnnaI. k. k. Naturh. Hofmus. 22:33-80.
 1907 - Eine neotropische Capside als Orchideen schädling in europäischen Warmhausung.
 Zeits. wiss. Insektenbiol. 3:251-254. 1 fig.
 1910 - Neue Beiträge zur Phylogenie und Systematik der Miriden nebst einleitenden Bemerkungen über die Phylogenie der Heteropteren-Familien.
 Act. Soc. Sci. Fenn., 37(3):167 p.
 1910 - Diagnoses praecursoriae Miridarum divisionis Res-theniaria.
 Ann. Hist. Mus. Nat. Hung. 8:15-33.

ROBERTS, I.

- 1930 - The tobacco capsid (*Engytatus volucer* Kirk.) in Rhodesia.
 Bull. Ent. Res. 21:169-183, 2 figs.

SMITH, K. M.

- 1920 - Investigation of nature and cause of the damage to plant tissue resulting from the feeding of capsid bugs.
 Ann. Appl. Biol. 7:40-55, 5 figs., 3 ests.

- 1926 - A comparative study of the feeding methods of certain Hemiptera and the resulting effects upon plant tissue, with special reference to the potato plant. *Ann. Appl. Biol.* 13:109-139, 10, figs., 4 ests.
- 1931 - Vírus diseases of plants anal their relationship with insect vectors. *Biol. Rev.* 6:302-344.
- 1933 - Recent advances in the study of plant viruses. London, XII - 423, 1 est., 67 figs.

WATSON, S. A.

- 1928 - The Miridae of Ohio. *Ohio State Univ. Bull.* 33,44 p.

WEISS, H. B.

- 1917 - Some unusual orchid insects (Hom., Lep., Dip., Col.). *Ent. News*, 28:21-29, ests, 4 e 5.

ZEHNTNER, L.

- 1917 - O "queima" dos cacauzeiros nos Municípios de Ilhéus e de Itabuna. Relatório apresentado h Associação Comercial de Ilhéus: 31-76.

Superfamília **CRYPTOSTEMMATOIDEA**

(*Dipsocoroidea*)⁸⁷

Família **CRYPTOSTEMMATIDAE**

(*Ceratocombidae*)⁸⁸

365. **Caracteres, etc.** - Constituem esta super família Hemípteros muito pequenos, apresentando o seguinte conjunto de caracteres: cabeça fortemente refletida; ocelos muito pequenos, antenas de quatro segmentos, sendo os dois basais muito curtos e os últimos filiformes, pilosos; rostrum de tres segmentos; pronotmn e scutellum visíveis, tarsos de tres articulos.

⁸⁷ Gr. *cryptos*, oculto; *stemma*, coroa, faixa.

⁸⁸ Gr. *keras*, corno (antena); *combos*, nó.

Hemelitros inteiramente coriáceos ou totalmente membranosos, nunca, porém, apresentando membrana diferenciada do corium. O sistema de nervação é também característico, pois, na parte correspondente ao corium, ha algumas nervuras formando duas células, das quais se originam uma ou duas nervuras longitudinais, que terminam na margem apical do hemelitra.

A família Cryptostemmatidae, com pouco mais de 50 espécies, compreende, segundo Mc ATEE & MALLOCH (1925), duas subfamílias: **Cryptostemmatinae** (*Ceratocombinae*) e **Schizopterinae**⁸⁹, ambas com representantes brasileiros.

Vivem estes diminutos Hemípteros em logares húmidos, geralmente no meio de folhas caídas em decomposição.

366. Bibliografia.

- Mc ATEE, W. L. & MALLOCH, J. R.
1925 - Revision of Cryptostommatidae, in the United States National Museum.
Proc. U. S. Nat. Mus. 67(13), 42 p., 4 ests.
- REUTER, O. M.
1891- Monographia Ceratocombidarum orbis terrestris.
Acta Soc. Sci. Fenn. 19:(6) p. 4, 1 est.

Superfamília HYDROMETROIDEA

Família HYDROMETRIDAE⁹⁰

(*Limnobatidae*)⁹¹

367. **Caracteres.** - Insetos semiaquáticos, pequenos, no máximo com pouco mais de dois cm., de corpo muito, estreito, linear, cabeça porreta, mais longa que o pronotum, dilatando-se para o ápice; antenas filiformes, de quatro segmentos, inseridas perto, do ápice da cabeça; olhos laterais, salientes, bem afastados do protorax; sem ocelos; rostrum mais curto que a cabeça, de tres segmentos; hemelitros, quando presentes, muito estreitos, semi membranosos; ostéo-

⁸⁹ Gr. *schizein*, fender; *pteron*, aza.

⁹⁰ Gr. *hydor*, água; *metreo*, medir.

⁹¹ Gr. *limne*, pequena coleção d'água; *bates*, marchador.

los presentes, porem rudimentares; tarsos de tres artículos; garras apicais (fig. 425).

Em geral cada espécie apresenta uma forma macróptera e outra braquíptera.

368. **Hábitos.** - Habitam coleções de águas tranquilas, sendo vistos, ora nas margens, ora sobre as folhas flutuantes de plantas aquáticas, deslocando-se lentamente ou com relativa facilidade.




Fig. 425 - *Hydrometra* sp. (Hydrometidae) (cerca de (X 3)).

São insetos predadores, alimentando-se de Ostracodos e larvas de insetos aquáticos quando vêm à tona d'água.

As vezes as formas desenvolvidas ou mais robustas são canibais, atacando as mais fracas.

A família Hydrometridae, com cerca de 40 espécies, foi subdividida por ESAKI (1927) em duas subfamílias - **Hydrometrinae** e **Limnobotodinae**, sendo a primeira representada pelo gênero *Hydrometra* Lamarck, 1801, com mais de 20 espécies da região neotrópica. Destas, as mais conspícuas são: *H. caraiba* Guérin, 1856, de Cuba, com 22 mm. e *H. melator* B. White, 1879, da Amazônia, com 18 mm. Esta nossa espécie, segundo TORRE-BUENO (1926), é bastante interessante, por possuir antenas muito longas, tão compridas quanto o corpo.

Para o estudo das espécies desta família é indicada a excelente monografia de TORRE-BUENO (1926).

369. Bibliografia.

ESAKI, T.

- 1927 - An interesting new genus and species of Hydrometridae (Hem.) from South America.
Entomol. 60:181-184, 2 figs.

HUNGERFORD, H. B.

- 1919 - The biology and ecology of aquatic and semi-aquatic Hemiptera.
Kansas Univ. Sci. Bull. 11:1-328, 30 ests.

HUNGERFORD, H. B. & EVANS, N. E.

- 1934 - The Hydrometridae of the Hungarian National Museum and other studies in the family (Hemiptera).
Ann.Mus. Nat. Hung. 28:31-112, 12 ests.

JACZEWSKI, T.

- 1928 - Hydrometridae from the State of Paraná.
Ann. Zool. Mus. Pol. 7:81-84, 1 est.

TORRE - BUENO, J. R. de la.

- 1926 - The family Hydrometridae in the western hemisphere.
Ent. Amer. (N. S.), 7:83-128.

Superfamília **GERROIDEA***(Hydrobiotica)*

370. **Caracteres.** Insetos aquáticos ou semiaquáticos, de aspeto variavel, providos de antenas tão longas ou mais longas que a cabeça; esta mais curta que o pronotum e o mesonotum reunidos; antenas de quatro segmentos; ocelos presentes, obsoletos ou ausentes; rostrum de quatro (Gerriidae e Hebridae) ou de tres segmentos (Veliidae e Mesoveliidae); hemelitos, quando presentes, com o corium total ou parcialmente membranoso, percorridos por nervuras longitudinais, que se anastomosam formando algumas células; ostéolos presentes; tarsos de dois ou tres artículos.

371. **Classificação.** - A superfamília Gerroidea compreende quatro famílias, assim diferenciadas:

- | | | |
|-------|---|---------------------|
| | Último artículo tarsal mais ou menos fendido e com as garras - pelo menos nas pernas anteriores - inseridas antes do ápice (garras anteapicais) | 2 |
| 1' | Último artículo tarsal não fendido e com as garras preapicais | 3 |
| 2 (1) | Fêmures posteriores excedendo consideravelmente o ápice do abdome; pernas médias e posteriores finas e alongadas, aproximadas, porem muito afastadas das anteriores; rostrum de 4 segmentos; espécies que deslisam ou patinam na superfície d'água | Gerridae |
| 2' | Fêmures posteriores não excedendo ou pouco indo além do ápice do abdome; pernas posteriores e médias não muito alongadas, estas equidistantes daquelas e das posteriores (exceto em <i>Rhagovelia</i>); rostrum de 3 segmentos; tarsos dímeros; espécies geralmente de | Veliidae |
| 3(1') | Clavus e membrana de estrutura idêntica; rostrum de 4 segmentos; tarsos dímeros; espécies geralmente de cor negra com partes prateadas | Hebridae |
| 3 | Clavus e membrana de estrutura diferente; rostrum de 3 segmentos; tarsos trímeros; espécies de cor verde, ou verde amarelada | Masoveliidae |

Família **GERRIDAE**⁹²*(Hydrobatidae)*

372. **Caracteres.** - Hemípteros aquáticos, tendo, no máximo, pouco mais de dois centímetros de comprimento, de aspecto muito característico, pois apresentam o corpo fusiforme, geralmente acuminado na parte trazeira, provido de pernas médias e posteriores finas e alongadas, sendo as ancas daquelas muito afastadas das ancas das pernas anteriores. Pernas anteriores mais curtas e robustas que as outras. Fêmures do par posterior excedendo notavelmente o abdomen; tarsos de dois artículos. Ocelos presentes, às vezes, porem, quasi invisíveis. Rostrum de quatro segmentos.




Fig. 426 - *Limnogonus aduncus* Drake & Harris, 1933 (Gerridae) (X 3).

Respeito ao desenvolvimento dos hemelitos e das asas, releva ponderar que se encontram nestes insetos quatro tipos diferentes de formas a dultas: formas macrópteras, de

⁹² Lat. *Gerris*, nome de um pequeno peixe.
Gr. *hydor*, água; *bates*, marchador.

asas e hemelitos completamente desenvolvidos; formas braquípteras, de hemelitos, atingindo pelo menos a metade do abdomen; formas pseudo-apteras, cujos hemelitos não excedem a base do 2º urômero, e, finalmente, formas apteras, sem asas e hemelitos. Numa mesma espécie, além das formas macrópteras, há, pelo menos, uma das outras formas. Todavia, em várias espécies, as formas macrópteras aparecem excepcionalmente.

As formas braquipteras e apteras distinguem-se das formas jovens, com as quais muito se parecem, pelo aspecto dos tarsos, nas últimas de um artículo e naquelas dimeros.

373. **Hábitos.** - Os Gerrideos, em geral, são vistos em agrupamentos, mais ou menos numerosos, deslocando-se rapidamente na superfície das águas paradas e sombreadas. Podem ser também encontrados em águas mais ou menos movimentadas. Há mesmo espécies que se deslocam no meio dos riachos de curso um tanto rápido, deslizando em sentido contrário ao da correnteza, de modo a se manterem no mesmo lugar. Ao executarem esses movimentos, mediante o impulso das pernas, fazem-no interruptamente, em arrancos sucessivos, como de remadas.

Mantêm-se facilmente na superfície d'água graças ao pouco peso que têm, à presença de pelos hídrofugos e à uma secreção que reveste os tarsos das pernas locomotoras, tornando-os imolháveis. Assim estes ficam aplicados à superfície d'água pela tensão superficial, deprimindo a massa líquida nos pontos de contacto.

As pernas médias são os principais órgãos propulsores e as posteriores servem mais para frenar e dirigir os movimentos; as pernas de um mesmo par movem-se simultaneamente. Com as anteriores, de tipo raptorial, capturam os pequenos insetos que caem n'água ou que frequentam plantas aquáticas.

Os Gerrideos só se mostram muito ativos na superfície d'água; fora dela movimentam-se mal, podendo, quando muito, dar saltos irregulares e desordenados.

374. **Espécies mais interessantes.** - A família Gerridae, de distribuição mundial, compreende cerca de 200 espécies, algumas das quais (do gênero *Halobates* Eschscholtz, 1822), exclusivamente pelágicas, são encontradas nos sargaços que flutuam no oceano, em latitudes tropicais e subtropicais.

Os Gerrideos, da América Meridional, pertencem às subfamílias **Gerrinae** e **Halobatinae**.

No Brasil, as espécies mais frequentemente encontradas pertencem aos gêneros *Limnogonus* Stal, 1868 (fig. 426) e *Cylindrostethus* Mayr, 1865.

375. **Bibliografia.**

DRAKE, C. J. & HARRIS, H. M.

- 1930 - Notes on some South American Gerridae (Hemiptera).
Ann. Carneg. Mus. 19:235-239.
- 1933 - Some miscellaneous Gerridae in the collection of the Museum of Comparative Zoology.
Psyche, 39:107-112.
- 1934 - The Gerrinae of the Western Hemisphere (Hemiptera).
Ann. Carneg. Mus. 23:179-240, 6 ests.
- 1935 - Notes on some American Gerrids (Hemiptera).
Ark. Zool. 28 B(2) 4 ps., 1 fig.
- 1935 - Notes on American water-striders.
Proc. Biol. Soc. Wash. 49:105-108.
- 1938 - "Veliidae y Gerridae" sudamericanos descritos por Carlos Berg.
Not. Mus. La Plata. 3 (Zool. 13):199-204, 1 fig.

LICHE, H.

- 1936 - Beobachtungen über das Verhalten der Wasserläufer (Gerridae, Hemiptera, Heteroptera).
Bull. Intern. Acad. PoIon. Sci. Lettres, B (8-10): 525-546, 5 figs.

SCHROEDER, H. O.

- 1931 - The genus *Rheumatobates* and notes on the male genitalia of some Gerridae (Hemiptera, Gerridae).
Kansas Univer. Sci. Bull. 20:63-99, 6 ests.

Familia VELIIDAE⁹³

376. **Caracteres.** - Hemípteros semi-aquáticos, com menos de um centímetro de comprimento, facilmente reconhecíveis pelo corpo alargado ao nível dos ângulos umerais e posteriormente atenuado. Pronotum em algumas espécies prolongado, posteriormente em longo processo spiniforme.

Pernas médias equidistantes das anteriores e posteriores. Femures do par posterior não excedendo o ápice do abdome; em algumas espécies apresentam-se denteados em baixo e consideravelmente dilatados; tarsos anteriores de um ou dois artículos, nas outras pernas de dois ou tres artículos; garras preapicais.

Ocelos obsoletos ou ausentes. Rostrum de tres segmentos.

Os Veliideos, na fase adulta, ou são alados ou apteros; em geral, porem, são dimórficos, apresentando, cada espécie, uma forma alada e uma aptera.

377. **Hábitos.** - Os Veliideos são encontrados nas margens ou na superfície dos pântanos e das águas correntes. Excepcionalmente têm hábitos marítimos (*Halovelia maritima* Bergroth, 1893 e *Trochopus plumbeus* (Uhler, 1894) (*Trochopus marinus* Carpenter, 1898) de Flórida e Antilhas.

Procuram quasi sempre logares sombreados. Saltam e movem-se com rapidez na superfície d'água; às vezes, porem, livremente ou apoiando-se num suporte qualquer, mergulham. Há mesmo algumas espécies que nadam com facilidade. Dentro d'água, no denso revestimento, aveludado que possuem, mantêm uma certa quantidade de ar.

Alimentam-se da hemolinfa dos pulgões que vivem nas plantas aquáticas e de outros pequenos insetos que frequentam o meio em que vivem.

⁹³ Etimologia desconhecida; talvez de *Velia*, uma colônia grega da Itália Meridional.

378. **Espécies mais interessantes.** - Ha mais de 100 Veliídeos descritos, pertencendo os do Brasil, principalmente, aos gêneros *Velia* Latreille, 1804, *Rhagovelía* Mayr, 1865 e *Microvelia* Westwood, 1834.

Encontra-se frequentemente no Rio de Janeiro *Velia basalis* Spinola, 1837 (*Velia bicolor* Blanchard, 1837-1813) e *Velia brachialis* Stal, 1860.




Fig. 427 - *Velia* sp. (Veliidae)
(X 7).




Fig. 428 - *Rhagovelía* sp., segmento apical do tarso da perna média, visto de face e de perfil (fortemente aumentado).

Velia brasiliensis Herrich-Schaeffer, 1853, uma das nossas mais comuns e conspícuas espécies de Veliídeos, de cor geral negra, com duas máculas amareladas nos hemelítrios, vive nas encostas dos morros, em lugares em que está sempre minando água, sobre terra ou pedras revestidas de limo.

Rhagovelía, cuja espécie mais encontrada no Brasil é a *Rhagovelía collaris* (Burmeister, 1835), é um gênero de Veliídeos bem interessante pelo aspecto singular dos tarsos

das pernas médias, que apresentam o artúculo apical com profunda fenda, na qual se insere um tufo de cerdas pilosas, que, segundo BUENO (1907), auxilia consideravelmente a progressão do inseto em águas correntes (v. fig. 428).

379. Bibliografia.

COKER, R. E., MILLSAPS, V. & RICE, R.

- 1936 - Swimming plume and claws of the broad-shouldered water-strider *Rhagovelia flavicincta* Bueno.
Bull. Brookl. Ent. Soc. 31:81-84, 1 est.

DRAKE, C. J. & HARRIS, H. M.

- 1927 - Notes on the genus *Rhagovelia*, with descriptions of six new species.
Proc. Biol. Soc. Wash. 40:131-138.
- 1931 - Further notes on the genus *Rhagovelia* (Hemiptera Veliidae).
Pan Pacif. Entom. 8:33-35.
- 1933 - New american Veliidae (Hemiptera).
Proc. Biol. Soc. Wash. 46:45-54.
- 1935 - Concening neotropical species of *Rhagovelia* (Veliidae : Hemiptera).
Proc. Biol. Soc. Wash. 48:33-38.

GOULD, G. E.

- 1931 - The *Rhagovelia* of the western hamisphere, with notas on the world distribution (Hemiptera, Veliidae).
Kansas Univ. Sci. Bull. 20:5-61, 4 ests.
- 1933 - Some notes on the genus *Rhagovelia* with descriptions of a new species.
Ann. Ent. Soc. Amer. 26:465-471, est. 1.

HUNGERFORD, H. B.

- 1929 - Some new semi-aquatic Hemiptera from South America with a record of stridulatory devices (Veliidae-Velia).
Jour. Kansas Ent. Soc. 2:50-59, 2 asts.
- 1929 - Two new species of Hemiptera in the collections of the Museum National of Paris.
Bull. Mus. Hist. Nat. 1:198-200.
- 1930 - Three *Velia* from South America.
Jour. Kansas Ent. Soc. 3:23-26, 1 ests.

Mc KINSTY, A. P.

- 1937 - Some new species of *Microvelia* (Veliidae-Hemiptera).
 Jour. Kansas Ent. Soc. 10:30-41.

TORRE-BUENO, J. R. de la

- 1907 - On *Rhagovelia obesa* Hlher.
 Can. Ent. 39:333-341.
 1923 - Taxonomic characters in *Microvelia* WesLw.
 Bull. Brookl. Ent. Soc. 18:138-143.

Família **HEBRIDAE**⁹⁴

(*Neogaeidae*)

380. **Caracteres.** - Insetos semi-aquáticos, geralmente com menos de tres mm. de comprimento, de contorno oval e tegumento opaco, revestido de fina pubescência, que lhes permite prender uma certa quantidade de ar quando mergulham nágua.

Cabeça relativamente grande, porem mais curta que o pronotum; olhos tocando ou quasi tocando o pronotum; ocelos distintos; antenas delgadas, de cinco segmentos (*Hebrus*); em *Merragata*, porem, com quatro segmentos apenas, porque o quarto e o quinto se fundem; rostrum longo, subretilíneo, atingindo ou excedendo as ancas posteriores, de quatro segmentos.

Pronotum trapezoidal com constrição adiante do meio; na base mais largo, que o abdomen na parte mais larga; scutellum em triângulo retângulo, com o vértice arredondado ou bífido.

Hemelitros com o corium espesso, porem com o clavus de textura idêntica à da membrana; esta sem nervuras.

Nas espécies de *Merragata* os insetos adultos são dimórficos, coexistindo formas macrópteras e braquípteras.

⁹⁴ De Hebre, um rio da Trácia.

Pernas curtas, subiguais, com tarsos dímeros; garras curtas, apicais, com pulvícios (arólia) distintos.

Abdomen com o conexivum pouco saliente.

381. **Hábitos.** - Os Hebrideos são Hemípteros higrófilos, semi-aquáticos, que vivem em sociedades mais ou menos numerosas, em plantas flutuantes ou nas das margens dos pântanos, lagos e rios. Alimentam-se de pulgões que vivem nessas plantas e de outros animalculos que aí se encontram.




Fig. 429 - *Hebrus concinnus* Uhler,
1894 (fêmea) (Hebridae) (X 8)
(de Hungerford, 1919, est. 11, fig. 1).

Ha umas 30 espécies em todo o mundo, sendo as da região neotrópica quasi todas pertencentes aos gêneros *Hebrus* Curtis, 1833 e *Merragata* B. White, 1877.

Relativamente aos hábitos de *Merragata*, eis o que escreveu DRAKE (1917):

"Os seus lugares prediletos são os recôncavos dos lagos e pântanos, onde a água é rasa e ha plantas aquáticas em abundância. Raramente os vi no solo úmido da beira d'água. São pedestres aquáticos, capazes de se manter, andando ou correndo, sobre a superfície da água, com o corpo todo coberto de uma pilosidade aveludada, que o protege eficientemente, evitando seja molhado. Podem mover-se, para diante, ou para trás, porem o modo habitual de locomoção é um movimento

seguro para a frente, no qual entram em ação os tres pares de pernas.

Encontrei-os frequentemente sobre *Lemna*, *Nymphaea* e várias outras plantas aquáticas. Não raro se os vê na página inferior de folhas flutuantes ou mesmo entre as raízes de plantas flutuantes. Quando submersos, ficam envolvidos por um film de ar, que, lhes permite permanecer mergulhados durante longo tempo. Num aquário observei-os, parados ou caminhando, durante uma hora ou pouco mais, sobre plantas ou em fragmentos de erva submersos. Ocasionalmente, andando sobre as paredes de vidro do aquário, mergulham nágua e, quando esta era pouco profunda, às vezes atingiam a parede oposta passando sobre o fundo do aquário. Nada se sabe relativamente aos hábitos alimentares e ao ciclo evolutivo."

No Brasil uma das espécies mais conhecidas é o *Hebrus parvulus* Stal, 1858.

Família MESOVELIIDAE

382. **Caracteres, etc.** - Hemípteros semi-aquáticos, de alguns milímetros de comprimento no máximo, de forma elíptica alongada e cor verde ou amarelo-esverdeada, alados ou ápteros na fase adulta, com o tegumento glabro na parte superior e piloso na inferior.

Cabeça relativamente grande, porem mais curta que o pronotum; olhos tocando ou quasi tocando o pronotum; ocelos medíocres, aproximados, situados entre os olhos; antenas delgadas, de quatro segmentos; rostrum longo, subretilíneo, atingindo, ou excedendo as ancas médias; de tres segmentos, sendo o segundo bem mais longo que o primeiro e terceiro reunidos.

Pronotum trapezoidal com fraca constrição adiante do meio, na base não mais largo que o abdomen na parte mais dilatada; scutellum subtriangular, com calosidade basal mais ou menos saliente. Hemelitos mais ou menos desenvolvidos, sendo o corium com nervuras salientes, o clavus membranoso e a membrana sem nervuras. Numa mesma espécie podem coexistir formas adultas macrópteras, braquípteras e ápteras.

Pernas médias e posteriores alongadas, subiguais, as anteriores mais curtas; tarsos de tres articulos, sendo o primeiro muito curto, pouco visivel, garras apicais.

Abdomen com conexivum um tanto saliente.




Fig. 430 - *Mesovelia mulsanti* White, 1879;
fêmea macroptera (Mesoveliidae (X 15).
(De Hungerford, 1919, est. 14, fig. 2).

383. **Hábitos.** - Os Mesoveliídeos, representados por uma dezena de espécies do gênero *Mesovelia* Mulsant & Rey, 1852, vivem em plantas flutuantes e nas das margens dos pântanos, lagos e rios. Quando perseguidos correm rapidamente sobre a água.

Alimentam-se sugando os pequenos insetos que capturam.

A biologia de *Mesovelia mulsanti* White, 1879, espécie comumente observada na Amazônia, foi minuciosamente descrita por HUNGERFORD) (1919).

384. **Bibliografia.**

HORVATH, G.

- 1915 - Monographie des Mesovéliides.
Ann. Mus. Nat. Hung. 13:535-556.
- 1929 - General Catalogue of the Hemiptera; fasc. 2, Mesoveliidae.
Smith College, Northampton (Mass.), VIII + 24 ps.

HUNGERFORD, H. B.

- 1919 - The biology and ecology of aquatic and semiaquatic Hemiptera.
Kansas Univ. Sci. Bull. 11:3-328, 30 ests.

JACZEWSKI, T.

- 1928 - Mesoveliidae from the State of Paraná.
Ann. Zool. Mus. Pol. 7:75-80, I est.
- 1930 - Notes on the american species of the genus Mesovelia Muls. (Heteroptera; Mesoveliidae).
Ann. Zool. Mus. Pol. 9:3-12; 3 ests.

Superfamília **LEPTOPODOIDEA**⁹⁵*(Acanthides; Ocelatae; Riparii*⁹⁶*; Acemthiiformes)*Família **SALDIDAE**⁹⁷*(Acanthiidae)*

385. **Caracteres.** - Hemípteros semi-aquáticos, com alguns milímetros de comprimento, apresentando a seguinte combinação de caracteres: corpo ovalar, cabeça relativamente grande, porém curta e larga; antenas longas, de quatro segmentos; olhos muito salientes; ocelos (dois) situados entre os olhos; rostrum de três segmentos, longo, atingindo

95 Gr. *leptos*, fino; *pous*, pé.

Não ha representantes da família *Leptopodidae* no Brasil.

96 Lat. *riparius*, que habita as margens dos rios.

97 Segundo Amyot de Serville, provavelmente Fabricius formou *Salda* do *salto* (lat., eu salto); é possível também que a palavra corresponda a um nome próprio.

ou excedendo as ancas médias; pronotum trapezoidal de margem anterior muito menor que a basal; scutellum relativamente grande, triangular; hemelitros, quando, bem desenvolvidos, cobrindo inteiramente o abdômen, sem cuneus, com a membrana provida de nervuras longitudinais, paralelas, formando tres a seis células fechadas na parte distal por uma nervura comum; margem costal do corium em curva bem acentuada; tarsos trímeros.




Fig. 431 - *Saldula ventralis* (Stal, 1858)
(Saldidae) (X de Champion, Biol. Centr.
Amer. Heter. 2, est. 20, fig. 9) (Lacerda cop).

386. **Hábitos, etc.** - Os Saldídeos são normalmente encontrados em solo muito húmido, nas proximidades dos cursos d'água, lagos e pântanos, e mesmo perto do mar. Alguns fazem escavações no solo, onde se escondem. Ha também espécies que vivem nas praias, à beira mar, e outras que habitam lugares secos, podendo mesmo ser arbo-

rícolas. Todas, porem, sao predadoras, alimentando-se, principalmente, de pequenos insetos vivos ou mortos.

Os Saldideos são Hemípteros muito ágeis; voam e saltam bem, sendo, por isto, difícil capturá-los.

A família Saldidae, que estabelece o elo de ligação entre os Hemípteros da subordem Gymnocerata com os da subordem Cryptocerata, compreende cerca de 150 espécies descritas, distribuídas em vários gêneros.

No Brasil a espécie talvez mais conhecida é *Saldula ventralis* (Stal, 1858) (fig.131).

Família **AEOPHILIDAE**

387. **Espécie única.** - Esta pequena família, representada na América do Sul pelo gênero *Mendocinia* Jensen-Haarup, 1920, com a espécie única *M. hygrobia* Jensen-Haarup, 1920, encontrada em Mendoza (República Argentina), é colocada pelos autores mais recentes (CHINA e outros) em Leptopodoidea. Alguns, porem, incluem-na em Gerroidea, depois de Veliidae, enquanto que outros a estudam em Cimicoidea.

Subordem **CRYPTOCERATA**

388. **Caracteres.** - Os Hemípteros desta subordem apresentam antenas muito curtas, geralmente escondidas em sulcos ou cavidades (*foveae*) na parte inferior da cabeça (fig. 438). São insetos aquáticos ou semiaquáticos.

Superfamília **OCHTEROIDEA**

(*Litoralia*)

389. **Caracteres.** - Distinguem-se dos demais Criptoceratos por possuírem quasi sempre ocelos e por serem insetos semiaquáticos. Daí o nome - *Telmatobia*⁹⁸ - dado por alguns autores a este grupo de Hemípteros.

⁹⁸ Gr. *telma*, pantano; *bios*, vida.

São distribuídos em duas famílias, Ochteridae e Nerthidae que se distinguem pelos seguintes caracteres:

- 1 Antenas expostas; pernas anteriores e médias semelhantes; olhos não muito salientes Ochteridae
 1' Antenas escondidas; pernas anteriores distintamente raptórias; olhos geralmente protuberantes
 Northridae

Família OCHTERIDAE⁹⁹

(*Pelagonidae*)¹⁰⁰

390. **Caracteres, etc.** - Insetos semiaquáticos, com alguns milímetros de comprimento, de cor escura, geralmente revestidos de uma pubescência preta, que dá ao tegumento aspecto aveludado. Apresentam manchas amareladas nas margens do pronoto e dos hemelítrios.

Pela aparência e hábitos, estes Hemípteros fazem lembrar os Saldideos e os insetos da família seguinte (Nerthridae). Daqueles, porém, se distinguem pelas antenas muito curtas, e dos Nerthideos pelo rostrum, nestes curto e robusto, nos Ochterideos longo, como nos Saldideos.

Cabeça transversal, curta; olhos proeminentes, dois ocelos; antenas de quatro segmentos, mais curtas que a cabeça, porém, em repouso, não escondidas, sob ela, em sulcos ou cavidades; rostrum longo atingindo ou mesmo excedendo os quadris posteriores, com o segmento basal grosso e curto e os demais finos.

Pronotum subtrapezoidal; scutellum triangular, aproximadamente tão longo quanto o pronotum. Hemelítrios normais, amplos, cobrindo todo o abdomen; membrana com duas séries de células na parte basal. Pernas subiguais, de tipo cursorial; fêmures anteriores normais ou pouco mais dilatados que os outros.

⁹⁹ Gr. (?)ochteros, clivoso, montanhoso

¹⁰⁰ Gr. pelos, negro (lana); gone, raça (nascido).

391. **Hábitos, etc.** - Os Ochterideos vivem na vegetação rasteira da margem dos pequenos lagos, pântanos e riachos. Muito ágeis, correm e voam facilmente. São predadores; sugam a hemolinfa das larvas de dípteros que vivem na lama ou no solo húmido.

Ha pouco mais de 12 espécies descritas, todas do gênero *Ochterus* Latreille, 1807 (= *Pelogonus* Latr., 1809).

Família NERTHRIDAE

(*Gaigulidae*¹⁰¹; *Mononychidae*¹⁰²; *Gelastocoridae*)¹⁰³

392. **Caracteres.** - Hemípteros semiaquáticos, com alguns milímetros de comprimento, de corpo achatado, áspero e olhos, em geral, muito protuberantes (sésseis, não proeminentes em Nerthrinae); aspecto geral de pequeninos Batráquios, mormente quando examinados de frente (fig. 432).




Fig. 432 - *Mononyx raptorius* (Fabr., 1803), visto de face (Nerthridae) (cerca de X 10) (Lacerda del.).

Não é muito, fácil encontrá-los, pois a cor que apresentam fá-los quasi desaparecer no meio em que vivem.

Ocelos geralmente presentes (ausentes ou muito pequenos em *Nertha* Say, 1832); antenas de tres ou quatro segmentos, com o terceiro muito curto, mais curtas que a cabeça e escondidas sob os olhos, como nos demais Hemí-

101 Lat. *galgulus*, nome de uma ave.

102 Gr. *monos*, única; *onyx*, unha.

103 Gr. *gelastos*, que faz rir; *coris*, percevejo.

pteros desta subordem; rostrum curto, robusto, de quatro segmentos. Pronotum bem mais largo que longo. Hemelitos com clavus, corium e membrana (Gelastocorinae), ou sem membrana e totalmente coriáceos (Nerthrinae); em *Nertha* soldados na linha mediana.

Pernas anteriores distintamente de tipo raptorial, com fêmures fortemente dilatados; tarsos geralmente apresentando a seguinte fórmula: 1-1-3; nos anteriores ha duas garras (Gelastocorinae) ou apenas uma (Nerthrinae).



Fig. 433 - *Mononyx* sp.,
visto de cima (X 3).



Fig. 434 - *Gelastocoris* sp.
(Nerthridae) (X 4).

No Brasil encontram-se frequentemente: *Gelastocoris variegatus* (Guérin, 1844), *Gelaslocoris quadrimaculatus* (Guérin, 1844) (= *G. nebulosus* (Guérin, 1833)), *Gelastocoris vicinus* (Champion, 1901), *Mononyx nepaeformis* (Fabr., 1775) e *M. raptorius* (Fabricius, 1803) (fig. 432).

Na fig. 434 vê-se uma espécie de *Gelastocoris* que parece ser a que CHAMPION designou como *G. vicinus* Montandon, in litt.

393. **Habitos.** - Os Nertrideos vivem gregariamente nas margens dos riachos e dos pântanos. Correm e saltam com facilidade.

As espécies de *Mononyx* Laporte, 1832, vivem enteradas na lama, daí se apresentarem com uma crosta de terra difícil de se retirar. São também predadoras.

394. **Espécies mais interessantes.** - Ha descritas cerca de 50 espécies de Nerthridae distribuídas nas duas subfamílias - **Nerthrinae** (*Mononychinae*) e **Gelastocorinae**.

395. **Bibliografia.**

MELIN, D.

- 1930 - Hemiptera from South and Central America. I (Revision of the genus *Gelastocoris* and the American species of *Mononyx*).
Zool. Bidr. 12:151-198, 121 figs.

MARTIN, C. H.

- 1928 - An exploratory survey of characters of specific value in the genus *Gelastocoris* Kirkaldy and some new species.
Univ. Kansas Sci. Bull. 18:351-369, ests. 58-59.

HUNGERFORD, H. B.

- 1922 - The life history of the toad bug, *Gelastocoris oculatns* Fabr. (*Gelastocoridae*).
Kans. Univ. Sci. Bull. 14:145-171, ests. 13-14.

Superfamília **NEPOIDEA**

(*Nepaeformes*)

396. **Caracteres.** - Distinguem-se dos demais Criptoce-ratos, sem ocelos, por apresentarem as pernas anteriores distintamente raptórias e os tarsos posteriores providos de garras normais.

Constituem esta superfamília as famílias **Aphelochiridae**, **Naucoridae**, **Belostomatidae** e **Nepidae**.

A família Aphelochiridae, por alguns autores ainda considerada como subfamília de Naucoridae, compreende algumas espécies das regiões paleártica, australiana e africana.

Tais insetos são bastante curiosos, pois neles as pernas anteriores não apresentam fêmures dilatados e os tarsos ainda possuem dois artículos e duas garras, e, provavelmente, a respiração é cutânea.

As outras famílias distinguem-se principalmente pelos caracteres indicados na chave seguinte:

- | | |
|-------|---|
| 1 | Membrana pouco diferenciada do resto do hemelito; embolium quasi sempre distinto; abdomen sem apêndices caudais (respiratórios) Naucoridae |
| 1' | Membrana bem diferenciada do resto do hemelito e com nervuras reticuladas; sem embolium; abdomen com apêndices caudais 2 |
| 2(1') | Apêndices caudais do abdomen curtos e chatos, retráteis; pernas (excetuando às vezes as anteriores) da 2 artículos tarsais; posteriores mais ou menos adaptadas à natação Belostomatidae |
| 2' | Apêndices caudais do abdomen longos e finos, não retráteis; pernas de 1 artículo tarsal; posteriores, não adaptadas à natação, ambulatórias Nepidae |

Família NAUCORIDAE¹⁰⁴

397. **Caracteres.** - Hemípteros aquáticos, pequenos ou de porte médio, de corpo elítico ou oval, geralmente deprimido e liso, apresentando pernas anteriores raptórias, com fêmures fortemente dilatados como em Nerthridae e em Belostomatidae. Os Nertrideos, porem, apresentam olhos protuberantes (nos Naucorideos a margem externa do olho continua-se com a margem da cabeça) e ocelos, quasi sempre bem visíveis e os Belostomatideos possuem um par de apêndices caudais.

¹⁰⁴ Gr. *naus*, navio; *coris*, percevejo.

Antenas de quatro segmentos; rostrum de tres segmentos. Os hemelitos apresentam um embolium distinto e membrana sem nervuras.

Pernas anteriores raptórias, com femur consideravelmente dilatado e apresentando um sulco no bordo inferior, no qual se encaixa a tibia.

Pernas posteriores não adaptadas à natação. Os tarsos apresentam geralmente a seguinte fórmula: 1-2-2; os anteriores sem garras.



Fig. 435 - *Pelocoris bipustulatus*
(Herrich-Schaeffer, 1853) (Naucoridae) (X 4).

398. **Hábitos.** - Vivem os Naucorideos em águas estagnadas ou correntes, porem de curso lento.

Nadam bem, batendo simultaneamente as pernas posteriores.

São predadores e muito vorazes; atacam pequenos animais aquáticos, inclusive outros Hemípteros.

Embora vivam de preferência no fundo d'água, ou escondidos no meio das plantas aquáticas, vêm, de vez em quando, à superfície para respirar o ar livre, levando, quando

descem, uma certa provisão entre as asas e a face superior do abdome.

A noite podem sair água e voar, voltando, porem, no fim de algum tempo, ao mesmo habitáculo, ou mergulhando em outro pantano.

399. **Espécies mais interessantes.** - Ha cerca de 150 espécies descritas, em grande parte da região neotrópica.




Fig. 436- *Cryptocricus barozii* (Signoret, 1850) (Naucoridae).
(X 7) (Lacerda del.).

As principais espécies brasileiras pertencem aos gêneros *Ambrysus* Stal, 1862 (subfam. Cryptocricinae), *Pelocoris* Stal, 1876 (subfam. Naucorinae) e *Limnocoris* Stal, 1860 (subfam. Limnocorinae). Na fig. 436 acha-se representado um *Cryptocricus* (*C. barozii* (Signoret, 1850)), bem característico, pelo aspecto dos hemelítrios, que ficam reduzidos ao corium posteriormente truncado.

400. **Bibliografia.**

CARLO, J. A. de

- 1935 - Hemipteros acúaticos y semiacúaticos.
 I. Descripción de un nuevo género y una nueva especie de la familia Naucoridae, subfamilia Criplocricinae.
 II. ESpecies no citadas para la Argentina.
 Rev. Arg. Ent. 1:1-4, 3 figs.

KRAMER, H.

- 1935 - Beitrage zur Biologie von Naucoris mit besonderer Berücksichtigung der Atmung.
 Arch. Hydrobiol. 8:523-554, 10, figs.

MONTANDON, A. L.

- 1897 - Hemiptera Cryptocerata. Fam. Naucoridae, subfam. Cryptocricinae.
 Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 47:6-23.
 1898 - Hemíptera Cryptocerata. Fam. Naucoridae, subfam. Limnocorinae.
 Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 48:414-425.

MONTE, O.

- 1937 - Percevejos Naucorídeos.
 Chac. Quint. 55:704-705, 6 figs.

Família **BELOSTOMATIDAE**¹⁰⁵*(Belostomidae)*

401. **Caracteres.** - Hemípteros aquáticos, de tamanho médio ou grande e aspecto característico, semelhante ao das baratas, plenamente justificando a designação vulgar- "baratas d'água".

Quasi todos apresentam cor castanha clara ou escura e o tylus saliente entre os olhos.

¹⁰⁵ Gr. *belos*, dardo; *stoma*, boca.

Embora tenham muitas afinidades com os Hemípteros da família precedente, deles entretanto, se distinguem, por apresentarem pernas posteriores distintamente achatadas e ciliadas, bem adaptadas, portanto, para a natação e um par




Fig. 437 - *Lethocerus grandis* (L., 1767) (Belostomatidae).

de apêndices curtos achatados e retráteis, na extremidade do abdomen, em relação com dois sulcos aeríferos (fig. 439).

Antenas de quatro segmentos com o, segundo e o terceiro dilatados ou prolongados no lado interno; rostrum curto, robusto (fig. 438).

Pernas anteriores raptórias, médias e posteriores nata-tórias; tarsos dímeros. Membrana dos hemelitos com várias nervuras longitudinais.




Fig. 438 - Cabeça de *Lethocerus*, vista pela face inferior, para se ver o aspéto das antenas e como se alojam nos sulcos antenais (X 6).

É nesta família que se encontram os maiores Hemípteros conhecidos (espécies de *Lethocerus* Mayr, 1854). Assim o comprimento de *Lethocerus maximus* De Carlo, 1938, pode exceder de 100 mm. *Lethocerus grandis* (Linne, 1767) tem o comprimento um pouco menor (fig. 437).

402. **Hábitos, etc.** - Os Belostomatídeos são grandes predadores. Atacam larvas de outros insetos, girinos e peque-

nos peixes. DE CARLO (1938) observou uma fêmea de *Lethocerus annulipes* (Herrich-Schaeffer, 1844) que atacava rãs (*Leptodactylus ocellatus* L.),

"Las ranas quedavan sin vida en menos de tres horas, despues de luchar en forma tif anica para librarse de su enemigo.

Según mis observaciones, parece ser que las ranas mueren por la constante pérdida de sangre."

Apanhando-se um Belostomatídeo, deve-se evitar que, com as pernas anteriores, prenda um dedo, porque as picadas destes insetos são sempre extremamente dolorosas.




Fig. 439 - Apice do abdômen de *Lethocerus* sp. (fortemente aumentado).




Fig. 440 - *Belostoma boscii* (Lepelletier & Serville, 1825) (Belostomatidae); macho com ovos colocados aos hemelítrios (X 1,7) (Lacerda del.).

Como os Naucorídeos, emigram à noite de um para o outro pantano e é nessas excursões noturnas que esvoaçam em torno das lâmpadas elétricas, às vezes em grande número. Isto geralmente se observa em localidades, até então fracamente iluminadas, que passam a ter luz elétrica, principalmente de lâmpadas de arco voltáico.

As espécies dos gêneros *Abedus* e *Belostoma* (*Zaita*) são interessantes, porque as fêmeas colam os ovos (60 a 180) nas costas dos machos. Estes, ao serem agarrados pela fêmea, procuram desvencilhar-se do amplexo, talvez por lhes ser incômoda a carga que terão de suportar durante longo tempo.

Ha cerca de 100 espécies de Belostomatídeos, em sua maioria habitantes da América do Sul. As espécies americanas acham-se bem estudadas nos trabalhos de DE CARLO.

403. Bibliografia.

CARLO, J. A. de

- 1930 - Familia Belostomatidae. Generos y especies para la Argentina.
Rev. Soc. Ent. Arg. 3:101-124, 3 ests. 1 fig., no texto.
- 1931 - Hemipteros acuaticos e semiacuaticos.
Rev. Arg. Ent. 1:1-4, 3 figs.
- 1933 - Nuevas especies de Belostomídeos (Hemiptera).
Rev. Soc. Ent. Arg. 5:121-126, 1 est.
- 1933 - Família Belostomidae.
Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 9:93-98, 2 ests.
- 1934 - Descripción de especies nuevas de Belostomídeos (Hemiptera).
Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 10:109-111, 2 figs.
- 1935 - Familia Belostomidae. Descripción de una nueva especie y algunos sinonimios.
Rev. Soc. Ent. Arg. 7:203-205, 1 est.
- 1938 - Los Belostomidos americanos (Hemiptera).
Anal. Mus. Arg. Cien. Nat. "Bornardino Rivadavia", 39:189-260, 8 ests. (79 figs.).
- 1938 - I. Dos nuevas especies del genero *Abedus* Stal.
II. Nuevas consideraciones sobre *Belostoma costalimai* de Carlo y *Lethocerus brincatus* Cumings (Hem. Belostomatidae).
Rev. Soc. Ent. Arg. 10:41-45, 2 ests.
- 1939 - Breves dados sobre los Belostomidae (Hemípteros.) de la Argentina.
9ª Reun. Soc. Arg. Pat. Reg. 3:1471-1475, 2 ests.

- 1939 - I. Metamorfosis de *Belostoma elegans* Mayr.
 II. *Belostoma ellipticum* Latreille = *Belostoma im-*
pavidum Torre Bueno (Hemiptera-Belostomidae).
 Rev. Soc. Ent. Argent. 10:231-234, 1 est.

CUMMINGS, C.

- 1931 - The giant waterbugs (Belostomatidae-Hemíptera).
 Univ. Kans. Sci. Bull. 2] (1933):197-219, 2 ests.

DU FOUR, L.

- 1863 - Essai monographique sur les Bélóstomatidés.
 Ann. Soc. Ent. Fr. :373-100.

HUNGERFORD, H. B.

- 1919 - Vid. trabalho já citado, in,
 Kansas Univ. Sci. Bul. 11:142-151, est. 17.

HUSSEY, P. B.

- 1926 - Studies on the pleuropodia of *Bolostoma flumineum*
 Say and *Ranatra fusca* Palisot de Beauvois, with
 a discussion of these organs in other insects.
 Ent. Amer. 7 (n. s.):1-80, 7 ests.

MAYR, G.

- 1871 - Die Belostomiden monographich bearbeitet.
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 399-440.

MONTANDON, A. L.

- 1896 - Hemipteres. Heteróptères exotiques, notes et des-
 criptions. II. Fam. Belostomidae.
 Ann. Soc. Ent. Belg. :508-520.

RANKIN, K. L.

- 1935 - Life history of *Lethocerus americanus* (Leidy) (He-
 míptera-Belostomatidae).
 Univ. Kansas Sci. Bull. 22:479-491, 2 ests.

TORRE-BUENO, J. L. de la

- 1906 - Life histories of North american water-bugs. II. *Be-*
lostoma fluminea Say.
 Cana d. Ent. 38:189-197.

Família NEPIDAE¹⁰⁶

404. **Caracteres, etc.** - Hemípteros aquáticos, de porte médio (podendo atingir 50 mm. de comprimento), corpo alongado, alargado ou linear, apresentando, na extremidade do abdome, dois longos filamentos caudais, não retráteis, que, reunidos, formam um tubo ou sifão respiratório.



Fig. 441- *Ranatra* sp. (Nepidae) (X 1,3).

Antenas de tres segmentos; pernas anteriores raptórias, de aspecto característico; médias e posteriores não adapta-

¹⁰⁶ Gr. *nepa*, escorpião.

das à natação. Tarsos de um artículo, os do par anterior sem garras.

405. **Hábitos.** - Vivem estes insetos no meio da vegetação submersa ou na lama do fundo dos pantanos, com a qual se confundem.

Os ovos de *Ranatra* são inseridos, um a um, no tecido de plantas flutuantes, vivas ou mortas, ficando expostos dois longos prolongamentos respiratórios, apensos ao polo cefálico.

Os ovos de *Curicta* apresentam também tais filamentos, porém são curtos, em maior número, formando uma coroa no polo do ovo.




Fig. 442 - Perna de *Curicta* sp. (Nepidae).

Apesar dos Nepídeos nadarem mal e andarem no fundo lentamente, são bastante vorazes e, quase sempre, estão capturando outros pequenos insetos aquáticos. As vítimas prediletas são larvas de Dípteros, especialmente mosquitos da família Culicidae.

À noite, como os Naucorídeos e Belostomatídeos, podem emigrar das coleções d'água em que se acham para outras.

406. **Espécies mais interessantes.** - A família Nepidae compreende cerca de 130 espécies descritas.

Na região neotrópica ha apenas dois gêneros com algumas espécies: *Curicta* Stal, 1860 e *Ranatra* Fabr., 1790.

As espécies do primeiro, têm o corpo ovalar, alongado, um tanto achatado e as ancas das pernas anteriores são muito mais curtas que nas espécies de *Ranatra*. Estas apresentam corpo estreito, linear, e os quadris e fêmures das pernas anteriores muito alongados (v. figs. 441 e 442).

Encontra-se frequentemente no Brasil a *Ranatra annulipes* Stal, 1861.

407. **Bibliografia.**

BAUNACKE. W.

- 1912 - Statische Sinesorgane bei den Nepiden.
Zool. Jahrb. Anat. 34:179-346, 12 figs., ests. 10-13.

HAMILTON. M. A.

- 1931 - The morphology of the water scorpion *Nepa cinerea*.
Proc. Zool.Soc. London, 1931: 1067-1136.

HUNGERFORD, H. B.

- 1922 - The Nepidae, of North America, north of Mexico.
Kansas Univ. Sci. Bull. 14(18):425-469.

LEFEBVRE, M.

- 1903 - Observation sur l'anatomie microscopique de l'appareil salivairé du *Nepa cinerea*.
Ann. Soc. Sci. 27:192-195.

LOCY, N. A.

- 1881 -Anatomy and physiology of the family Nepidae.
Amer. Natur. 18:250-255; 353-367, ests. 9-12.

MAULIK, S.

- 1916 - The respiratory system of *Nepa cinerea* Linn.
Jour. Zool. Res. 1:41-58.

MARSHALL, W. E. & SEVERIN, H.

- 1904 - Some points in the anatomy of *Ranatra fusca* B. Beauv.
Trans. Wisc. Acad. Sci: 14:487, ests 34-46

NEISWANDER, C. R.

- 1926 - On the anatomy of the head and thorax in *Ranatra* (Heteroptera) .
Trans. Amer. Ent. Soc. 51:311-320, 1 est.

PETTET, R. H.

- 1902 - The egg of the water-scorpion (*Ranatra fusca*)
Canad. Ent. 34:213, 9 figs.

TORRE-BUENO, J. R. de la

- 1906 - Life histories of North American water-bugs.
I. *Ranatra quadrinotata* Stal.
Canad. Ent 38:242-252.

Superfamília **NOTONECTOIDEA**

408. **Caracteres.** - Criptoceratos desprovidos de ocelos, com pernas anteriores e médias normais; as posteriores, adaptadas para a natação, têm as tíbias e os tarsos fortemente ciliados; garras tarsais indistintas, setiformes.

Adotando o critério de ESAKI e CHINA (1928), não incluem nesta superfamília as famílias Pleidae e Helotrephidae, as quais, segundo aqueles autores, constituem uma superfamília à parte - **Pleioideae**.

Fica, assim, No tonectoidea reduzida exclusivamente à família Notonectidae.

Família **NOTONECTIDAE**¹⁰⁷

409. **Caracteres.** - Hemipteros aquáticos, pequenos ou de porte médio, de corpo mais ou menos alongado, relativamente estreito e fortemente convexo na parte dorsal. São os únicos Hemípteros que, exclusivamente com as pernas posteriores, nadam de costas.




Fig. 443 - *Anisops* sp. (Notonectidae) (cerca de X 6).

Cabeça, conquanto movel, bem destacada do pronoto; antenas de quatro segmentos; olhos grandes, reniformes; rostrum de tres a quatro segmentos. Pronoto mais largo ao

¹⁰⁷ Gr. *notos*, dorso; *nectos*, nadador

nível dos ângulos humerais. Pernas posteriores natatórias, providas de longos pelos; tarsos de dois artículos; os anteriores, às vezes, com um artícolo.

Face inferior do abdome apresentando uma quilha ou carena mediana e, de cada lado, uma franja de longos pelos hidrófugos, dirigidos para a linha mediana e inseridos numa prega marginal. Esta disposição permite, quando o inseto se acha nágua, a formação de duas câmaras aéreas, uma de cada lado da face ventral, em relação com as aberturas estigmáticas.

410. **Hábitos etc.** - Os Notonectideos são facilmente reconhecidos quando nágua, pois, como disse, nadam quasi sempre de costas, isto é, com a face ventral voltada para cima.

Vivem principalmente em águas tranquilas de pantanos e até mesmo de poços, frequentando, de preferência, a camada mais próxima à superfície. Raramente são vistos em riachos de curso um pouco rápido.

Sempre muito ativos, nadam rapidamente à custa de movimentos simultâneos, como de remos, das pernas posteriores. Estas, quando o inseto repousa, ficam estendidas e perpendicularmente dispostas em relação ao eixo longitudinal do corpo.

As anteriores e médias servem para capturar as presas de que se nutrem estes insetos, representadas por um grande número de espécies aquáticas.

Ha Notonectideos que põem os ovos à superfície dos galhos ou folhas de plantas submersas; outros, porem, os introduzem, mediante um ovipositor, nos tecidos das plantas aquáticas.

Sendo, em geral, insetos muito leves, para repousar precisam sempre prender-se a um suporte qualquer.

Como outros Criptoceratos, podem tambem sair do meio em que se acham e, voando, atingir outra coleção d'água.

Dizem que a picada destes insetos doe tanto como a ferroadada de uma abelha. Daí e nome "Wasserbienen" pelo qual são conhecidos na Alemanha.

Ha cerca de 120 espécies descritas desta família. No Brasil as espécies mais frequentemente encontradas pertencem aos gêneros *Notonecta* Linne, 1767 e *Anisops* Spinola, 1837.

411. Bibliografia.

DÉBAISIEUX, P.

- 1936 - Organes pulsatiles des tîbias des Notonectes.
Ann. Soc. Sci. Bruxellas (B) 56:77-86, 1 fig.

ESSENBERG, C.

- 1915 - The habits anal natural history of the back-swimmers Notonectidae.
Jouv. Anim. Behav. 5:381-390.

HOPPE, J.

- 1912 - Die Atmung von *Notonecta glauca*.
Zool. Jahrb. Abt. Allg. Zool. 31.

HUNGERFORD, H. B.

- 1933 - The genus *Notonecta* of the world (Notonectidae, Hemíptera).
Univ. Kansas Sci. Bull. 21:1-195, 8 figs., 17 ests.
1930 - A report on the nomenclature of some neotropical *Notonecta* with the description of some new species.
Bull. Brookl. Ent., Soc. 25:138-143, 2 figs.

JACZEWSKI, T.

- 1928 - Notonectidae from the State of Parana.
Ann. Mus. Zool. Polon. 7:121-136, 5 ests.

KIRKALDY, G. W.

- 1897 - Revision of the Notonectidae. Part. I.
Trans. Ent. Soc. London, pp. 393-426.
1904 - Ueber Notonectiden.
Wen. Ent. Zeit. vols. 23 a 27.

Superfamília **PLEOIDEA**¹⁰⁸

412. **Caracteres.** - Hemípteros aquáticos, de alguns milímetros de comprimento, apresentando os seguintes caracteres: corpo fortemente convexo, cabeça e pronoto mais ou menos fundidos, rostrum de quatro segmentos, sendo os dois basais muito curtos; hemelítrios muito espessos, cobrindo todo o abdomen; pernas ambulatórias, o par posterior um tanto modificado para a natação, apresentando duas fileiras de cerdas nas tíbias e tarsos, estes, em todas as pernas, com duas garras.




Fig. 444 - *Plea* sp., fêmea adulta com o ovipositor saliente (Pleidae) (De Hungerrord, 1919, est. 25,2).

Constituem esta pequena superfamília as duas famílias **Pleidae** e **Helotrephidae**, esta com algumas espécies brasileiras, aquela com vários representantes do gênero, *Plea* Leach, 1818, de vasta distribuição geográfica.

As espécies de *Plea* das regiões neártica e neotrópica pertencem ao subgênero *Neoplea* Esaki & China, 1928.

413. **Bibliografia.**

ESAKI, T. & CHINA, W. E.

1928 - A monograph of the Helotrophidae, subfamily Helotrophinae (Hem. Heteroptera).
Eos, 4:129-172, 14 figs.

¹⁰⁸ Gr. *pleo*, navegador.

WEFELSCHEID. H.

- 1912 - Ueber die Biologie und Anatomie von *Plea minutissima* Leach.
Zool. Jahrb. Syst. 32:387-474, 2 ests.

CHINA, W. E.

- 1936 - The first genus and species of Helotrephidae, (Hemíptera) from the New World.
Ann. Mag. Nat. Hist. (10)17:527-539.
- 1940 - New south american Helotrephidae (Hemiptera-Heteroptera).
Ann. Mag. Nat. Hist. (11)5:106-126, figs,

Superfamília **CORIXOIDEA**Família **CORIXIDAE**¹⁰⁹

414. **Caracteres, etc.-** Hemípteros aquáticos, com alguns milímetros de comprimento, geralmente de cor amarelada, com riscas pardo-escuras transversais no pronotum e pintas da mesma cor nos hemelítrios. Muito parecidos com os Notonectídeos, deles, porém, se distinguindo, principalmente, por terem a cabeça tão larga ou pouco mais larga que prothorax e por nadarem com dorso voltado para cima.

Corpo achatado na parte dorsal. Antenas de quatro segmentos; olhos grandes, sem ocelos; rostrum excessivamente curto, aparentemente não separado da face.

Devido à conformação peculiar do rostrum, BÖRNER (1904) considerou estes insetos como constituindo uma subordem à parte **Sandaliorrhyncha**. Tarsos das pernas anteriores (*palae*) de configuração peculiar (*palaeformes*), isto é, em forma de colher, adaptados para a apreensão do alimento.

Pernas médias longas e finas, funcionando como órgãos fixadores; posteriores natatórias, isto é, achatadas e franjadas de longos pelos.

¹⁰⁹ Gr. *coris*, percevejo.

Dentre os caracteres que servem para distinguir os dois sexos nestes insetos, ha a assinalar, como mais interessantes, a estrutura asimétrica dos tres últimos segmentos abdominais nos machos e a presença, no sexto urotérgito, de um órgão de função duvidosa, chamado *strigil*, provido de dentes quitinosos. Os tarsos anteriores são também providos, na face anterior, de uma ou duas fileiras de dentes. Do atrito destes com uma área estridulatória no femur da perna do lado, oposto, resulta a produção de um ruido. Nas fêmeas não ha tais órgãos estridulatórios e os segmentos abdominais são simétricos.




Fig. 445- *Sigara* sp. (Corixidae) (X 6).

415. **Hábitos.** - Os Corixídeos são encontrados mais frequentemente em águas estagnadas ou em riachos de curso lento.

Embora nadem bem, são geralmente vistos no fundo dessas águas, em lugares em que ha vegetação submersa e onde penetram livremente os raios solares, ou agarrados às plantas ou a quaisquer suportes submersos. À noite, podem sair d'água atraídos pela luz das lâmpadas de iluminação.

Os ovos são colados em massa nos objetos mergulhados.

HUNGERFORD (1919) demonstrou que os Corixídeos se alimentam da substância flocosa que se encontra em abun-

dância no fundo dos pântanos. Embora tal matéria seja, em grande parte, de origem vegetal, nela se encontram muitos protozoários e outros animáculos, que são ingeridos. Verificou também o mesmo autor que estes insetos se alimentam da clorofila de *Spirogyra*.

Os Corixideos, de vez em quando, vêm à tona d'água para respirar o ar livre e acarretam sempre uma tenue camada de ar, que envolve quasi completamente.




Fig. 446 - Cabeça (vista frontal) e pernas anteriores do Corixideo da fig. 445, vendo-se, na perna, esquerda, o aspecto característico da *palea*.

Provavelmente realiza-se também nestes insetos uma respiração cutânea suplementar, que lhes permite a permanência no meio aquático durante muito tempo, sem que necessitem vir à tona d'água para respirar o ar livre.

416. **Classificação.** Já foram descritas mais de 280 espécies desta família, distribuídas nas subfamílias **Micronectinae** e **Corixinae**.

Da primeira só ha, como espécies brasileiras, o gênero *Tenagobia* Bergroth, 1899 e da segunda o gênero *Sigara* Fabr., 1775, aliás o que abrange o maior número de espécies de Corixidae.

417. **Bibliografia.**

BOERNER, C.

- 1904 - Zur Systematik der Hexapoden.
Zool. Anz. 27:511-533.

BRINDLEY, M. D. H.

- 1929 - On the repugnatorial glands of Corixa.
Trans. Ent. Soc. London, 77:7-13, 5 figs. 1 est.

FIEBER, F. X.

- 1851 - Species generis Corisa.
Praga e, 47 ps., 2 ests,

HUNGERFORD, H. B.

- 1919 - Food of Corixids in "The Biology and ecology of aquatic and semiaquatic Hemiptera".
Kansas Univ. Sci. Bull. 11:234-249.
1928 - Notes on the genus *Heterocorixa* White with the description of some new species (Hemiptera-Corixidae).
Bull. Brookl. Ent. Soc. 23 :99-103.
1928 - Some South American Corixidae.
Bull. Brookl. Ent. Soc. 23:174-180, 2 ests.

JACZEWSKI, T.

- 1979 - Corixidae from the State of Parana.
Ann. Zool. Mus. Pol. Hist..Nat. 6:39-59, 36 figs.,
est. 2.
1927 - Argentinian Corixidae collected by Mr. A. C. Jensen-Haarup.
Ann. Zool. Mus. Pol. Hist.. Nat. 6:251-261, estampas 7-9.
1928 - Bemerkungen über die geographische Verbreitung der Corixiden.
Ann.Mus. Zool. Pol. 7:45-67, ests. 2 e 3.

KIRKALDY, G. W.

- 1901 - The stridulatory organs of water-bugs (Rhynchota), specially of Corixidae.
Jour. Quekett. Micr. Club (2)8:33-46, ests. 3-4.

LUNDBLAD, O.

- 1928 - Monographie der bis jetzt bekannten Arten der neotropische Corixidergattung *Heterocorixa* B. White.
Ent. Tidskr. 19:66-83, 15 figs.

MITIS, H.

- 1935 - Zur Biologie der Corixiden Stridulation.
Zeits. Morph. Oekol. Tiere, 30:479-195, 12 figs.

POISSON, R.

- 1935 - Les Hémipteres aquatiques Sandaliorrhyncha Börn. de la faune française.
Arch. Zool. Exper. Génév. 77:455-563.

ÍNDICE

- Abacateiro, 87
ABBOT, 37
Aboboreira, 85
ABRAHAM, 254, 290
A canthaspidae, 207
Acanthia
 hemiptera, 247
 lectularia, 173, 178, 247
 rotundata, 247
Acanthides, 308
Acanthiidae, 25 244, 308
Acanthiiformes, 308
Acanthocephala
 latipes, 83, 84
Acanthocephalini, 82, 83
Acanthocerus
 clavipes, 80, 82
Acanthosomatinae, 44
Acaulona
 brasiliانا, 121
Actinote, 49
 pellenea, 49
Adricomius, 186
Aepophilidae, 25, 310
Agnosoma
 flavolineatum, 70
Alabama
 argillacea, 50
Alcaeorrhynchus
 grandis, 48, 50
Algodão cravo, 118
Algodão do mato, 118
Algodoeiro, 85, 87, 94, 105, 107, 108,
 114, 115, 136
Algodoeiro do campo, 118
ALLEN, 255
Alydidae, 24, 79, 89
Amaranthus
 spinosus, 120
Ambrysus, 317
Amendoeira, 47
Amitermes
 foreli, 130
AMYOT, 36
ANDRÉ, 108, 111
Aneuridae, 129
Aneurus, 128, 129
 subdipterus, 129
Angelica, 87
Anisops, 327, 329
Anisoscelini, 82, 83
Anthocoridae, 13, 25 243, 244, 260
Anthocorinae, 261
Apateticus
 (*Eupodisus*) *mellipes*, 49
Aphelochiridae, 27, 314
Aphelonotus
 simplus, 235
Apiomeridae, 217
Apiomerinae, 161, 163, 217
Apiomerus, 177, 217
 flavipennis, 73, 217
 lanipes, 217, 221, 223
 picipes, 217
Apis
 mellifica, 217
Araçazeiro, 85
Arachnocoris
 albcannulatus, 236, 237
Aradidae, 22, 127, 128
Aradoidea, 25, 125
Aradomorpha, 26, 157, 169, 210
 Chinai, 210
 crassipes, 210
Aradus, 127, 128
 (*Aradus*) *falleni*, 129
Arilus, 155, 159, 218
 carinatus, 218, 403
 serratus, 218
Arocera
 (*Euopta*) *spectabilis*, 61
Arroz, 56, 58, 63, 91, 105
Arvelius
 albopunctatus, 55, 61
Asclepias
 curassavica, 108

- Asopinae, 44, 48
 Athaumastus
 haematicus, 80, 82
 ATKINSON, 290
 Atta, 91
 Augocoris
 illustris, 68
 Autcmeris
 coresus, 50
 AUTUORI, 219
 AWATI, 28, 290
 BACOT, 251
 Bactrodes, 164
 biannulatus, 164
 Bactrodinae, 161, 162, 164
 BAKER, 37
 Baratas, 180, 208
 Barbeiros, 167, 178
 BARBER, 37, 74, 102, 111, 166, 220
 254
 BARBIELLINI, 67
 BARRADAS, 87
 BARRETO, 220, 231
 Barriguda, 118
 BASSO, 189, 227
 Batata doce, 86
 Batatinha, 53, 122
 BAUNACKE, 16, 28, 326
 BEIER, 36
 Belminus, 186, 187, 190, 191
 rugulosus, 187, 190, 191
 Belostoma
 boscii, 321
 Belostomatidae, 27, 314, 315, 318
Belostomidae, 318
 BEQUAERT, 28, 220
 BERG, 36, 37
 BERGROTH, 74, 100, 101, 109, 111,
 130, 135, 138, 220, 290, 292
 BERLESE, 245
 Bercaldus, 60
Berytidae, 23, 97, 98
 Beskia
 cornuta, 73
 Bexiga do cacá, 273
 Bicho de parede, 178
 Bidens
 pilosa, 289
 BLANCHARD, 53, 138
 BLATCHLEY, 37, 142, 145, 236, 247
 254
 Blissinae, 103
 Blissus
 leucopterus, 104, 106
 BLOETE, 94, 115, 122
 Blood-sucking cone nose, 178
 BOERNER, 37, 331, 334
 Bolbodera, 186, 187, 191
 seabrosa, 186, 191
 Bombacaceae, 118
 Bombax
 ventricosa, 118
 BONAME, 173
 BONDAR, 54, 82, 94, 136, 138, 139,
 274, 275, 276, 278, 282, 290
 Borrachudos, 178
 BOSELLI, 56
 BOSQ, 37, 53, 66, 82, 86, 91, 93
 Bougainvillea, 54
 Bozius, 9, 66
 Bracatinga, 45
Brachyrhynchidae, 129
 BRANDAO FILHO, 82
 BRANDT, 17, 28
 BREAKKEY, 14, 28, 94
 BRIEN, 46, 47, 74
 BRINDLEY, 28, 334
 BRITTON, 37, 265
 BROCHER, 17, 28
 Brentostoma, 215
 rubrum, 217
 BRUCH, 108, 111
 BRUCK, 121
 BRUMPT, 171, 174, 180, 193, 205, 220
 BRUNNER, 74, 111, 138, 212, 220, 221,
 223, 290
 Brycorinae, 265, 289
 BÜCHNER, 29, 254
 BUENO, V. TORRE-BUENO
 BUGNION, 29
 BURMEISTER, 176, 177
 Butuá de corvo, 118
 BUXTON, 221
 Cabassus
 unicinctus, 180
 Cacaueiro, 85, 273, 274, 275
Cacodmidae, 244
 Calliodis
 picturata, 161, 262
 CALVERT, 190
 Camarochilus, 231
 Cambui, 47
 Camponotus, 90
 CAMPOS, 177, 180
 Cana de açúcar, 100
 Canavalia, 82
 ensiformis, 82
 Canopus, 67
 Canthacaderinae, 135
 Capim arroz, 63
 Capsicum, 66
Capsidae, 22, 261
 Capsinae, 265, 289
 Caramboleira, 85

- Carapicú, 118
 Caridoma, 211
 pallens, 214
 CARINI, 201, 204, 221
 CARLO, 318, 321, 322
 Carrapicho, 118
 CARTER, 19, 29, 264
Carthasinae, 236
 Carthasis, 235, 236
 Carurú de espinho, 120
 Cascudos, 178
 Cassia, 82
 Castanheiro do Maranhão, 118
 Cavernicola, 154, 186, 188
 pilosa, 186
 Cecropia, 274
 adonopus, 278
Centroselidae, 82
Ceratocombidae, 21, 293
Ceratocombinae, 294
 Ceratozygum, 45
 horridum, 45
 Cerodon
 rupestris, 177, 180, 181, 206
 Cetherinae, 161, 162, 210
Cetherini, 210
 CHAGAS, C., 19, 177, 180, 181, 184,
 197, 204, 222
 CHAGAS, E., 196
 CHAMPION, 133, 138, 145, 266, 313
 Chariesterini, 82
 Chariesterus
 armatus, 81
 CHAVES, 183
 CHINA, 9, 29, 38, 66, 74, 130, 254, 310,
 327, 330, 331
 Chinch-bug, 104
 Chinch voadora, 178
 Chorisia, 118, 121
 Chryxinae, 161, 162
 Chupança, 178
 Chupança do cacáo, 273
 Chupão, 178
 Cimex, 247
 erythrozonias, 203
 foedus, 247
 gigas, 203
 hemipterus, 247, 248, 249, 250,
 251, 252
 lectularius, 173, 178, 247, 248,
 249, 252
 limai, 245, 247
 passerinus, 247
 rotundatus, 247
 variegatus, 203
 Cimicidae, 25, 243, 244
 Cimicinae, 246
 Cimicinae, 48
 Cimicoidea, 242
 Clauenocoris, 67
 CLARK, 197, 222
 Clerada., 109
 apmmornis, 109, 110, 172
 nidicola, 110
 Clerodendron, 137
 Clinocoridae, 25, 244
 Clinocoris
 lectularius, 247
 Clivineminae, 265
 Cnemodus, 97
 Cochlospermaceae, 198
 Cochlospermum
 insigne, 118
 COKER, 303
 Collaria
 scenica, 288
 Colobathristes, 100
 chalcocephalus, 100, 102
 Colobathristidae, 24, 97, 98, 100
Conorhinidae, 167
Conorhinus, 186
 claviger, 203
 corticalis, 197
 gigas, 196
 gracilipes, 204
 lateralis, 203
 lenticularius, 203
 lutulentus, 197
 nigrovarius, 204
 octotuberculatus, 204
 paulseni, 204
 phyllosoma, 200
 porrigens, 196
 renggeri, 204
 sextuberculatus, 234
 stalii, 203
 COOK, 264, 294
 Copium
 hamadryas, 137
 Coptosomatidae, 23, 42
 Coptosomidae, 23, 42
 Coptosomoides, 9
 CORDERO, 247, 255
 Corecorini, 82
 Corecoris, 86
 brevicornis, 86
 dentiventris, 86
 fuscus, 81, 86
 Coreidae, 24, 79, 80
 Coreinae, 81, 82
 Coreini, 82, 87
 Coreoidea, 79

- Corimelaena,
 basalis, 67
Corimelaenidae, 23, 42, 67
 Coriscidae, 24, 79, 89
 Corixidae, 27, 331
 Corixinae, 334
 Corixoidea, 331
 Corizidae, 24, 79, 92
 Corizus
 (Liorhynchus) *hyalinusi*, 91, 93
 (Niesthrea) *sidae*, 92, 93
 pictipes, 93
 Cornitermes, 208
 CORNWALD, 16, 29, 255
Corticocolae, 127
 Cortiço, 82
 Coryzoplatus
 rhomboideus, 87
 Coryzorhaphis
 leucocephala, 50, 51
 COTTON, 84, 85
 CRAGG, 245, 246, 248, 255
 CRAMPTON, 29
 Crinocerus
 sanctus, 81, 82
 Crotalaria, 56, 57, 70, 90
 CRUZ, 69
 CRUZ, F^o., 184, 185
 Cryptecerata, 20, 26, 310
 Cryptocricus, 317
 barozii, 317
Cryptostemmatidae, 21, 293
Cryptostemmatinae, 294
Cryptostemmatoidea, 293
 Cucurbitaceae, 84
 Cuiteleiro, 118
 CUMMINGS, 323
 Curicta, 325
 Curuquêrê, 50
Curupira, 100
 illustrata, 100
 Cydnidae, 23, 42, 65
 Cylapinae, 265
 Cyminae, 103
 Cyphothyrea, 45
 Cyrtocorinae, 44, 45
 Cyrtocoris, 45
 gibbus, 45
Cyrtopeltis
 varians, 260
 Cyrtorrhinus
 lividipennis, 264
 mundulus, 264
 Dalia, 82
 DALLAS, 38
 DAMPF, 59, 74
Dasympus
 novemcinctus, 177, 180
 DAVIS, 37
 DEANE, 109, 110, 111, 193, 223
 DEAY, 94
 DEBAISIEUX, 329
 DELONG, 37
 DENIER, 93
 DESLANDES, 85, 87, 121
 DEVENTER, van, 100, 101
 Dhalia
 variabilis, 53
 Diactor
 bilineatus, 6, 10, 73, 83
 DIAS, EM., 190, 200, 222
 DIAS, EZ., 183
 Dicyphinae, 265, 266
Dicyphus
 minimus, 266, 273
 Dicysta
 lauta, 135
 Dinidor, 51
 mactabilis, 51, 59
 Dinidorinae, 44, 51
 DINIZ, 121
 Dinocoris, 53, 54
 gibbus, 59
 histrio, 54
 maculatus, 54
 peregrinator, 54
 variolosus, 54, 55
 Dione, 49
 juno, 49, 50
Dipetalogaster, 202
Dipsocoridae, 21, 293
Dipsocoroidea, 293
 Discoccephala, 54
 Discogasterini, 82, 87
 Disodiidae, 22
 DISTANT, 33, 90, 135, 222, 266, 290
 Doença de Chagas, 160
 DOHRN, 305
 Doliehos, 82
 DONOVAN, 178
 DRAKE, 56, 74, 135, 137, 138, 139, 140,
 300, 303, 305
 DUDICH, 148
 DUFOUR, 29, 323
 Dufouriellinae, 261
 DUNN, 193, 195, 197, 222, 248, 249,
 250, 255
 DUTRA, 99, 273
 DUZEE, van, 37, 38, 272
 Dysdercus, 113, 114, 115, 116, 121
 albofasciatus, 113
 clarki, 113

- honestus, 113, 115, 121
 longirostris, 113, 117, 118, 119,
 120, 121
 maurus, 113
 mendesi, 113, 115, 121
 ruficollis, 113, 114, 115, 116,
 121
 Dysodiidae, 127, 129
 Dyscdius, 129
 lunatus, 128
 Eciton, 179, 185
Ectrichodia, 177, 215
Ectrichodiidae, 214
Ectrichodiinae, 154, 161, 162, 214
 Edessa, 61, 71, 72
 glaucescens, 53
 meditabunda, 53
 praecellens, 71
 Eidmannia, 214
 attaphila, 214
 EKBLOM, 29, 38
 Elasmodema, 143
 erichsoni, 143
Elasmodemidae, 143
 ELSON, 9, 30, 66, 171
 Embiruçu, 118
Emesidae, 26, 150
 Empicoris, 54
 Engytatus, 272
 geniculatus, 267, 269, 272
 notatus, 265, 266, 269, 273
 Enicocephalidae, 24, 142, 143
 Enicocephalus, 144
 concolor, 144
 rhyparus, 145
 spurculus, 145
 Epipolops
 frondosus, 113
 Eratyrus, 188, 188, 193
 cuspidatus, 194, 195
 mucronatus, 193, 194
 eratyrusiforme, 194, 195
 Erva de lagarta, 49
 Erva moura, 86
 ESAKI, 264, 296, 327, 339
 ESSENBERG, 329
 ESTABLE, 74
 Eupatorium, 49
Euryophthalminae, 113
Euryophthalmus, 113, 121
 humilis, 114, 117, 121
 lunaris, 121
 rufipennis, 121
 Euschistus, 59
 latus, 58
 triangulator, 43
 variolaris, 48
Eutriatoma, 186, 187, 188, 189, 190,
 198
 arthuri, 189
 carrioni, 199
 flavida, 198, 200
 gomesi, 199
 maculata, 200
 nigromaculata, 198, 201
 oliveirai, 200
 oswaldoi, 199, 200
 rubroyaria, 200
 sordida, 199, 200, 206
 tibia-maculata, 199, 200, 206
 venosa, 198
 EVANS, 149, 245, 296
 FABRICIUS, 38
 FÁRIA, 184, 185
 FAURE-FREMIET, 30
 Feijão, 82
 Feijão de porco, 82
 FERREIRA, 109, 110, 111, 193, 223
 FERRIS, 240, 241, 242
 FIEBER, 39, 334
 Figueira, 67
 Fincão, 178
 Fim-fim, 178
 FRACKER, 94
 FRACKER, 212, 221, 223
Frontirostria, 3
 Fumo, 86, 87, 100, 106, 122, 266
 FUNKHOUSER, 37
 Furão, 178
 Furnarius
 rufus, 247
 GABLER, 30
 Galeacius
 martini, 70
Galeottus
 formicarius, 90
Galgulidae, 26, 312
 Galgupha
 (*Acrotmetus*) *schulzii*, 67
 (*Eurysytus*) *basalis*, 67
 GALLIARD, 30, 223
 Gallus
 domesticus, 247
 GAMINARA, 200, 223
 GARDENA, 150, 151
 Gargaphia
 torresi, 136
 GEISE, 30
Gelastocoridae, 26, 312
Gelastocorinae, 314
Gelastocoris, 313
 nebulosus, 313

- quadrimaculatus, 313
 variegatus, 313
 vicinus, 313
Gevcoridae, 24, 97
Geocorinae, 103
Geocorizae, 21
Gerridae, 21, 297, 298
Gerrinae, 300
Gerroidea, 297
 GIBSON, 94, 95, 135, 141
 GILLETT, 36, 223
 GIRAULT, 94, 255
 GLASGOW, 14, 30
Glomerella
 gossypii, 116
 GODGLUECK, 30
 Goiabeira, 68
 GOMES, F., 180, 181, 205, 220
 GOMES, J., 53, 74, 85, 118, 122
 GONÇALVES, 82, 84, 94
 GONZAGA, 180
Gossypium, 118
 GOULD, 303
Gramineae, 104, 264
 Grape fruir, 84
Graphosomatidae, 23, 42
Graptocleptes, 157, 219
Grevillea
 robusta, 52
 Guaco, 82
 Guaxima, 118
 Guaxuma branca, 289
Gymnocerata, 20, 21, 42
Haematosiphon, 246
 inodora, 245, 246
Haematosiphoninae, 246
 HAGAN, 242
 HAHN, 39
Halobates, 300
Halobatinae, 300
 marítima, 301
Halovelia, 301
 HAMBLETON, E., 85, 95, 139, 289, 291
 HAMBLETON, J., 93, 95
Hamelia
 patens, 274
 HAMILTON, 326
Hammacerinae, 215
Hammacerus, 216
Hammatoceridae, 215
Hammatocerinae, 215
Hammatocerus, 177, 216
 HAMNER, 30, 75
 HANDLIRSCH, 30, 149
 HARNED, 255
 HARRM, 236, 237, 238, 300, 303
 HASE, 223, 224, 226, 252, 256
 HATHAWAY, 47, 71, 85, 87
 HAVILAND, 212, 225
Hebridae, 23, 26, 297, 304
Hebrus, 304, 305
 concinus, 305
 parvulus, 306
 HEERDEN, 56, 75
 HEIDEMANN, 31, 99, 175
Helopeltis, 274, 280, 282
Helotrephidae, 27, 330
 HEMPEL, 115, 123
 Heniartes, 217
Henicocephalidae, 24, 143
Henicocephalus, 144
Herpetomonas
 elmassiani, 108
 HERRICH-SCHAEFFER, 39
Hesperoctenes, 239, 240
 fumarius, 239, 240
 impressus, 239, 241
Heterogastrinae, 104
Heteroptera, 3
Heterotermes, 130
Hexacladia
 smithii, 72, 83
 HEYMONS, 31, 75
 Heza
 insignis, 160, 218, 229
Hibiscus, 118
 esculentus, 107, 118
Hiranetis, 175, 219
Hirilcus, 81
 gracilis, 80
 HOFFMANN, 87, 200, 225
 HOKE, 31
 HOLDRIDGE, 95
 HOLMES, 123
Holoptilinae, 161
Holymania, 83
 clavigera, 81
 histrio, 83
Homalocoris, 216
 HOOD, 31, 111
 HOPPE, 329
Horcias
 nobilellus, 289
 HORVATH, 31, 75, 95, 101, 112, 141.
 242, 256, 236, 308
 HOWARD, 99, 273
 HOWES, 152, 159
 HUNGERFORD, 31, 296, 303, 307, 308,
 314, 323, 326, 329, 332, 334
 HUNTER, 291
 HURTADO, 204
 HUSSEY, 70, 75, 122, 123, 225, 323
 HUTCHINSON, 256

- Hyalymenus, 90
 tarsatus, 90
Hydrobatidae, 21, 298
Hydrobiotica, 297
Hydrocorizae, 26
Hydrometra, 295, 296
 caraiba, 296
 metator, 296
Hydrometridae, 21, 294
Hydrometrinae, 296
Hydrometroidea, 294
Hyocephalidae, 24, 97
Hypselonotus
 fulvus, 86, 87
 interruptus, 86, 87
 IHERING, 46, 75
 ILLINGWORTH, 109, 112
Infericornis, 97
Infericornia, 97
 IRAGORRY, 225
Ischnodemus, 103
Isodermidac, 22, 126, 129
Isodermus, 129
 gayi, 129
Isometopidae, 22, 243
 JACZEWSKI, 31, 296, 308, 329, 334
Jadera
 sanguinelenta, 93
Jalysus, 99
 sobrinus, 98, 99
 JANISH, 256
Jatropha
 curtas, 68
 JEANNEL, 168, 202, 209, 225
 JENSEN-HAARUP, 149, 256
 João, 63
 João de barro, 247
 JONES, 56, 75, 249, 257
Joppicidae, 22, 26, 143
 JORDAN, 242, 257
 JÖRG, 202, 225, 227, 228
 KEMPER, 257
 KERSHAW, 33
 KIMBALL, 176
 KING, 264, 291
 KIRKALDY, 31, 39, 75, 257, 329, 335
 KIRKPATRICK, 107, 112
 Kissing-bug, 178
 KNIGHT, 31, 37, 265, 291
Kodormus, 166
 bruneosus, 166
 KRAMER, 318
 KUSKOP, 32, 76
 LABOUBENE, 173
 LAFONT, 173, 175, 177, 178, 179
Lagarta rosada, 108
 LAMEERE, 32
Lamus, 186
 LAPORTE, 39, 219
 Laranjeira, 70, 82, 84, 118, 119
Larginae, 113
Largus, 121
 LARROUSSE, 183, 192, 193, 203, 225
Lecticolae, 244
 LEFEBVRE, 326
Leguminosae, 90, 289
Lemna, 306
 LENT, 110, 112, 186, 189, 193, 199,
 201, 202, 20t, 226, 230, 232, 217,
 257
Leogorrus, 209
 formicarius, 209
 litura, 180, 209
 LEON, 258
 LEONARD, 84, 95
Leopoldina
 piassaba, 183, 193
Leptocoris, 91
 filiformis, 91
Leptocorisinae, 91
Leptodactylus
 ocellatus, 321
Leptoglossus, 83, 85
 conspersus, 85
 dilaticollis, 81, 85
 gonagra, 83, 86, 120
 stigma, 83, 84, 85, 86
Leptopodidae, 308
Leptopodcidea, 308
Leptoscelini, 82, 85
Leptoscelis, 84
 LETHIERRY, 39
Lethocerus, 4, 17, 320
 annulipes, 321
 grandis, 319
 maximus, 320
 LIIBANIO, 183
 LICHE, 300
 LIMA, COSTA, 73, 76, 95, 141, 149, 185,
 186, 216, 226, 236, 237, 238, 242
 LIMA, F., 53, 58, 59, 76
Limaia
 ruber, 207
Limnobatidae, 21, 294
Limnobatodinae, 296
Limnocoris, 317
Limnogonus, 300
 aduncus, 298
Linshcosteus, 154, 186
 camifex, 154
Liotingis
 aspidospermae, 136
 LISBOA, 183
 LIST, 258

- Litoralia*, 310
Lobostoma, 66
 LocY, 16, 32, 326
Lophocephala, 169
Loxa
 flavieollis, 61
 LUGO, 193, 220
 LUNDBLAD, 335
Lycambes, 81
Lyctocorinae, 261
Lyctocoris
 campestris, 261
Lygaeidae, 22, 24, 97, 98, 101
Lygaeinae, 103
Lygaeoidea, 97
Lygus
 pratensis, 265
 MACHADO, 171, 173, 181, 204
Machtima
 crucigera, 80, 82
 MACIEL, 201, 204, 221
Macrocephalidae, 24, 145
Macrocephalinae, 147
Macrocephalus, 148
 affinis, 148
 notatus, 148
Macroceroea
 grandis, 113
Macrophthalmus, 211
Macrops, 211
 MAGALHÃES, 46, 47, 76
 Mal de chupança, 288
 MALLOCH, 77, 153, 227, 294
 MALOUF, 32, 56, 76
Malvaceae, 107, 114, 118, 289
 MAMMEN, 32
Mamoneira, 82
Mamorana, 118
Mangueira, 85
Manicaria
 saceifera, 109
Maracujá, 83, 84, 87
 MARLATT, 176
Marlianus, 186, 191
 diminutus, 191
 MARSHALL, 32, 326
 MARTIN, 314
 MATTA, 180, 193, 227
 MAULIK, 32, 326
 MAXSON, 37
 MAYR, 40, 323
 MAZZA, 189, 200, 202, 204, 227, 228
 MC ATEE, 67, 77, 153, 227, 294
 MC KINSTRY, 304
Mecistorhinus, 53
 (*Antiteuchus*) *amplus*, 54
 mixtus, 52, 55
 (*Mecistorhinus*) *malanoleucus*,
 55, 60
 sepulchralis, 60
Mecus, 186
 MEEK, 32
Megalopyge
 urens, 50
Megalotomus, 89, 90,
 palescens, 90, 91
Megarais, 67
Melanolestes, 159, 213
 picipes, 158, 160, 169, 213, 392
 Melão de S. Caetano, 84, 120
 MELIN, 149, 314
 MELLANBY, 228, 258
 MENDES, D., 272
 MENDES, L., 86, 115, 116, 117, 121,
 123
Mendocinia, 310
 hygrobia, 310
Menenotini, 82, 85
Menenotus, 85
 lunatus, 84, 85, 86
Mepraia
 spinolai, 202, 205
Merocorinae, 81
Meropachydid, 81
Meropachys
 nigricans, 80
Merragata, 304, 305
Mesovelia, 307
 multisanti, 307
Mesoveliidae, 25, 297, 306
Mestor, 186, 196
 lignarius, 196
 megistus (v. *Pantrongylus*)
 rufotuberculatus, 196
Metacanthinae, 99
Mexican bed bug, 178
Mezira, 129
Meziridae, 129
 MEYERS, 237, 238
 MICHALK, 32
Microlestria, 209
 fuscicollis, 210
Micronectinae, 334
Microphanurus
 mormideae, 71
 scuticarinatus, 71
Microphysidae, 25, 243
Microtominae, 161, 162, 215
Microtomus, 216
 conspicillaris, 219
 pintoi, 218
Microvelia, 302
Mictini, 81
Milhã, 63

- Milho, 104, 105
 MILLSAPS, 303
 Mimosa, 45
 scabrella, 45
Mindarus, 215
 Miridae, 11, 22, 243, 244, 261, 262:
 263
 Mirinae, 265, 273
Miroideae, 243
 MITIS, 335
 Mocó, 177, 180, 181, 205
 Molossus
 perotis, 240
 Monalonion, 274, 283, 286, 287, 288
 atratum, 274, 283
 bondari, 274, 276
 flavosignatum, 275
 knighti, 275, 278
 parviventre bahiense, 274
 xanthophilum, 270, 273, 274,
 275, 283
 Monitor bug, 178
Mononychidae, 26, 312, 314
 Mononyx, 314
 nepaeformis, 313
 raptorius, 312, 313
 MONTANDON, 318, 323
 MONTANO, 82
 MONTE, 53, 57, 70, 77, 82, 84, 85, 93,
 95, 106, 123, 135, 141, 289,
 291, 318
 MOODY, 32, 96
 MORAES, 247, 258
 MOREIRA, 266, 291
 MORGAN, 273
 Mormidea, 55, 56, 57, 73
 angustata, 59
 exigua, 57, 62
 notulifera, 57, 62
 poecila, 57, 59, 62, 63, 71, 73,
 217
 v-luteum, 57, 62
 ypisilon, 57, 62
 Mormodica
 chrantia, 84, 120
 Mosquilla
 vastatrix, 274, 275, 282
 Mosquitos, 178
 Mother of bugs, 178
 MUIR, 33
 MURRAY, 258
 MYERS, 33, 38, 123, 130, 254
 Myodocha, 101
 Myodochidae, 24, 97, 101
 Myrmecalydus
 celeripes, 91
 Nabidae, 22, 25, 143, 235
Nabididae, 235
 Nabinae, 237
 Nabis, 235, 237
Nacogaeyidae, 26, 304
 Nauceridae, 27, 314, 315
 Neididae, 23, 97, 98
 Neidinae, 99
 NEISWANDER, 326
 NEIVA, 171, 173, 179, 180, 181, 182,
 183, 185, 186, 187, 191, 193,
 197, 202, 203, 204, 205, 228,
 229, 230
 Neoblissus
 parasitaster, 108
 Neodine, 53
 macraspis, 54
 Neogorpis, 235
 Neoplea, 330
Neoproba, 272
 notata, 266, 272, 273
 varians, 266
 Neorileyia, 71, 72
 flavipes, 71
 Neotoma
 micropus, 177
 Neotriatoma, 186, 188, 198
 circummaculata, 198
 limai, 198
Nepaeformes, 314
 Nepidae, 27, 314, 315, 324
 Nepoidea, 314
 Nerthra, 312, 313
 Nerthridae, 26, 311, 312
 Nerthrinae, 314
 Neurotenus, 129
 Nezara
 (Acrosternum) marginata, 58
 (Nezara) viridula, 55, 58, 70, 72,
 73
 Nicotiana
 tabacum, 86, 87, 100, 106, 122,
 266
 NINO, 230
 Notocyrtus, 155, 219
 inflatus, 232
 Notonecta, 329
 Notonectidae, 27, 327
 Notonectoidea, 327
Nudirostri, 153
 Nymphaea, 306
 Nysius
 simulans, 105, 107
Ocelatae, 308
 Ochtheridae, 26, 311
 Ochtheroidea, 310
 Ochtherus, 312

- OEVERMANN, 33
 Oficial da sala, 108
 Ogmocoris
 reinigeri, 56
 OMORI, 258
 Oncerotrachelus, 162
 Oncopeltus, 105, 108
 (Oncopeltus) varicolor, 108
 (Erythriscius) fasciatus, 108
Onychiophora, 97
 Opisthacidus
 domesticus, 207
 rubropictus, 208, 213
 Oplomus
 (Catostyrax), 50
 carena, 49, 50
 Orchideas, 289
 Oreodoxa
 regia, 124
 ORFILĂ, 258
 Ornithocoris, 247
 furnarii, 247
 toledoii, 247, 253
 Orthaea, 105
 bilobata, 106
 Orthotylinae, 265
 OSBORN, 33, 37
 Otiodactylus, 166
 signatus, 166, 167
 Oxycareninae, 104
 Oxycarenum, 107, 108
 hyalinipennis, 107, 108
 Pachira
 aquatica, 118
 Pachycoris, 17, 68
 torridus, 4, 68, 69, 71, 72
 Pachygronthinae, 104
 Pachylis, 177
 pharaonis, 12, 82
 laticornis, 82
 Pachynominae, 237
 Pachynomus, 235, 237
 Pacoté, 118
 Pagasa, 237
 luteiceps, 237
 pallidiceps, 237
 Paineira, 118, 121
 Paineira de Cuba, 118
 PAINTER, 112, 264, 292
 Palmeira imperial, 124
 Panicum, 91
 crusgali, 63
 numidianum, 288
 sanguinalis, 63
 Panstrongylus, 186, 188, 195
 chinai, 195
 geniculatus, 177, 180, 197
 guentheri, 196
 larrouseii, 196
 lignarius, 196
 lutzi, 197
 megistus, 157, 171, 172, 173,
 174, 175, 176, 177, 178, 180,
 181, 182, 183, 184, 185, 186,
 196, 197, 201, 205,
 rufotuberculatus, 196
 seai, 197
 tenuis, 197
 Papilio
 thoanthoides, 50
 Paratriatoma, 186, 188
 hirsuta, 186
 Paredocla, 202
 decorsci, 202
 PARISH, 77
 PARSEVAL, 77, 87
 PARSLEY, 37, 40, 131, 292
 Paryphes, 87 -
 Passer
 domesticus, 247
 Passiflora, 83
 edulis, 83
 quadrangularis, 83
 PATCĂ, 37
 PATTON, 16, 245, 258
 Pari rolha, 82
 PAYNE, 96
 PEARSON, 124
Peiretes, 212
 Pelocoris, 317
 bipustulatus, 316
Pelagonidae, 26, 311
Pelogonus, 312
 Penicillium, 118
 digitatum, 118
 italicum, 118
 PEYIDO, 189
 PENNINGTON, 40, 77, 96, 141, 149
 Pentatomidae, 23, 42
 Pentatominae, 44, 51
 Pentatomini, 53
Pentatomoidea, 42
 Pepsis, 157, 207
 Perceveção, 178
 Percevejo, 178
 Percevejo da Baía, 178
 Percevejo de cama, 244
 Percevejo de comércio, 178
 Percevejo do maracujá, 83
 Percevejo do sertão, 178
 Percevejo francês, 178
 Percevejo gauderio, 178
 PEREZ, 46, 77

- Periplaneta
 americana, 208
 Periquiteira, 118
 Peritropis, 263
 Perkinsiella
 saccharicida, 264
 Peromatus
 notatus, 57
 Persea
 gratíssima, 87
 Peruda, 100
 típica, 100
 PETTET, 326
 PFLUGFELDER, 33
 Phacelocomus
 rufifrons, 189
 Phaenacantha
 (Anorygma) saccharicida, 100
 Phaseolus, 56
 Phloea, 46
 corticata, 46
 longirostris, 47
 subquadrata, 46
Phloeobiotica, 127
 Phloeinae, 44, 46
 Phloeophana, 46
 paradoxa, 46, 47
 Phonolibes, 169
 Phorticus, 237
 obscuripes, 237
 viduus, 237
 Phthia, 85
 picta, 80, 85
 lunata, 84
 ornata, 85
 Phylinae, 265
 Phylomorpha
 laciniata, 88
 Phymata, 146, 147
 acutangula, 148
 erosa, 148
 fortiticata, 147, 148
 Phymatidae, 24, 142, 145
 Phymatinae, 147
 Phytophthora, 287
 PICADO, 190, 230
 Picão, 289
 Piesma, 132
 cinerea, 132
 Piesmidae, 22, 132
 Piezodorus
 guildini, 56, 60, 71
 PIFANO, 201, 226
 Pimenteira, 66
 Pimenteira brava, 63
 Pinhão do mato, 68
 Pinnaspis
 minor, 152
 PINTO, 165, 173, 179, 180, 181, 183,
 186, 187, 189, 190, 193, 194, 195,
 196, 197, 200, 204, 206, 207, 209,
 217, 228, 230, 231, 232, 259
 PIRAJÁ DA SILVA, 178
 Pirates, 212
Piratidae, 212
 Piratinae, 155, 161, 163, 212
 PIZA JR., 153
 Placocoris
 viridis, 57, 62
Plataspidae, 23, 42
 Plataspidae, 23, 42
 Platycarenum, 54
 vicinus, 54
 Plea, 330
 Pleidae, 27, 330
 Pleoidea, 330
 Pleoideae, 327, 330
 Ploiariidae, 26, 43, 150, 152
 Plunentis, 88
 porosus, 88
 Podopidae, 23, 42
 POISSON, 33, 130, 131, 335
 Polistes, 160
 Polycetenidae, 21, 239
 Polycetenioidea, 239
 PONTE, Del, 194, 232, 233
 POOR, 139, 140
 POPOFF, 29
 POPPIUS, 100, 101, 238, 261, 292
 PORTER, 78, 202, 233
 Pothea, 215
Prionotus, 219
 PROENÇA, 247, 257
 Prolobodes, 9, 64, 66
 giganteus, 66
 Prostemiae, 237
 Proxys
 punctulatus, 59
 PRUTHI, 34
 Psammolestes, 186, 187, 189
 arthuri, 189, 190
 coreodes, 189, 190, 191
 Pselliopus, 159
 cinctus, 169
 Pseudotelenomus
 pachycoris, 71
 Psidium
 araça, 85
 guajava, 85
 Psilobyrsa
 vriesiae, 137
 Pulvinaria, 49
 inumerabilis, 49

- Punaise maupin, 179
 Punaise morpin, 179
 PURI, 33, 259
 PUTTEMANS, 272, 288
 Pyrrhocoridae, 22, 97, 112
 Pyrrhocorinae, 113
 QUAINTANCE, 272
 Queima do cacao, 277
 Quiabeiro, 107, 118, 137
 Ranatra, 324, 325
 annulipes, 325
 RANKIN, 323
 Rasahus
 hamatus, 213
 limai, 214, 216
 RAYMOND, 259
 READIO, 93, 96, 149, 158, 159, 171, 233
 Reduviidae, 26, 143, 153
 Reduviinae, 161, 164, 207
Reduviini, 207
 Reduvidioidea, 142
 Reduvius, 153, 159
 personatus, 171
 REICHENOW, 204
 REINtARD, 292
 REINIGER, 54, 58, 59, 73, 76, 120, 217
 REUTER, 40, 97, 238, 259, 261, 289, 292, 294
 Rhagovelia, 21, 297, 302
 collaris, 302
Rhiginia, 215
 Rhodnius, 169, 180, 186, 187, 191, 192
 brethesi, 180, 183, 192, 193
 brumpti, 180, 181, 193
 domesticus, 192
 dunni, 193
 nasutus, 193
 pallescens, 193
 pictipes, 192, 193
 prolixus, 15, 180, 192, 193, 201
 robustus, 192
Rhynchota, 3
 Rhyparoechrominae, 102
 RIBAGA, 245, 259
 RICE, 303
 RILEY, 177
Riparii, 308
 RIVNEY, 259
 ROBERTS, 264, 292
 ROCHA Jr., 181
 Romanzeira, 85
 Rondgo, 178
 RONNA, 129
 Roseira, 82
 ROTHSCHILD, 257
 ROUSSEAU, 33
 Ruibarbo do campo, 118
 Runibia
 perspicua, 57, 62
Saccoderes, 219
 SACHTLEBEN, 187
 Saica, 164, 165
 Saicinae, 161, 162, 165
 Saldidae, 25, 308
 Saldula
 ventralis, 309, 310
 Salyavata, 211
 nigrofasciata, 211, 215
 variegata, 211
 Salyavatinae, 161, 162, 211
 Samaúna de igapó, 118
Sandaliorrhyncha, 321
 SAUER, 85, 95
 Sava, 219
 Scaptocoris, 64, 65
 castaneus, 65
 terginus, 66
 Schizopterinae, 294
 Schizotrypanum
 cruzi, 110, 160, 174, 181, 184, 185, 190, 193, 195, 197, 200, 201, 204, 217, 252
 SCHMIDT, 96, 124
 SCHOUTEDEN, 78
 SCHREIBEN, 204
 SCHROEDER, 300
 SCHUMACHER, 78, 233
 SCHWENK, 242
 Scutelleridae, 23, 42, 67
 Scutelloidea, 42
 SEABRA, 40
 SEGOVIA, 204
 SEIDEL, 34, 124
 SEITZ, 158, 233
 Sephina, 86
 erythromelaena, 84, 87
 Serbana, 46
 Serenthinae, 135
 SERVILE, 36
 SEVENIN, 32, 39, 326
 SHARP, 34, 78
 Sida, 114, 115, 118
 cordifolia, 289
 rhombifolia, 289
 Sigara, 327, 328, 334
 SIGNORET, 78, 93, 96
 SmVA, 45, 49, 78, 107, 208
 SILVESTRI, 131
 Simulium, 178
 SINGH-PRUTHI, 34
 SIOLI, 260

- Sirthenea, 213
 stria, 213
 SMITH, 34, 264, 292
 SMYTH, 70, 79
 SOARES, 86
 Solanaceas, 85, 86, 87
 Solanum, 63
 lycopersicum, 66
 nigrum, 86
 sysimbrifolium, 63
 tuberosum, 53
 Solenopsis
 geminata, 109
 Soljubea
 ypsilonoides, 91
Sorglana, 211
 SORNY, 174
Spartocera, 86
 SPEISER, 242
Sphaeridopidae, 206
Sphaeridopinae, 161, 163, 206
 Sphaeridops
 amaenus, 207, 209
 inermis, 207
 pallescens, 207
 Sphictyrtus, 87
 chryseis, 86, 87
 fasciatus, 87
 Spiniger, 157, 158, 194
 femoralis, 212
 fulvo-maculatus, 194
 ochripennis, 156
 rubropictus, 208, 213
 steini, 208
 SPINOLA, 40
 Spirogyra, 333
Spissipedes, 145
Spongipedes, 207, 212
 SPOONER, 34, 131
 SQUIRE, 79
 STAL, 40, 41, 79, 96, 102, 134, 135,
 145, 149, 198, 214, 234
 STEARNS, 37
 Stenopoda
 cinerea, 166
Stenopodinae, 161, 163, 165
 STEPANEK, 260
 Stephanitis
 olyrae, 134
 STICHEL, 234
 Stigmonose, 264
 Stiretrus, 68
 chalybaeus, 50
 chryzoprasinus, 50
 septemguttatus, 51
 (*Stictonotium*) *decastigma*, 50, 51
 (*Stiretrus*) *smaragdalis*, 50
 STOLL, 41
 STONER, 79
 STOREY, 19, 34, 264
 STREBLE, 239
Suprcicornia, 79
Syrtides, 145
 Tabaco, v. fumo
 TANAKA, 34
 Tanjerineira, 85
 Tarnished plant bug, 265
 Tatú, 177, 180, 197
 Tatusia
 novemcinctus, 177, 180
 TAUEBER, 214, 234
 TAYLOR, 34
 TEJERA, 180, 193, 195
 Telenomus
 fariai, 185, 186, 210
 mormideae, 71
Telmatobia, 310
 Tenagobia, 334
 Tenthecoris
 bicolor, 281, 289
 Termitophylidae, 22, 243
 Terminalia
 catapa, 47
 Termitaphididae, 21, 126, 128, 130
 Termitaphis, 130
 circumvallata, 130
 Termitaradus, 130
Termitocoridae, 21, 126, 130
 Tessaratominae, 44
 Thasus,
 gigas, 82
 Thaumastancis
 montandoni, 122
Thaumastocoridae, 26, 124
Thaumastotheriidae, 26, 124
Thaumastotherioidea, 124
 THEODORO, 34, 35
 Theraneis, 122
Thyreocoridae, 23, 42, 67
Tingidae, 22, 132
Tingididae, 22, 132
Tingidoidea, 132
Tingitidae, 22, 132, 133
Tingitoidea, 132
Tingitinae, 135
 TITSCHACK, 248, 260
 TOBAR, 202, 205, 228, 234

- TODD, 234
 Tomateiro, 55, 66, 85, 86
 TORREALBA, 190, 200, 222
 TORRE-BUENO, 16, 35, 37, 41, 296,
 303, 304, 323
 TORREND, 274, 278, 282, 288
 TORRES, 180, 181, 184
 TOWER, 35
 TOWNSEND, 121, 124
 Trachelium, 91
Trachelomiris
 scenicus, 288
 TRAVASSOS, 180, 197, 208
 Triatoma, 19, 170, 172, 173, 177, 186,
 188, 189, 194, 195
 (Triatoma), 201
 brasiliensis, 177, 178, 180, 181
 183, 201, 206
 breyeri, 202
 carrioni, 199
 ctlagasi, 180, 204
 coxo-rufa, 186
 dimidiata, 203, 204
 flavida, 198, 200
 fluminensis, 197
 geniculata, 177, 180
 gomesi, 199,
 infestans, 170, 173, 174, 175, 176,
 177, 178, 180, 181, 182, 204,
 208
 maculata, 177, 178, 200
 maculipennis, 203
 mazzae, 201
 megista (v. *Panstrongylus*)
 melanocephala, 204
 neotomae, 177
 nigromaculata, 198, 201
 oliveirai, 200
 oswaldoi, 199, 200
 patagonica, 199
 petrochii, 200
 piutoi, 203
 platensis, 204
 porrigens, 176
 protracta, 171, 177
 recurva, 203
 rosenbuschi, 204
 rubrofasciata, 173, 174, 175, 176,
 177, 178, 180, 182, 195, 203,
 204
 rubroniger, 176, 200
 rubrovaria, 177, 182, 200
 sanguisuga, 171, 175, 176, 177
 203
 sordelli, 199
 sordida, 8, 174, 175, 176, 177,
 178, 179, 180, 181, 182, 185,
 199, 201, 205
 spinelai, 202, 205
 tibia-maculata, 199, 200, 206
 variegata, 198,
 venosa, 198
 vitticeps, 180, 181, 204, 205
 wernickei, 196
Triatomaptera, 200
 porteri, 202
Triatomidae, 167
 Triatominae, 161, 164, 167
Triatomini, 167
 Tribelocephalinae, 161
 Trichocentrus
 gibbosus, 100
 Trichopodopsis
 pennipes, 72, 73
 Trichosurus
 vulpecula, 109
 Trigo, 104
 Triphleps
 insidiosus, 261
 Trochopus
 marinus, 301
 plumbeus, 301
 Tropidotylus, 9
 Trypanosoma
 cruzi (v. *Schizotrypanum*)
 equinum, 174
 lewisi, 184
 TULLGREN, 35
 TURNER, 56
 Ubussú, 109
 Ugnius
 kermesinus, 86
 UHLER, 266, 273
 URENA, 118
 URIBE, 217, 234
 USINGEa, 35, 131, 145, 234, 240, 241,
 242
 Velia, 301, 302
 basalis, 302
 brasiliensis, 302
 bicolor, 302
 brachialis, 302
 Veliidae, 21, 297, 301
 Velocipeda, 243
 Velocipedidae, 25, 243
 Vescia
 adamanta, 212
 minima, 212
 spicula, 211, 212

- Vesciinae, 161, 162, 212
 Veseris
 rugosicollis, 207
 VIANNA, 184
 Videira, 129
 Vinchuca, 178
 VOGELSANG, 247, 255
 Volesus
 nigripennis, 207
 Vum-vum, 178
 WALKER, 41
 WALSH, 177
 WASMANN, 131
 Wasserbinen, 329
 WhTSON, 70, 72, 79, 293
 WEBER, 9, 16, 35
 WEDDE, 35
 WEFELSCHIED, 33
 WEISS, 289, 293
 WESTWOOD, 149
 WIGGLESWORTH, 15, 36
 WILLE, 124
 WILSON, 37
 WOLCOTT, 56
 WOLFF, 41
 WOODS, 266
 WOTZEL, 36
 Xylastodorus, 124
 luteolus, 124, 125
 ZEHNTNER, 274, 275, 282, 286, 287,
 288, 293
 Zelinae, 161, 164, 218
 Zelus, 218
 armillatus, 218
 leucogrammus, 7, 160, 218, 399,
 400